

分函口試





1013





傷寒論金匱上方而方名之下記  
載主治者益東洞先生是選定者  
不者加何台字分焉

勿誤藥室方函卷上

以部

茵陳蒿湯 傷寒論 一身發黃心煩大便難小便不利者

茵陳 施子 大黃

右三味各半斤茵陳蒿湯方中加黃芩黃連人參甘草

此方發黃乃治之聖劑也世醫以黃疸初發二茵陳工

苓散用之非也非十日先攻方用之取之後茵陳

五苓散乃治之聖方也二方別立苓散之詳二茵陳

ハ苓散乃治之聖方也二方別立苓散之詳二茵陳

リ故茵陳室秘藏人指痛湯醫學綱目人犀角湯二方

用之發黃乃治之聖方也二方別立苓散之詳二茵陳

利水ノ効アリ方後二云尿如皂角汁ト云レテ後世ニ

テ之加味道遠散竟胆厚肝湯等方施子ハ皆清熱利水ヲ

主トスル也但此方發黃ニ用ル陽明部後ハ腹滿小便





普通治諸劑ヲ用テ其功ヲキルハ  
多ク部ニ在リ當飯白米湯ヲ用ユ  
キナリ大ニ功アリ有リ

椒目ハ蜀椒實ノ黒子ナリ本草云ク  
主治水腫腹脹利下又曰三種水氣及  
腎虛耳鳴聾聵腰膝急  
男子金匱水飲心下在リ時々嘔吐  
水ニ春末吐止ミ腹滿嘔水便不  
利多通四肢浮腫腹脹特ニ甚ク  
脉沈緊宜面飲ラ去レトニ椒  
薑若先利カモ硝ヲ與テ心使  
利腹滿大ニ減シ今近微腫アリ

利ヲ主トメ用ユベシ若心下ニ痞結アル者ハ大柴胡湯  
加茵陳反テ効アリ若虚候アル者ハ千金茵陳湯ニ宜シ  
葶藶湯 金匱

葶藶 薏苡仁 桃仁 瓜瓣 右四味

此方ハ平淡ニメ思フ外効アル也微熱ト胸中甲錯

トヲ目的トスベシ胸ニ甲錯アルハ蓄血アルカ故ナリ

蓄血ナクトモ咳血ナルト宣シ若咳甚シキモノハ

四順散ヲ合メ効アリ福中楓亭ハ肺癰ニ先導繩ノ浮白

散ヲ用ヒ効ナキ片ハ此方ヲ用ト云

己椒蘆薤丸科 治腹滿口舌乾燥ニ便澀滯者

防己 椒目 葶藶 大黃 右四味隨証或加芒硝

此方ハ元陽胃ノ間ニ面飲アリテ水腫ニ憂スル者ニ効

アリ四肢ノ浮腫ヨリハ腹脹滿ヲ主トスバシ腹堅實ノ

者ニハ芒硝ヲ加フバシ此芒硝ハ水所已去モ加夜苓芒

硝ト同意ニテ実ヲ挫キ利水ヲ主トスル也方後ニ湯ス

ルモノニ加ルト在ニ拘ルハカラス



用酒毒類方  
茵陳五苓散  
黃連解毒湯  
松葉桃花湯  
連葛解毒湯

茵陳五苓散方中加茵陳

即五苓散方中加茵陳

此方八種黃人輕症二用二小便不利ヲ主トスル也故二

聖府總錄二此方陰黃身如橘皮小便不利云云治ス

此方陰黃人症藥源二詳二見二二陰症入下二八非二唯熱

狀二二者二二若二此方二証二二熱狀二二者二八施子藥皮

湯及茵陳蒿湯ヲ擬用ス二二又黃肝二二鐵砂散方兼用

二二二東垣酒客病ヲ治スル二此方二用二二最得二

ト二平日酒二醉二煩悶止ザル者二與二汗ヲ發シ二小便

利ス二二老牛殺ナリ二二二二二二二二二二二二二二二

胃風湯局方治風冷食虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及濕

毒下如豆汁或下瘀血

人參 茯苓 川芎 桂枝 芍藥 白朮 粟米

右八味

此方八素問所謂胃風二二非二二種腸胃二二不和ヨリ泄

瀉二非二水穀不化二二非二水穀不化二二非二水穀不化二二



此方三身水腫... 腹水可試... 又...  
 呼吸器ノ不利... 水腫... 大...  
 便秘結者ニ試...

止マズ顔色青慘花再歳月ヲ延者久治不益甘草源心  
 湯漸利湯ノ如キハ上焦ニ屬シ次方下焦ノ方ニ屬ス

郁李仁湯聖藥

郁李 桑白 黑豆 橘皮 蘇子 葶根 古三味

茵陳散 聖藥治傷寒後熱在心下恍惚多驚不得眠睡

竹葉 地黃 茵陳 芫胡 芍藥 茯苓 黃芩 麥門

施子 犀角 甘草 生薑 右十二味

此方ハ医学綱目犀角湯ノ原方ニ傷寒導赤各平症

二天熱心下三絶曲ニ致日解又廿四者ニ用効下平雜

病ニハ犀角湯交テ健動耳卷大驚通淋通赤加赤芍藥

郁李仁湯本朝經驗治面目手足浮腫小便不利者

郁李 蘇子 防己 青皮 杏仁 茯苓 大黃 白桃

花ニ生薑 右九味

此方ハ虛寒間ハ水氣ヲ治ス就中水氣上體ニ盛ニ心腹

脹滿或ハ短氣早ル者ニ効アリ聖惠ニ郁李杏人橘皮防



此方為散主藥也故用一錢

此方為散主藥也故用一錢

乙蘇子茯苓白朮方一此方其効方一  
王陽柳中鐵騎治胃乃像後過度損耗元氣身熱頭  
痛或渴不止不任風寒氣高而喘及後汗後二三日脫乳  
面赤更熱或不利二三行名止有胎或無胎而不欲食喜熱  
飲食難進重者不腹間有謔謔妄言眼目赤而睛黃  
黃黃甘草人參升麻桑胡獨活黃芩白朮  
七八味加麥門止味子名味麥益氣湯又獨活王合生蘇加  
乾姜附片各姜附益氣湯加芍藥茯苓名調中益氣湯  
此方元來東垣建中湯十全大補湯人參養榮湯十下差  
異人組立三方下八後世家云三種之方下調中益氣  
意小葉胡湯下虛候下帶正者二用二下其虛候下云云  
文八升提人下云各義二花下云其虛候下云云  
八第一升提人下云各義二花下云其虛候下云云  
生白朮第下失食味第六好熟物第七當歸動氣第八陳散  
大而與力等八証人內言二証下八此方人目的下下  
言用二其他薛立齋所謂飲食勞役而患瘧病等証因脾



水瀉之症五冬散加不香差連  
人其効フ凡症ア水瀉行  
止天湯甚三宜ト特ト必ト効ト

胃虛而久不能愈父云處三着眼又用二之或前三述之通リテ

內傷者父云處三着眼又用二之或前三述之通リテ

湯藥胡人部位三下リテ內傷之藥ハ者ト與トハ同蓋大

十十リ改婦人男子共三虛勞難症三拘テハ此方ヲ長張

三効ヲ得ル下リ婦人三最効下リ又諸辱脫肛人類

瘦人多者三用二又此症ハ黃父云ハ此熱切ハ好ハ

小附子ヲ加ハ三何ハト湯云トハ此附子苦シカテハ

胃空湯回春治脾胃不和腹痛泄水穀不化瀉湯六分

厚朴八分橘皮四分甘草一分意飛猪苓言澤厚疾蒼術桂枝

七八味此方神年無之用之已竟下リ精案津露三見

此方ハ予胃散五苓散ハ金方長ハ八湯食三永飲ヲ帶ハ

者三用二宜ト其他水穀不化ハ下利或ハ脾胃不和ハ水

氣ヲ養ハ此方三用二三回春三治瀉湯湯不方ト太

陰ハ此方三陰陽ハ間ハ此症ハ云ハ此方三二日

養血湯此方治腰痛腿痛筋骨疼痛栗園先生曰今後若遇勞

虛熱身疼時服之

此方



當歸 地黃 秦艽 杜仲 桂枝 茯苓 白芍 牛膝  
 遠志 川芎 甘草 白朮 羌活 獨活 桑寄生 杜仲 桂枝 茯苓 白芍 牛膝  
 此方八元腰腿或筋骨疼痛或血氣不通或筋骨疼痛或血氣不通或筋骨疼痛  
 凡今微毒家種之入剖煉剖之腹或宜已要確黃三子  
 攻擊之極之逐之肌肉筋骨立之疼痛人猶之之痛  
 變之才之者之用之効之也又濕痹之之用蓋道通解去  
 寒熱之目的之此方之疼痛之也  
 腰証方之方集驗  
 當歸 芍藥 杜仲 牛膝 黃芪 蒼朮 地黃 知母  
 黃蘗 杜仲 芍藥 杜仲 牛膝 黃芪 蒼朮 地黃 知母  
 此方補肝氣之經脈之腰以下痛之不起者之初起  
 二効之若津液竭之咳嗽之人症之加味四物湯之  
 與之之且脚氣之痿症之八塊之筋之之濟生腎氣丸  
 大防風湯之類之宜之  
 茵陳湯 同位者下血不止身體萎黃或浮腫者之西之  
 茵陳 荊芥 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉 蒲黃 鐵粉



水瀉之症五者散加不者差速  
人喜功下凡症下(水瀉)初  
止是瀉重宜(慎)心之

右八味  
身軀浮腫、短氣、目眩、シラ行歩スル能ハサルヲ名ス又脾  
榮下血、心氣下者、名ス此方、利水中ニ止、無鎮墜ノ  
意、少寓スル故、運用ニ至意、外人効ヲ奏スル也、  
葳蕤湯、同上、治虛弱微毒、

葳蕤、遺糧、當敏、川芎、鹿角、木通、黃連、甘草  
右八味、微瘡約言、去鹿角、加芍藥、芍藥、近名、麟角、解毒、陽通  
治結毒、  
葳蕤、遺糧、當敏、川芎、鹿角、木通、黃連、甘草

遺糧湯、治微瘡、或身疼痛者、  
遺糧、當敏、大黃、荆芥、防風、赤芍、橫撇、皂莢、  
遺糧湯、治微瘡、或身疼痛者、  
遺糧、當敏、大黃、荆芥、防風、赤芍、橫撇、皂莢、



此方ハ中西家ノ傳ニテ微瘡下疳ノ初起ニ解毒劑ヨリ  
ハ表榮ノ効アリ應ニ易シ又初起ノ骨節疼痛ニ用エ  
毒劇者ハ七賢丸ヲ兼用スヤシ此方土骨皮ヲ僅スルニ  
首アリ先煎ノ傳ニ毒氣頭上ニ上衝スルヲ劇キ者ハ土  
骨皮ヲ主トメ天麻ヲ加ルヲアリ又和方ニ土茯苓ヲ不  
用メ土骨皮ヲ用ルヲアリ功效大抵土茯苓ト相類スト  
見エ

茵陳散 通治骨槽風

茵陳、荊芥、薄荷、連翹、麻黃、升麻、獨活、姜黃、  
細辛、大黃、牽牛子 各十一味  
此方ハ骨槽風ヲ起スルカ主ナレ凡テ牙齒疼痛齒斷  
腐爛ニテ諸藥効ナキ者ニ用エ兼テ上部癰毒上衝シテ  
項背強急スル者ヲ治ス骨槽風ハ難治ノ症ナレ此初起  
此方ヲ用ユル片ハ善治ヲ得ルナリ



呂部  
六物黃芩湯 治心痞腹乾嘔下利主衝者

黃芩 人參 乾姜 大棗 桂枝 半夏 右六味

此方ハ桂枝人參湯ト黃芩湯ノ間ニ位メ上熱下寒ノ下

劑ニ用テ効アリ且黃芩湯ハ腹痛ヲ主トシ此方ハ乾嘔

ヲ主トシ桂枝人參湯ハ腹痛極ナリ表熱アリテ虛寒ニ

屬スルヲ主トス蓋此方半夏瀉心湯ニ類メ下利ヲ治ス

ル効尤捷ナリ

六物附子湯 治四肢氣流注放足太陰經骨節煩疼四肢拘

急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足時々浮腫

附子 桂枝 蒼朮 甘草 芍藥 茯苓 右六味

此方ハ骨節疼痛ノ模樣附子湯ニ似タル其因風濕ヲ

リ来リテ四肢ニ水氣ヲ含ミ惡寒自汗等出ルモノ也畢

竟桂枝附子湯ノ一等水氣アルモノニ用ユ又其水氣表

ニ專ラニメ真武湯ノ内水トハ大ニ異ナリナリ

要具養榮湯 溫疫論 名疾延瀉甚胸膈不清



枳實仁 貝母 知母 橘皮 芍藥 當歸 天麻粉

蘇子 生薑 石菖蒲 人參 黃連

此方ハ熱邪大勢解後痰涎壅塞又精氣振ハサル者ニ用

二竹葉石羔湯ハ餘熱上焦ニアリテ痰ヲ動カス者ヲ治

ス此方ハ胸膈清カラスメ痰壅ヲ目的トス雜病ニハ精

氣振ハス痰腸胸ニアリテ懸痛スル者ヲ治ス

六度煎 南溟名徵毒筋骨疼痛諸藥不効形體虛憊者

芍藥 當歸 黃芪 黃連 附子 虎腔骨 石六味

此方ハ徵毒頑固數年不愈津液之カ爲ニ虛癰骨立或ハ

筋骨疼痛強ト瘰癧ヲ爲ス桂枝加朮附陽ノ類ヲ與テ効

ナキ者ヲ治ス若津液稍緩スル雖毒動カザル者ハ化毒

少量ヲ兼用スル

弄玉湯 南陽理小兒疳症黃瘦腹痛久下食不進者大人心中

痞癰惡心虛悸等可通用

茯苓 桂枝 白朮 甘草 黃連 木香 橘皮 石七



痼疾不止者黃連阿膠湯用之症  
形利湯用之症アリ一清熱一  
溫之ナリ

痢疾腹痛心下痞鞭或便膿血者及每  
食湯下腹直腹心自痛轉泄者可投用  
以下三方即甘草厚心生薑厚心旋覆花  
代赭石湯凡患  
證為厥積聚痛受心膈心下痞鞭惡心嘔吐腸鳴或下利者若大便燥者兼用消塊丸或消物丸凡患之

此方ハ原南陽ノ經驗ニテ現病ヲ治スルノ消痞飲ヨリ  
優レリ但腹痛下利ヲ目的トスバシ若黃瘦腹滿寒熱下  
ル者ハ匡鑑黃芩湯ニ宜シ  
二物解毒湯微痛新書老微癰骨節疼痛  
遺種、金銀花、川芎、薄荷、水瓜、大黃、右六味  
以方ハ山東洋ノ搜風解毒湯ヲ刪訂シタル者ニテ搜風  
ノ主治ト同ニ處ニ用ユル也蓋香川ノ解毒劑ハ一切瘡  
瘍ノ毒ヲ小便ニ分洩スル効アリ諸瘡ノ臭氣ヲ去ルニ  
ハ別メ妙ナリ此方ハ筋骨疼痛ト輕筋甘承ノ毒ヲ解ス  
ルヲ主トメ用ユバシ

波部

半夏浮心湯傷寒 治膈而心下痞鞭腹中雷鳴者

半夏、黃芩、乾姜、人參、黃連、大棗、甘草

右七味子至心虛實門加附子



男子年二十以上吐瀉者一三三心煩之方  
如之方及二三黃花之用之特在腔在丹  
ニテ下入入スル一為之主治す方也

給五岑先生告嘗在甲斐時痢疾流行無不  
嬰患者其症每大便肛門灼熱如火用此方  
後有効今奉此症數得効又治眼目熱赤  
腫痛風淚不止者又為流毒劑並有効也

此方ハ飲邪併結メ心下痞軟スル者ヲ目的トス攻ニ支  
飲或辟飲ノ痞軟ニハ動ナシ飲邪併結ヨリ来ル嘔吐ニ  
モ噦逆ニモ下利ニモ皆運用メ特効アリ千金翼ニ附子  
ヲ加フルモノハ即附子浮心湯ノ意ニテ飲邪ヲ溫散サ  
セル老年段ナリ又虛勞或勞傷等ノ心下痞メ下利スル  
者此方ニ生姜ヲ加テヨシ即生姜浮心湯ナリ又痢病嘔  
吐ヨキ者ニ寒盡藏ノ太乙丸ヲ兼用メ佳ナリト云

白頭翁湯同上 治熱利下重而心悸者  
白頭翁 黃連 黃蘗 秦皮 七四果

此方ハ瀉即ノ熱利ヲ主トス熱利トハ外証ハ真武ナド  
如クハツタリトメ居レドモ裏ニ熱アリテ咽乾ハ渴  
甚シク便臭氣アリテ後重シキハ交テ脇ナシ此症若  
虛弱甚シキモノハ阿膠甘草ヲ加テ用エバ千金匱ニ産  
後トアリ一概ニ拘ルハカラズ此方又傷寒時疫等渴  
甚メ水飲咽ニ下ル時ハ真ニ利スル者ニ宜シ  
半夏散及湯同上 治咽喉痛上衛氣逆者



唯喉腫痛、聲音不出、頸項強痛、惡風寒、  
者以方加枳殼、上姜、魚腹取佳、利、真、  
冰研散、若腫甚、湯茶不下者、刺玉堂、  
血、則咽中聚得、而後可與湯茶、庶不

上卷 雜 應 逢 又

八味丸東洞先生主治、胸下不仁、使  
淋家、候晝夜夢行、便下微痛、居常便  
下、斷或欲上、則已、直口乾咽渴者、約氣  
林、是夫婦人多斷、並宜勞力、又老虛、腰及白  
濁、並小腹痛、不仁、便力、腰脚軟、或痔痛、候頻數者、婦人白淫、甚者、亦宜勞力、尾豐

半夏、桂枝、甘草、右三味、小冷服

以方八冬時寒、中リテ咽喉腫痛スル者、宜シ炙熱惡

寒アリテモ治ス、以症冬時ニ多クアルモノ也、又後世ノ

醫火喉癰トモ云ハキ症ニラ上焦ニ虛熱アリテ咽喉癰

爛ニ痛堪カク飲良咽ニ下ラヌ、甘桔湯其他諸咽痛ヲ

治スルノ藥寸効ナキ者ニ用テ一旦即効アリ、古本草ニ

桂枝咽痛ヲ治スル効ヲ載ム、半夏ノ荳辣ト甘草ノ知緩

ヲ合ヌ其效用ヲ捷ニス古方ノ妙感スルニ餘リアリ

防己、桂枝、防風、甘草、地黃、右五味

以方ハ老人男女トモニ老衰ニテ妄語狂走スル者ヲ治

ズ至暈中風ニ屬メアレハ是ハ失心風ノ類トモ云ベキ

也一老婦面目半巨微腫アリテ心氣樂ム人ニ對スル

ハ落淚愁傷ニ他餘症ナキモノ、以方ヲ用テ全愈セリ

八味丸料、附子一名脾胃虛寒、脈沉而細、身冷自汗、尿利、溺白

次名、黃蘗、足莖、疸、脈弱、口中如小、便濁、目、遠、視、者、効



消渴身熱喘而咽乾不創者山又<sup>山</sup>粉大便  
 燥結腹微痛者并用調胃承氣湯  
 或人微毒者連下數行差之咽暖糜爛者  
 噉ミテ出ニ豆豉瀉骨立ニ都下ニ米リテ藥ヲ諸  
 臣ニ乞フ寸驗也一ホ以方加枳椇豆豉根ヲ與テ結海  
 棠ニ母ヲ并用ニ數日ニシテ聲音智音更咽暖  
 常ニ復テ喜テ歸用之爲

門冬、湯、日上。東園先生曰：按金匱本條無肺痿字，肘後方云：治肺痿咳唾涎沫不止，咽燥而渴，沉明宗曰：余竊擬為肺痿之主方也。蓋本于肘後。

麥門、半夏、人參、甘草、煨承、大棗、右六味或加地黃、阿膠、黃連。治吐血下血虛極者，加地黃或石膏。治咳血及血証後上逆者，加。

或加



此方ハ肘心ニ云通り肺痿咳唾涎沫不止咽燥而渴スル  
者ニ用ニカ酌老也金匱ニ大逆上氣ト計アリテハ覆然  
ナレト云蓋肺痿ニラモ頓嗽ニラモ常嗽ニラモ妊娠咳  
逆ニラモ大逆上氣ノ意味アル處ハ用ニレハ大ニ効ア  
ル故埃四字簡古ニテ深旨アリト見ニ小兒ノ久咳ニハ  
故方ニ石羔ヲ加テ妙驗アリサテ咳血ニ故方ヲ石羔ヲ  
加ルカ先輩ノ經驗ナレト云肺痿ニ變セントスル者石  
羔ヲ日久用ニハ不食ニナリ脉力減スル故子金麦門冬  
湯類方ノ意ニテ地黄阿膠黃連ヲ加テ用ニハ工合ヨリ  
功ヲ奏ス又聖惠五味子散ノ意ニテ五味桑白皮ヲ加テ  
咳逆甚シキ者ニ効アリ又老人津液枯槁シ食物咽ニツ  
マリ腸症ニ似タル者ニ用ユ又大病後藥ヲ飲テ煩ヒ  
咽ニ喘氣有テ竹葉石羔湯ノ如ク虚煩ナキ者ニ用ユ皆  
咽候不利ノ餘旨ナリ

防己黃耆湯 治水病身重汗出惡風小便不利者  
防己一黃芪二甘草一薑朮一生姜一大枣七六味

治風毒腫附骨疽年蹠直爛膿已乾而膿止  
止或痛或不痛身腫瘦削或見赤腫者若  
患下利宜于日更九劑子為佳  
除盡病根要治者足量

仙州府鑑七室是凡附骨疽久不治或治而復發者以毒之根不除也若此者宜割開之口拭易之



男子年六十餘平生身微腫及皮膚黃色  
余以方與之便快利諸証銷退  
秋之曳之能少步久之得方

此方乃與之便快利諸証銷退  
秋之曳之能少步久之得方

此方ハ風濕表虛者ヲ治ス故自汗久シク不止皮表常ニ  
濕氣アル者ニ用テ効アリ蓋此方ト麻黃杏仁薏苡甘草  
湯ト虛實ノ分アリ彼湯ハ脈浮汗不出惡風者ニ用テ汗  
ヲ發ス此ハ脈浮ニメ汗出惡風ノ者ニ用テ解肌メ愈即  
傷寒中風麻黃桂枝ノ方アルカ如シ身重ハ濕邪ナリ脈  
浮汗出ハ表虛スル故ナリ故ニ麻黃ヲ以テ表ヲ發シ  
用テ之ヲ驅ル也金匱治水治痰ノ諸方防己ヲ用ルモ  
ノ氣上ニ運テ水能下ニ就クニ取ル也服後如蟲行及膝  
以下如水云々皆濕氣下行ノ徵ト知ルバシ  
防己茯苓湯口上 治四肢聾聵動水氣在皮膚而上衝者  
防己 黃芪 桂枝 茯苓 甘草 芍藥  
此方ハ皮水ヲ主トスレ氏方意防己黃芪湯ニ近シ但亦  
ヲ去桂枝ヲ加ル者ハ皮膚ニ專ニエテ也一人身體肥胖  
運動意ノ如クナラズ足振掉シ前匠桂枝湯ハ甘實武ノ  
類ヲ投シ或ハ疾ノ所爲トシテ導痰化痰ノ藥ヲ服セシ  
メ更ニ効ナキ者此方ニテ愈又下利久々治セズ利水ノ



治咳血乾煩熱腹痛微重方有又能止衄  
血尾量  
今金加阿膠二兩治吐血內消上乾而  
色如土

骨槽風膿潰後不收口者每以紙蒂心著齒  
根或拔去其遠次入得生也須先拔去其齒  
而後處以方必有効兼用伯州散以梅肉上之  
咽喉結毒腐爛者頭項生結核者宜早  
義氣用此方則咽喉更加腐爛而後漸愈  
後子結瘰癧消即愈

藥ニラ愈カタキ者此方ヲ用テ意外ニ治スルアリ又  
水腫腹堅硬ニメ足ヲ按スニ潤澤ナク譬ハ革袋ニ水ニ  
盛ラ其上ヲサスル如クカサカサシク堅ク腫ルハ湯氣  
ノ脱ナリ此方ニ附子ヲ加ラ効ヲ奏スルヲ有

柏葉湯同上

柏葉 乾姜・艾葉・馬通汁 右四味聖惠治傷寒吐血  
不止去乾姜艾葉加地黃阿膠

此方ハ止血ノ專藥ナリ馬糞水ヲ用テ化開シ布ヲ以テ  
ヲ濾シ澄清スルヲ馬通汁ト云馬通汁ヲ童便ニ換テモ

宜ニ童便ノ血ヲ浴スルヲハ諸氏遺書ニ見タリ

排膿散 治瘡家胸腹拘滿或吐粘痰或使膿血者

枳實・芍藥・桔梗・鷄子黃 右四味合排膿湯為一方

此方ハ諸瘡瘍ヲ排膿スルノ効尤捷ナリ其妙若梗ト枳

實ト合シタル處ニアリ即局方人參敗毒散ニ枳殼桔梗

連用シタル此方意ナリ枳實ヲ散散ニ用當散ヲ下氣

ニ用ルハ古本草ノ說又此方ヲ煎湯ニ治用スルトキハ



前腹中嫩熱疼痛或便血者若大便燥結  
 者加黃芩又治產后下利腹痛者再不已  
 瘦者加心下悸身熱唇口乾燥便血急迫或  
 通身痛者不止者及是  
 留氏曰凡病下物八能之注意之  
 魚腸紫黑之屋漏水等如手物了  
 乃如膿血白頭翁湯如急腹者黃芩升  
 皮湯紫黑色桃枝承氣湯而屋漏也  
 乃水如手了下利之病者大抵  
 到者了了

排膿湯上合方シテ宜シ

白頭翁加甘草阿膠湯口上治白頭翁湯證而有血證急迫者

白頭翁湯加甘草阿膠

此方ハ唯虛極ト云者ハ極字ハ極ノ極ト同義ニラ虚極

甚チラ云阿膠ハ下利ヲ止ラ主トス甘草ハ中氣ヲ扶ル

也外薑厚朴湯ハ石脂皮湯等ノ阿膠モ同意ナリ其他猪

苓湯ノ阿膠ハ水ヲ制スル也人參養榮湯ノ阿膠ハ咳ヲ

止ル也此ト混スニカラズ餘ハ前ノ白頭翁湯ノ條ニ詳

二二

半夏厚朴湯口上治咽中有多痰或吐或心下悸者

半夏、厚朴、茯苓、生姜、蘇葉、白芷味

此方局方四七湯ト名ク氣劑ノ權輿ナリ故ニ梅核氣ヲ

治スルノミナラズ諸氣痰ニ治用ノヨシ金匱千金ニ据

ラ婦人ノミニ用ルハ非也蓋婦人ハ氣鬱多者故血病モ

氣ヨリ生スル者多シ一婦人產後氣鬱喘セズ少シ頭痛

モアリ前証血症トメ芍藥ノ劑ヲ投スルハ不治ナラ



スルニ脈現也因氣滯生痰ノ症トメ此方ヲ與レハ不日  
ニ愈血病ニ氣ヲ理スル亦一段ナリ東郭ハ水氣心胸  
ニ滯メ利シカタク吳茱萸湯ナトラ用テ通利セサ  
ル者及小瘡頭瘡内攻ノ水腫腹脹ツヨクメ小便甚少者  
此方ニ犀角ヲ加テ奇効ヲ取ト云又浮石ヲ加テ膈噎ノ  
輕症ニ効アリ雨森氏ノ治驗ニ單丸腫大ニメ斗ノ如ナ  
ル人其腹ヲ診スレハ必滯水阻隔メ心腹ノ氣升降セヌ  
因テ此方ニ上岳ノ犀角末ヲ服セシムルヲ百日餘心下  
開キ漸々囊裏ノ蓄水ヲ消化シテ瘕又身體巨痛ヲ瘥ス  
ル者ニ氏効アリ此ニ証ニ添テ足テ腹形ヲシク水血  
ニ毒ノ滯滞スル者ニハ皆此方ニテ奇効アリト云宜ク  
試云ヤシ

防己湯<sub>千金</sub>治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者

防己、茯苓、白朮、桂枝、生姜、烏頭、人參、甘草

右八味

此方ハ歷節痛甚シク腫氣ヲ帶ル者ニ用エ歷節痛甚ク

八神湯の主治

東郭曰八神湯の痛方用六其  
目的大柴胡湯ト其以テ因ラ  
先大柴胡湯ト其以テ因ラ  
用ニテ其以テ因ラト其以テ  
症ナリ外ニハ下利盜汗ホアル  
去ニテ其以テ因ラ

或妻久年寒癖痰アリ胸背走痛短氣  
體重飲食異味數匠ラ動ナリ

屈伸シカタキ者ハ烏頭湯ナリ腫氣アリテ痛堪カキ  
者以方ニ非シハ効ナシ

八神湯の上治心腹痞滿莖黃瘦瘠四肢痿弱繚戾

柴胡、芍藥、蜜甲、茯苓、大黃、乾姜、人參、甘草

右八味

以方千金ニ出ツ方名ナク小兒疳積ノ主藥トス然レ氏

慮更ノ分アリ虚癰ノ者ハ匡鑑ノ黃耆湯ニ宜シ其ニ

者以方ヲ用ユベシ心腹痞滿ト莖黃牛足繚戾カ目的ナ

リ黃芪湯ハ寒熱黃瘦腹滿カ目的ナリ又虚寒ノ間ニ

ルモノハ解勞散ノ之所ト知ルベシ

八物附子湯の上治風濕風體痛欲折肉如錐カ所刺

附子、茯苓、薤白、芍藥、桂枝、當歸、人參、乾姜

右八味尚千金方去芍藥干姜加桂枝方アリ

以方ハ傷寒論附子湯ノ症ニ其痛一尋劇シク精氣欠

全ノ者ニ用ユベシ

半夏湯の上主治痰飲辟氣吞酸栗園先生曰老脚氣胃虚吐逆



與ノルニ千金半夏湯ヲ以テ意外ニ効ヲ奏  
 又富源院ノ如ニ  
 千金半夏湯半夏 桂 生姜 甘草 厚朴  
 人參 橘皮 麥門冬 石味 腹痛如絞者

衝心者奇効

半夏 生姜 附子 吳茱萸 右四味去吳茱萸加白朮

茯苓 桂枝 人參 名大半夏湯治痰冷癖飲胸膈中不理

吹方ハ痰飲ノ陰分ニ陷ル者ヲ治スル方ナリ其藥至

テ單捷ニ一中風ノ痰喘壅盛欲脫者ニ天脚氣虛煩ノ衝

心逆不ル者ニ之治用ニ効アリ

肺傷涕千金翼主肺氣不足而短氣咳唾膿血不得臥

人參 炮姜 桂枝 芍藥 紫苑 地黃 桑白 龍糖

右八味 吹方ハ肺痿ノ主方ニテ炙甘草湯加栝樓ノ之處ト竟肖

ヲリ但吹方ハ咳嗽甚シク咳血止マズ不得臥者ヲ主ト

ス炙甘草湯ハ動悸甚シク勞嗽行動スルヲ能ハサル者

ヲ主トス

防己湯產寶治妊婦脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防己 桑白 蘇葉 茯苓 木香 右五味

吹方ハ妊婦ノ水氣ニ用テ意外ニ効アリ其他男女ニ論

婦人五十許、經之不通、赤白帶下、數旬解之、  
余之診、其証、皆曰、後腰疼、手足煩熱、大瘧  
之、腰之、如、心、赤、煩、熱、以、上、之、常、如、  
之、夜、間、之、至、一、時、之、煩、熱、ト、ミ、ミ、失、入、ル、カ、如、  
大、便、難、合、上、白、脈、弱、ク、數、ミ、ミ、神、色、起、居、  
常、覺、ナ、ス、之、巨、衆、方、ヲ、投、シ、テ、寸、効、ナ、シ、余、血、  
分、虧、損、所、為、ト、シ、テ、對、症、良、方、ヲ、交、煎、散、  
ヲ、與、テ、數、日、ニ、ミ、テ、全、愈、病、  
信、言、ニ、準、テ、石、之、癖、大、一、不、ノ、説、ヲ、以、テ、余、辨、  
シ、入、ハ、漆、水、ノ、標、シ、ハ、ト

婦人三十許、頭中津々、舉手、得、ハ、項、背、強、  
急、シ、テ、頸、項、之、能、ハ、起、則、目、眩、倒、レ、ト、欲、  
シ、下、動、悸、アリ、時、々、衝、逆、ス、二、便、飲、食、故、  
如、シ、テ、赤、ス、ル、ノ、數、年、疾、病、ト、シ、之、ヲ、療、ス、  
効、ナ、シ、余、診、白、病、頭、中、ニ、在、リ、目、上、ノ、高、ノ、  
濁、ヲ、肅、清、セ、ハ、病、愈、シ、因、以、方、ヲ、與、テ、  
之、ヲ、專、用、ハ、服、タ、リ、期、々、果、メ、余、又、一、婦、人、  
年、十、餘、久、ク、頭、眩、ヲ、患、シ、頭、上、鐵、數、ノ、繙、ヲ、  
戴、カ、如、ク、頭、ニ、厚、壓、狀、ヲ、シ、氣、鬱、塞、ス、余、前、  
方、及、前、ヲ、與、テ、全、治、

ナク皮水ニ用エバシ

麥煎散、蘇沉、少男、室女、骨蒸、婦人、血風、攻症、四肢、心、胸、煩、壅、

、大黃、常山、萊胡、茯苓、當歸、乾漆、白朮、

、地黃、甘草、小麥、右十二味、

以方ハ、乾血、勞ノ至、藥トス、其人、熱、甚、シ、ク、口、中、臭、氣、マ、ル、

カ、二、便、真、氣、甚、シ、キ、マ、ノ、ニ、用、テ、効、アリ、又、婦、人、瘀、血、流、注、

シ、テ、寒、熱、甚、者、ニ、効、アリ、凡、乾、血、ノ、症、熱、ナ、ク、ハ、羸、瘦、腹、痛、

ノ、者、ハ、桂、枝、桃、人、湯、ニ、大、黃、蠱、蟲、丸、ヲ、兼、用、ス、バ、シ、

半夏白朮天麻湯、試、効、脾、胃、虛、弱、痰、厥、頭、痛、

、天麻、黃芪、人參、半夏、白朮、神麴、蒼朮、橘皮、

、茯苓、麥芽、乾姜、黃蘗、生薑、若、十、四、味、

以方ハ、痰、飲、頭、痛、カ、目、的、也、其、人、脾、胃、虛、弱、濁、飲、上、逆、ノ、常、

ニ、頭、痛、ヲ、苦、シ、ム、マ、ノ、以、方、ノ、至、十、リ、若、天、陰、風、雨、每、ニ、頭、

痛、ヲ、禁、シ、或、ハ、一、月、ニ、二、三、度、宛、大、頭、痛、吐、ヲ、禁、シ、絶、食、

ス、ル、者、ハ、半、硫、丸、ヲ、兼、用、ス、バ、シ、凡、テ、以、方、ハ、食、後、胸、中、熱、

悶、牛、足、倦、急、頭、痛、腫、脹、セ、シ、ト、欲、ス、ル、者、効、アリ、又、老、人、虛、火、



此等中法甘草加黃芪名八物湯名心肺虛損皮脫而毛落血脈虛損婦人月水不期宜益氣和血藥同病解

丹聖玉葉八寶散治肺癰咳嗽吐血痰帶腥臭身熱虛羸  
白茯苓、桔梗、貝母、人參、  
北五味、大肉、胡黃連、熟地、  
水煎食後服

八、眩暈二用、但足冷、目的トスルナリ又濁飲上逆ノ  
症、吐氣甚シキ者ハ呈萊萸湯ニ宜シ若病ヲ帶ル者ハ當

級四逆加呈萊萸生薑ニ宜シ

八

珍湯名竹口元戎治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁

作渴或寒熱昏瞶或胸膈不利大便不實或飲食少思少腹

脹滿等証

即四物湯四君子湯合方

此方ハ即四物湯四君子湯ノ合方ニハ氣血兩虛ヲ目的

トモ何病ニテハ氣血振ハサル者對症ノ藥ヲ加味メ用

工ニシ譬ハ帶下虛憊ノ者ニ牛皮消ヲ加テ特効アルカ

如ク種々治用スベシ

肺癰神湯必讀未成即消已成即潰已潰即愈

桔梗、金銀花、黃耆、白朮、薏苡、甘草、橘皮、貝

母、葶藶、生薑、七十味

此方ハ肺癰湯ヲ用テ初テ虚憊咳血不止者ニ用工若

一等慮脱スル者ハ外臺桔梗湯カ丹聖玉葉ノ八寶散ヲ

驗  
驗切 許文後愚也

概用スバシ  
反鼻交感丹本朝經 驗 老失心及健忘

茯苓、莎草、反鼻、乾姜、右四味臣事 說約云莎草加

桂枝芍藥芫荑丁香名反鼻交感丹然不如以方之簡

以方ハ健忘甚キ者或ハ榮狂後放心シテ痴騷ニ十九者

又ハ痼病ム心氣快ニレ渠マサル者ヲ治ス特野候榮狂

後心氣鬱塞諸言ニハ能ハス殆癡人ハ如シ以方ヲ服ス

ル一月餘一夜來呂博賢會館ニ煙火ヲ見テ怒テ神氣爽

然乎ニ復ス其他數人亦方ニテ治ス反鼻揮霍ノ功稱贊

スバシ

破  
檀湯同上 治腸噎

桃仁、杏仁、桑白、右三味

以方ハ腸噎ヨリハ痰飲家欬喘シテ咽痛スル者ニ効ア

リ破檀ハ咽喉ヲ透達スルノ意ナリ瘡瘍ノ破檀湯ハ調

胃承氣ノヲ謂也

馬明湯同上 治眼疾屬先天遺毒者及熱毒入眼或疳眼等諸



一男年九歲左足股外間腫起如熾痛甚  
 身熱煩渴身體甚瘦足三腫腫  
 匠二三腫瘍トナシ名之痛蓋劇シ余  
 ハ其腫堅硬膿潰一破ナリ時々下  
 逆シ苦痛忍ズカラス竊以爲胎毒流注  
 筋脉舒暢ヲ得ス其毒心下  
 馬明湯ヲ與ハ時々紫赤ヲ以テ之ヲ下ス數日  
 ノ後衝逆止ミ腫痛亦減ス但痛處堅  
 硬ニメ其足運轉不得之因テ芫菁膏ヲ  
 貼シ腐水淋漓腫漸ク消散ストモ屈  
 伸ヲ得ス後當醫蒸氣荷葉熨石ヲ以熨  
 蒸シ終始方ヲ服サシメテ愈焉

馬明鵲証

胡菜 忍冬  
湯 上 治 毒

紅花、石葛根

馬明遠

甘草

右一味

馬 上

明退。大黃。  
氏方去。亡美。爵。

鬱金、沒花、  
金、砒、一切蟲証

石膏、甘草、  
又去石膏。

加草  
乳香 右

名 味 村  
野 齋

忍渴

冬石葛根一僊伍

二  
方  
八  
原  
南

湯傳二

三  
昭  
毒

根  
二  
効

奏了

其内胎毒二  
之方八知因

東郭傳

水淋漓人  
嬰兒胎毒

凡者能  
脇肋ノ

功在

察元

先陰臺

三才圖會卷之六

若陰囊

紅筋牛

子  
 子  
 子

有

者ハ必ス陰囊

紅筋ヲ見

後遂二惡二

傷心發

者忍冬

時連

堯ヲ加テ劬  
ト身痒ヲ養シ

り清川菖軒ノ  
寒熱往來シテ

乾經  
血勞

室女氣

字爵塞  
請

証ニ此後方ヲ用テ數句用タル經水通シ諸症脱然トメ  
愈ト云

發陳湯 德幸 治發熱惡寒上衝頭汗出或下利或如瘧狀發熱  
即差桂湯方中云人多寒加蒼朮茯苓

此方ハ後世ノ藥湯ヤハ葉胡湯三白湯ノ三方ヨリハ  
簡易ニテ治用シヤスシ凡邪氣表裏ノ間ニ位シテ寒熱

頭疼腰痛吐氣アリテ下利スル者風寒暑濕ヲ論セス其  
方ヲ投スベシ

敗毒訓 治川 治痛痺風毒瘟疫類一切眼疾咽痛一切瘡腫疥  
癬

此胡、獨活、桂枝、芍藥、枳實、甘草、茯苓、生薑  
老八味

此方ハ香川秀菴子局方人參敗毒散ヲ刪訂シタル者ニ  
テ敗毒散ノ場合一用ユベシ後ノ十敗湯ハ後世荆防散

敗毒散ノ場合ナリ  
排雲湯 治山嵐瘴氣



勝勝位

香附子

白芍

蒼朮

桂枝

沙參

木通

丁香

甘草

五石脂

三石脂

六腫痛

寒

八

黃連、黃芩、細辛、大黃、車子、甘草、七味或加

茯苓、名、若、芝、湯、逆、氣、上、衝、眼、中、血、熱、或、生、翳

前方八原風眼ノ藥ナレトモ風眼ニハ先大青竜湯加車

前子ニテ癸汗ニ後癸丸ヲ用テ緩下ニバシ其以後熱ノ

輕重ヲ詳ニシ加減涼膈散カ方ヲ與フバシ

八味帶下方ヲ選名濕熱蘊結下臭物ノ類

奇良、當歸、川芎、茯苓、白朮、芍藥、木通、金銀花、大

黃、七味

此方ハ婦人帶下徵毒ヲ兼ル者ニ用テ効アリ若陰中癰爛

疼痛甚ク臭氣鼻ヲ掩フ者ハ甘草丸ニ兼用スバシ本朝

經驗ノ方ニハ帶下ニ廻クバカラザル方也

八味氣方福井氏主名寒疝繞臍痛及脚膝急或瀉丸腫痛

或婦人瘀血ニ塊作痛或瀉戸突出腸癰等凡小腹以下諸

疾屬水閉瘀血者並治

桂枝、桃仁、延胡索、木通、大黃、烏藥、牡丹、牽牛子

右八味臨服點牽牛子末腹痛者去大黃名七味病氣方

此方ハ病氣血分ニ属スル者ヲ至トハ当飯四逆加吳茱  
生薑ハ和血ノ効アリ此方ハ攻血ノ能アリテ虛寒ノ方  
ト又婦人血氣刺痛ヲ治ス福サニテハ小腹ニ瘀血ハ  
塊アリテ脚氣急シ寒疝ノ形ハ如サ者或ハ陰門ニ閉キ  
時心痛ミアリ或ハ陰戸突出スル者又陽離等ニ七用エ  
楓亭ノ織見ハ病ハ本水氣ト瘀血トニ以テ因テ痛ヲ作  
ス者ハ病名トニ故大黃牡丹湯牡丹五等散裏邊散四烏  
湯烏沉湯等ノ藥品ヲ採擇シ一方トサス也此意ヲ體認  
メ用エハシ觀聚方烏藥ヲ烏頭ニ作ル誤也  
肺癰湯南陽治咳唾腥臭口吐膿或如米泔胸肋間隱痛或微  
背脊枯氣急ヲ能臥者  
桔梗 杏仁 枳實 白茯苓 貝母 黃芩 甘草  
右七味一方吳黃芩有生薑  
此方ハ原南陽ノ創意メ肺癰初起ニ用テ特効アリ若実  
熱胃痛甚シキモノハ柴胡枳實湯加葶藶ヲ用テ清解ス  
後此方ヲ與フハシ與膿多者ハ癰肝散ヲ兼服スベシ



公散 治心經虛熱 肺府閉結 小便赤  
 洪 陰肉不道 及泄 淋血 淋如酒色  
 悲怒而得者 則小便頻數 而出而痛 既  
 出而痛 以此藥主之  
 大黃 薄芩 本通 滑石 帝禹 蟾  
 槐子 車前子 甘草 合黃 加八味

一男子一身悉腫 小便通 大便下 惡藏  
 齒 齒之 飲食 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲  
 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲 欲

肺病方 提耳 治胸水

通草、羊夏、檳榔、桂梗、木香、丁香、防己、猪苓  
 澤厚、七九味

此方北尾春甫經驗 出 小兒疳水 肺部屬スル者  
 方名ス是ヨリ運用シテ大人肺部ニ屬スル水氣ヲ治ス  
 支飲ノ候アリハ苓甘姜味辛夏仁黃湯加葶藶ヲ主トス  
 若虛候アリハ坎方力宜キ也  
 散局治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇腕  
 小腹疝氣及婦人經痛並皆治之  
 砂仁、桂枝、丁香、三錢、藜蘆、青皮、白朮

仁部

人參湯 金匱 治心下痞 腹中不便 或急痛 或胸中痞者

人參、白朮、乾姜、甘草 七四味

此方ハ胸膈之虛症ヲ治スル方ナリ 凡理中丸ヲ為湯ノ  
 意ニテ中寒霍亂スハテ太陰吐利ノ症ニ用テ宜シ 厥冷

者ハ局方ニ從テ附子ヲ加ヘシホ附ト伍スル片ハ附  
 子湯真武湯ノ意ニテ内濕ヲ驅ノ効アリ 四逆湯トハ其

惡精異ナリ四通湯ハ即下利清穀ヲ以第一ノ目的トス

以方ノ行處ハ止利ヲ以目的トスル也  
人參散聖惠治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡臥四肢煩痛各  
乾卷五

麥門、人參、芍藥、柴胡、茯苓、黃芩、牡蠣、蟬甲

甘草 七九味 柴胡、芍藥、人參、茯苓、牡蠣、蟬甲、

以方ハ虛熱盜汗カ目的ニテ骨蒸勞熱人初起柴胡、姜桂

湯ヨリハ一等虛候人者ニ用エハ咳嗽甚者ハ五味子

ヲ加ルナリ

人參當歸散局方治產後去血過多血虛内熱心煩短氣頭痛

體痛

麥門、桂枝、人參、當歸、地黄、芍藥、續命、竹葉

七八味

以方ハ產後内熱虛煩ヲ主トス產後ノ三ナラズ血虛煩

熱頭疼體痛ノ者ニ宜シ又竹葉石羔湯ノ症ニテ血虛ヲ

帶ハ以方ヲ用ルナリ以方ノ一等輕者ヲ甘竹筴湯



一婦人三年不認一月內或一二日乃以為  
脫胎類與人參養榮湯易表葛而愈

東郭曰東方夏月此湯宜先  
服之

トス

人參養榮湯局方治脾肺俱虛發熱惡寒四肢倦怠肌肉消瘦  
面黃短氣食少作浮若氣血虛而發見諸証莫能名狀三因  
名御局人參養榮湯云治肺與大腸俱虛致嗽下利喘急少  
氣嘔吐痰涎

即十全大補湯方中無川芎有遠志橘皮五味子

此方ハ氣血兩虛ヲ主トス此ハ十補湯ニ比スレハ遠志  
橘皮五味子アリテ脾胃ヲ維持スルノ力ヲ優トリ三因

ニハ肺與大腸俱虛ヲ目的ニテ下利喘急ニ用テアリ萬  
病トモ其意味アリタル處ニ用ユヘシ又傷寒壞病ニ先輩

灸甘草湯ト此方ヲ使ヘ分テアリ熟考スヘシ又虛勞熱  
有テ咳シ下利スル者ニ用ユ

人參養胃湯局方治外感風寒內傷生冷發諸証

厚朴、蒼朮、半夏、藿香、草薢、茯苓、人參、橘皮

烏梅、甘草、生姜、右十一味

此方ハ不換金正氣散ヨリ脱化シ来テ脾胃ヲ健運シ耶

截瘧后脾胃虛弱  
飲食不進者等宜  
人參養胃湯

全書醫林秘傳見右葉參

氣ヲ閉達スルノ効優ナリ故ニ瘧邪虛ニ屬スル者ヲ老  
之ルノミナラズ凡テ老人ナト胃中濕滯アリテ虛熱ヲ  
醸シ飲食進マザル者ヲ治ス又葉胡黃芩ヲ加シ小兒疳  
癖ノ症寒熱有ラ瘧ニ似タル者ヲ老入淨府散トハ虛寒  
ノ別アリト知ベシ

人參養胃湯聖濟治肺痿咳嗽有痰午後熱並声嘶者  
葉胡、桑白、向膠、桔梗、貝母、杏仁、茯苓、五味  
子、人參、甘草、枳實、右十一味袖珍名養肺湯  
此方古名ニ從ハト袖珍ニ養肺湯ニ作ルカ的切ナリ  
字肺痿ノ熱症ヲ老スル此方ニ如クナシ若一尋熱候  
甚者ヲ秦艽扶羸湯ト又一尋虛スル者ヲ却勞散ト  
此方ニ云々名熱声嘶扶羸湯云々寒熱声嘶不出却勞散云  
微嗽有唾々中有紅線名曰肺痿皆肺痿ノ主方トスハシ  
又今所謂虛勞ナル者ハ古ノ肺痿ナルヲ知ヘシ

人參飲子十便治陽毒傷寒四肢壯熱心煩嘔吐不止  
即小葉胡陽方中加麥門竹葉劉莊山曰潮熱不解者加漿



甲強効 咳嗽 肥杏人 熱甚 加石 黃連

以方ハ小葉胡湯ノ一葦熱甚シク煩渴嘔吐止マサル者

ヨリ治ス咳嗽ニハ杏人ヲ加潮熱スルニハ漿甲ヲ加往年

麻疹後ノ勞熱ニ用テ特効アリ其他諸病ニ通用スヘシ

人參養榮湯 溫疫論 治下後肢體振戰怔忡驚悸眩暈胃脘

衣摸床振空等大虛之証

人參、麥門、五味子、地黃、芍藥、芍藥、芍藥、知母、橘

皮、甘草、左九味按生脈散四物湯合方去川芎加知母

橘皮甘草

以方ハ生脈散ニ四物湯ヲ合シ川芎ヲ去テ知母橘皮甘

草ヲ加ル者也總虛症ノ疫ニ用ユ又溫疫大勢解後調理

ノ劑トナスヘシ蓋又可ハ人參嫌ル人故菱ノ使用古方

トハ相違ス

思冬化毒湯 溫疫救 放點 雖醫顯症克肥根脚鬆明而飲食進

神清爽者要伏藏之毒宜以陽榮園先生曰諸瘡毒在血分

者以方最捷不特瘡毒也

本草綱目卷之六

忍冬、連翹、牛蒡、荆芥、牡丹、桃仁、茯苓、水通

甘草、七九味、吾門、今補忍冬、解毒湯、保赤、解毒散、有片、風

無此、丹、桃仁、茯苓、  
以方八、三浦、安貞、痘、計、用、工、氏、勉、体、血、分、涉、リ、ク、膿

水、淋、瀉、ス、ル、腫、物、ニ、治、用、メ、宜、シ

人參、胡桃、湯、治、寒、名、疾、喘、經、驗、秘、方、云、治、氣、壅、滯、喉、下、結、作、成

塊

人參、白、胡、桃、肉

桔梗

石、二、木、或、ハ、加、訶、子、甘、草、治、小、兒、馬、脾、風

決、方、ハ、急、喘、ヲ、治、ス、ル、効、尤、捷、ナリ、ト、ス、凡、ニ、胡、桃、ハ、肺、氣

ヲ、潤、ホ、シ、声、啞、ヲ、治、ス、故、ニ、小、兒、馬、脾、風、喘、鳴、声、啞、虚、候、ニ

屬、ス、ル、者、ニ、訶、子、桔、梗、甘、草、ヲ、加、テ、効、アリ、又、驚、癇、後、或、ハ

産、後、或、老、人、ノ、声、啞、凡、テ、肺、虚、ニ、屬、ス、ル、者、ニ、以、加、味、ヲ、用

テ、効、ヲ、奏、ス

二角、湯、并、朝、經、驗、治、癰、腫、  
即、四、物、湯、方、中、加、鹿、角、炙、手



加味四物湯ノ各ヲ見ヲ

此湯ノ病疾后、腫氣、大黃、加ラ用エ  
高ナリト留法也

此方、婦人腰痛甚ク、兩脚急、痿軟シテ、歩行スル能ハサル者  
ヲ治メ、効アリ、痿痺、陽ハ凝結ヲ融解シテ、治血スル能  
アリ、此方ハ治血メ、筋骨ヲ強壯ニスル、効アリ、何レモ  
伯仲ノ間ト知シ

女神散家方治血証上衝、眩暈及產前後通治之劑

當歸、川芎、桂枝、白朮、木香、黃芩、黃連、人參、  
甘草、芍藥、大黃、檳榔、丁香、白朮、芍藥、加苳達根、芍藥、地黃、沉香、細辛、名清心湯  
此方ハ元安榮湯ト名テ、軍中セテ氣ヲ治スル方也、全家婦  
人血症ニ用テ、特驗アルヲ以テ、今ハ名トス、世ニ稱スル実  
母散、婦人湯、清心湯、皆一類ノ藥ナリ  
人參、清肺湯、助胃、虛寒、咳嗽、喘急及勞嗽、桑白、地骨皮、人參、  
阿膠、生薑、知母、烏梅、甘草、咽乾、口燥、入薑子一枚

保部  
此方學子湯、婦人、治身体腫、腹中有動、渴而不便不利者

牡蛎、澤浮、拾葉根、蜀漆、葶藶、商陸、海藻

右七味実者加地黄

此方腰以下ノ水氣ヲ治ストアルに腰以上ノ水氣ニ用

テ効アリ其之ヲ所ハ虚実間ニアル者ナリ若実スル者

ハ地黄ヲ加ベシ劉教授虚庭ノ経験ナリ此方服シカタ

キ者ハ傷寒五法ノ澤浮牡蛎湯ヲ用ユヘシ

奔豚湯全實

半夏、葛根、芍藥、當歸、川芎、黃芩、李根皮、甘

草、生姜、右九味

此方ハ奔豚氣ノ熱症ヲ治ス奔豚ノミナラズ婦人時氣

ニ感シ熱アリ血氣少腹ヨリ衝逆スル者即効アリ獨嘔

菴奔豚氣必シテ奔豚湯ヲ用スト謂ヒタルト余門ニテ

ハ奔豚湯必シテ奔豚ヲ治スルノミナラズトモ治用ス

ルナリ

奔豚湯時左療卒厥逆上気々又兩脇心下痛滿菴々欲絶以

謂奔豚病



此方ハ前湯ノ熱候ナキ處ニ用ユ且虛候アリ方中ノ姜  
萊蕪一切氣急アル者ヲ治ス腹症奇賢翼ニハ積聚ノ套  
劑トス故ニ一切ノ積氣ニ因テ下ヨリ心下ニ升リ痛シ  
或ハ嘔ニ呼吸短氣死セント欲スルヲ治ス  
補肺湯千金治肺氣不足逆滿上氣咽中肉塞短氣寒從背起

一ト如含霜雪言詔失声甚者吐血  
五味子、桂枝、麦門、大棗、瘦朮、桑白、欬冬、乾  
姜、右八味

此方ハ麦門冬湯ハ一層咳嗽甚シキ處ニ用寒從背起  
中如含霜雪ト云カ目的ナリ肺痿熱候ナキ症ニマ、ア  
リ甘草乾姜湯ト參照ス一ト一説ニ此症必頭頂冷テ咳  
スル者也ト云又柴胡姜桂湯モ水飲ナキ候ニ用テ効  
リ然レ氏彼ハ熱アル者此ハ熱ナキ者此ヲ分トスル也  
補血湯誠効治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲脉洪大而虛  
黃芪、芍藥、右二味血虛脾胃不足者合ニ君子湯妙也

方本出千金名當飯補血湯

此方ハ試効方ニ白虎湯疑似ノ症ヲ治スルヤウニ論ス  
レ氏其奥ハ唯浮泛ノ血熱ヲ治スル耳四物湯ナド及テ  
泥戀シラ服シ兼ルモノニ用テ効アリ脾胃不足ノ者六  
君子湯ヲ合メ八珍湯ヨリハ及テ提効アリ  
補中濕治陽臣林治腫脹補中行濕利小便  
人參、蒼朮、茯苓、橘皮、麥門、當歸、木通、黃芩  
厚朴、升麻、右ノ味按治生全書要當歸木通升麻有澤  
浮白朮名補氣健中湯治鼓脹元氣脾胃虛損宜補中行濕  
利小便切不可下  
此方ハ補中行濕ノ腫脹ヲ去ノ牛段面白ヲ用ニ場アリ  
一資道三氏屬經顯ヤシ故一漢ノ立方ノ様ニ謂ハトモ  
臣林集要ノ方ナリ又治生全書ニ當歸木通升麻ヲ去リ  
澤浮白朮ヲ加テ補氣健中湯ト名ケ頭脹ヲ治ス目的ハ  
同意ナリ

撰

柳、陽李朝經、腹痛風痛、鶴膝、痺風、毒腫、並皆治之



或人脚氣ニ患脚弱起步スルハ飢ハス如シ  
數日名ヲ効ナシ概々痿痺トシ斷シ去ル先  
生診スルニ腹裏拘急少腹丸甚シク按之而  
脚ニ牽テ痛足ニ委中筋脉凝固ニ屈伸  
不能ハス時ニ腰脇宛痛ハ先生斷シテ病  
ヲ為所トシ補腎湯ヲ與ヘテ遂ニ全愈ス

有特氏曰麥芽二三兩炒熟水煎服之  
止乳甚速動輒服云又銘丹ヲ解キ  
乳傷ニ逆リハシ大抵是ニテ止セリト

此方ハ和製ニテ諸家ニ類方多ク有病風々毒徵毒ナト  
 ナ骨節疼痛荏苒トメ諸漢方ノ効ナキ者一向ニ專用メ  
 意外ニ効ヲ奏ス土骨皮最主藥ナリ分量大劑ニメ用ユ  
 ベシ土骨皮ノ効ハ前遺糧湯ノ條下ニ辨ス

古三  
昭月  
不方

食病徵積聚編治腰痛諸治與効者

上攻舌胎不食疳微積聚編治腰痛諸治奧効者

此方ハ疝癰積聚篇ニ云出テ疝積ノ主方トス吾門ニテ

大 三 暖 湯ノ 症ニ ヲ 虚 寒ニ 属スル 者ニ 用テ 大ニ 驗ア

リ又老人固冷ノ症ニ空氣ヲ帶アル者極テ宜シ

沉香 人參 蒼朮 茯苓 黃耆 木瓜 乾姜 附子

蘇葉 川芎 甘草 獨活 白十二味

蒲公英湯與方函懷乳劑

卷之四

釀乳凡瘡產台百日間不乳者服  
此方無不神驗 熊野宮方

本通葉 宋 杜氏 麥門冬

右米糲米九兩黃芩炙大豆八十五  
九日夜三服白湯送下如服中奇服  
忌五辛青芽類又嫌他煎湯同用

容時方及天不食乳者服此方  
天不食乳者服此方

蒲公英 當歸 芍藥 牡丹 薯蕷 右五味  
釀乳ノ劑諸家數方アリト雖此方尤簡ニメ効アリ乳泉  
散ノ其功伯仲ス蒲公英ハ春初嫩葉ヲ羹ニメ良メ釀乳  
ノ功アリ

邊部

賢甲散聖惠治脾勞四肢疼痛不思飲食粟園先生曰治虛勞  
煩熱下利不思飲食者効

賢甲 芍藥 當歸 茯苓 川芎 木香 柴胡 白朮

黃芪 甘草 人參 右十一味

此方骨蒸下利不思飲食者ニ用テ一旦効アリ又一通

小人虛勞熱有下利ニ下利スル者ハ局方人參養榮湯ニ

宜ニ聖惠ニハ治脾勞トアリ氏直ハ脾勞ニハ人參養胃

湯力加味平胃散ノ類ニ宜ニ脾勞ハ外臺ノ説ヲ古義ト



平胃散簡要治胃氣不和調氣進食

蒼朮、厚朴、橘皮、甘草

右四味加芒硝治產后胞

衣不下者加硫黃治小兒蟲証腹痛啼哭者俱妙

水方後世家八種美スレバ顯功ハナシ唯金匱橘皮大黃

朴硝藥味方ハ輕症ニ用ヒ或湯食備急圖ニテ快下ノ後

調理ニ用テ宜シ凡テ食後食化セム心下ニ滯リ又食後

腹鳴リ下利スル片ハ及テ快キ症ニ用但胞衣ヲ下スニ

芒硝ヲ加小兒蟲症腹痛啼哭ヲ治スルニ硫黃ヲ加ル力

如キハ理外ノ理不可周ノ妙ヲ寓スルモノナリ

變

製七氣飲辨醫治水箭諸狀心下悸而又硬胸脇痞拘膨脹

四肢沉重或解你或微腫或麻痺或拘攣腰脚引痛背脊強

急或吞酸或噦噯或小便難心下滿或目下微腫或額與目

下其色黑心志茫然不樂頭痛目眩不熱等証

桂枝、茯苓、半夏、不通、桑白、檳榔、蘇子、驚風

甘草、枳實、吳茱萸、右十一味氣虛水勢稍甚者加附

心下水塊錙成窟窠者加犀角

桂枝、半夏、桑白、檳榔、蘇子、驚風

產後瘧疾ヲサント欲スルハ早ク此方ヲ用ユ  
已ニ瘧疾ヲ具スルハ故荆場ノ額角ニシ

獨  
治葛根湯外臺療柔中風身體疼痛四肢緩弱欲不隨產後

土部

此方ハ寶慶集分心氣飲ノ愛製ナレ其方及テ古ニ近  
シ就中水瀉ト云カ此方ノ目的ニテ其源ハ支飲ヨリ種  
々ニ變化シタル症ニ用テ効驗著シ  
平肝飲 標定治左脇下痞滿宗筋怒脹不快栗園先生曰此方  
優於回春平肝氣飲數等  
羌胡、芍藥、芍藥、芍草、青皮、鱉甲、檳榔、莪朮、吳茱  
萸、甘草 右九味  
此方ニ羌胡疎肝陽ト外臺治寒冷瘧飲方トノ愛製ニシ  
左脇下ノ痞滿カ目的也蓋延年半夏湯ハ痞滿左脇下ニ  
リ上肩背ニ迫ルヲ主トシ此方ハ宗筋怒脹牽痛ヲ主ト  
ス標定蜀教論ノ工夫ニ又回春平肝氣飲ニ以テハ  
延年古方也



武端先生肩背拘急痛起卧轉側不能  
全治ス又先生右肩背強痛首之カ為ニ  
優キ使仰スル解ハス後治効ナシ先生以方  
ヲ與ハ黃蘗天花粉天南星ノ末ヲ貼ニ數日ニ  
シテ諸症旧ニ復ス後現ハ瘰癧ヲ生シ時々  
咽嚥腫痛ハ先生鼻前消毒飲ヲ九トシ  
長服セシメテ愈攝

武端先生肩背拘急痛起卧轉側不能

桑中風亦用此方

即葛根湯方中加地黃獨活

此方ハ肩背強急ノ桑中風ノ証ヲナシ或臂痛掌急惡風

寒アル者ニ宜シ蓋其症十味到散ニ彷彿シラ血虛ノ候

血熱ヲ挾ク者ニ宜シ

透膿散 正宗名癰疽諸毒内膿已成不穿破者宜服之立決

黃芪、穿山甲、川芎、當歸、皂角刺、石臼味

此方ハ内膿已成不穿破者宜服之立決

リ其力更優ナリ瘰癧内攻セシト欲スル者ニハ反鼻ヲ

加テ効アリ諸瘍トモ以意ニテ活用スヘシ

騰龍湯 本朝經驗消痔散腫

即大黃牡丹湯方中加蒼朮薏苡甘草

此方ハ竹中又輔ノ家方ニテ痔毒ヲ消シ膿痛ヲ治シ即

大黃牡丹皮湯ニ蒼朮薏苡甘草ヲ加ル者ナレハ腸癰便

毒諸瘍ニ名用スヘシ

洞瀉飲 產婦主治吐血衄血或手然胸痛者病得之寧惡而其

氣暴逆也

柴胡、黃芩、黃連、茯苓、半夏、芍藥、青皮、甘草

生薑 在丸味

此方ハ賀川子云ノ創意ニテ血氣暴逆ヲ治スル方ナリ

氏畢竟ハハ柴胡湯ノ症ニハ肝氣暴逆或吐血胸膈拒痛

スル者ヲ治ス傷寒熱下利ニ用テ宜シ

土骨皮湯本朝經醫治頭痛瘡

土骨皮 紅花 甘草 柴胡 茯苓 芍藥 七五味

此方ハ頭痛瘡ノ証諸下劑ヲ用テ効ナキ者ヲ治ス骨皮一

名樸樹能發表ニ故ニ頭痛骨痛ヲ治ス蓋頭痛瘡發熱寒

ノ表症ナリハ葛根湯加艾葉行ニハシ若頭痛起

發ノ熱ナキ者ハ此方ニ宜シ

或人年七十余頭瘡數年愈ハズ心下痛アリ或夜間發熱眠ル能ハズ發治効ナシ先生此方ヲ予弟ハ七宝丸ヲ用テ愈ス

若骨蒸勞熱咳而上氣衄血唾血燥渴煩悶不能眠者天聖

竹葉石羔湯部寒



猪苓湯之滋陰  
小腹急結而尿血  
其功如神

男子尿血三升  
有五六日之久  
如神

猪苓湯照濁不通  
頭腫痛少腹膨脹  
痛者若甚中痛  
張血出者兼用  
滑石散

淋瀝者以三錢  
針註之刺腫處  
放出瘀水而

後用藥方腫痛  
立消小便快利  
若一身急腫

者則正者宜  
越過如戒陽  
南郭伯氏曰

或人年二十  
尿血三升三  
年發則小便

淋瀝之痛忍  
之思入血脈  
骨立之根

匡錯者生東  
又先生以方  
加甘草與五

亂髮霜一味  
溫酒三三送  
下又旬日

出ラシラ全  
愈極

竹葉 石燕 麥門 茯苓 半夏 人參 甘草 石味  
此方ハ麦門冬湯ノ一萐熱候リリヲ煩肉ヲ氣或ハ吐渴  
咳嗽スル者ヲ忌メ同一石劑ナレバ此方ト竹皮大丸ト  
ハ上焦ニ專ニ白虎湯ハ中焦ニ專ラ也麻杏甘石ト越婢  
加手夏トハ肺部ニ關係シ大青龍ハ特リ表熱ニ專ラ  
ス其方參照メ區別スハシ又張路玉ノ冠驗ニ病後虛渴  
メ小便赤キ者ニ宜シト云今參胡芍藥湯ナトラ用テ其  
熱解セムハ便ノ色トリワケ赤キ者此方効アリ又麻疹  
ヲ治スルニ此方始終貫テ用テ場アリ體認スハシ  
猪苓湯内上焦便利或淋瀝渴欲飲水者  
猪苓 澤瀉 茯苓 滑石  
右五味或加車前大黃治尿血重者兼用黃連解毒湯或苦  
苡方ハ下焦ノ高熱利尿ノ專劑トス若上焦ニ耶アリ或  
ハ表熱ナレハ五苓散ノ証トス凡利尿ノ品ハ津液ノ叙  
別ヲ主トス故ニ二方俱ニ能下利ヲ治ス但位置異ナル  
ノ三味方下焦ヲ主トスル故淋疾或ハ尿血ヲ治ス其他

匡錯者生東又先生以方加甘草與五亂髮霜一味溫酒三三送下又旬日出ラシラ全愈極

一男子血淋ヲ患ルニ三年一日血大ニ出其痛忍バカク已ニ三升ニ達リテ目眩テ人事ヲ知ラズ即チ死シタリ

一婦血熱甚シク頭痛破ルカ如ク兩目眩セシト飲シ唯ハ飲食口ニ納ム能ハス但渴シテ冷水ヲ飲スト一医外感トシ灸灸メ痛益甚シテ其方ヲ示シ別ニ石膏鉛丹薄荷精ノ研末ヲ以冷水ニトキ額前ニテ目ノ四邊ヲシメ一晝夜ヲ経テ頭痛大ニ減飲食進ムヲ得タリ

一婦一日暴熱ヲ發諸證煩乱吐衄一晝夜ヲ納ム一洋區外感トシテ療シテ其甚余ヲ迎テ珍ヤシム余曰血熱ナリト其方ヲ授ニ三日一愈

水腫実ニ屬スル者及下部水氣有テ呼吸常ノ如クナル者ニ用テ能功ヲ奏ス

竹皮大丸料 全遣

竹皮 石羔 桂枝 甘草 白薇 古五味

此方ハ血熱甚ク煩乱吐逆諸藥口ニ納ム能ハサル者

ニ哥効アリ白薇ハ能血分ニ之ク千金婦人門白薇ノ諸

方徴スルニ本事方治血厥白薇湯モ同意ナリ又小豆方

ヲハ桂枝加竜骨牡蠣ノ桂ヲ去白薇附子ヲ加ニ加龍

骨湯ト名ケ虛弱浮熱汗出者ヲ治ス

竹葉湯同上

竹葉 葛根 防風 桔梗 桂枝 人參 甘草 附子

大棗 生姜 七十味

此方ハ產後ノ中風虛熱頸項強急瘧病ヲ療セシト欲ニ

凡者ニ用九藥ナシ氏老人ナトノ虛熱上部ニ着キ頭痛

患寒微暖アリテ連綿日ヲ経ル者ニ與テ意外功ヲ奏ス

竹葉黃芩湯千金治精極更熱眼視無明齒焦髮落形喪體痛



通身虛熱

竹葉、黃芩、茯苓、麥門、芍藥、地黃、大黃、甘草

生薑、右九味

以方八竹葉石羔湯ノ証ニ又一等虛熱甚シク齒焦髮落

ト云如ク血燥ノ症アリテ大小便十ト短澁ニ形容枯槁

人ニ氏思ノ外維持ノ力ナル者用テ効テ事

腸癰腸門上治腸癰潰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食不

味面色痿黃四肢無力睡臥不安者栗園先生曰治婦人帶

下不止者

牡丹、甘草、敗醬、生薑、茯苓、薏苡、麥門

丹參、芍藥、地黃、右十一味

以方八腸癰ニテ大黃牡丹湯十ト用攻下ノ後猶氣虛敗

四肢無力メ餘毒未解腹痛淋瀝不已者ヲ治メ以意ニテ

肺癰ニ虛症臭膿未已而色萎黃ノ者ニ運用メヨシ又後

藤良州ノ証ニ云如ク痼病ハ腸癰ト一般ニ見做シテ痼

後ノ痼毒ニ用ルテ又婦人帶下ノ証疼痛不已腫

臥不安數日ヲ經ル者勝癰ト一揆ト見做シテ用ル

治脚氣冷毒肉心下堅背膊痛上氣欲死方外臺

吳茱萸、檳榔、木香、犀角、半夏、生薑、三七、味

方ハ唐侍中一方ハ証ニハ吐下リ上氣欲死者ニ用

二吐氣ハ新撰方角旋覆花湯ニ似タシ氏旋覆花湯ハ水

氣上部ニ盛ニ錐テアリ方ハ水氣表ニ見シス濕毒直

ニ心下ニ衝テ吐之ル者ニ宜シ

治腰膝脚連脚酸疼者方同上

杜仲、獨活、地黃、當歸、川芎、丹參、右ニ味

方ハ脚氣腫痛ハ後痿弱酸疼ニ七者ニ宜シ後世ニテ

ハ思仙續斷圖ナト用上ニ此方ノ簡便ニテ捷切アル

ニ如ク若腫氣残リテ麻痺疼痛スルモノハ四物湯加蒼

朮木瓜薏苡仁ニ宜シ又此方ヲ腰腿風ニ用ル

沉香降氣湯局方治陰陽逆氣不升浮胸膈痞塞喘促嗜臥



或又胃逆致嘔不愈氣膈極り自う起  
臥スル筋ハ脈沉微四肢微冷腹中虛軟脂  
二腹水ヲ吐シ振寒ハ余救食ヲ断シ日々  
苦向麦餅和少訶ラ咲ハシメ揚氏一  
香英タマ湯ヲ與フ時漸ク止精氣稍復  
或人飯多吐ハ証ヲ違ヒ宋臣ヲ結シ治ス  
之狀既微腹中暗鳴飯長知ルルノ節ハ又腹中  
切痛ヲ奏スルハ忽清水ヲ吐スルノ升餘面色  
切痛未止安ヲ散ラ與テ之痛安稿

身體枯瘦而胸微腫下り先を飯及飲ニ食シ高き麵ヲ許シ食ベシノ後方ヲ與ヒ水止メテ

加味浮心湯 宗良撰方 半夏 神曲 直參 黃連 干姜 縮砂 木香 甘草 或去神曲九葉不 癖囊主方

或見發熱吐乳不止千金菴胆湯與熱解  
吐乳依然然多引粥湯痢ヲ祭ヤントム余大ニ懼  
惑ノ時偶爾堂軌範ニ見メテ讀楊氏名  
吐乳一方ヲ得其藥相適スルヲ喜用之  
三日其効神速ノ如シ余固怡然先生曰小兒  
吐乳更ニハ省ハル莫ク花合奇効處  
ニハ者以方ヲ用ヒ止メサル者靈砂丸ヲ  
用エト云

敗血水腫ニ此方。東洋琥珀湯。  
新修治敗血一方。桂枝丸。黃連散。  
東洋治水腫動脈一方。調經散。

人者ヲ治ニ生薑得心湯ヨリハ一等虛候ニメ久積陳寒  
ニ屬スル者ニ宜シ  
此乳一方知各新書

蓮肉 干薑 人參 右三味

此方ハ小兒胃虛ノ吐乳ヲ主トス又大人禁口痢ノ吐逆

運用スルニ若吐乳ニ下利ニハ者ハ錢氏白朮散加

木香ニ宜シ

治婦人經水不通即化黃水ニ流四肢則遍身皆腫名曰血分

便作水治之恐喪命 本事後集

人參 茯苓 當歸 瞿麥 大黃 芍藥 桂枝 黃蘗

右八味

此方ハ血分腫ノ至方ナリ血分腫トハ王秉甫力惠濟方

云婦人經滯化爲水流走四肢悉皆腫滿名曰血分証與水

腫相似區不能審輒作水腫治之誤也ト是ナリ若虛候

リテ此方ヲ用カバ中ノ八寶慶集ノ調經散ヲ用エハシ

況舊四磨湯家實治冷氣攻衝心腹疼痛

分





沈香飲

原朴ヲ加味シテ

一僧云三十二重シトシ腰痛久シハ解  
心ノ腰ノ下極度歩ム心ノ身ノ熱  
脈細數咳喘短氣ハ腎虚以テ身ノ勞  
トシ解シ去ルハ示シ謂テ血氣ノ衰マ  
ス血脈衰テ失スハ致ス所眞ノ腎虚勞  
瘵ニ非スト一意ニ其方ヲ投シニ味生  
洋丹ヲ兼用ス服之ヲ諸症漸ク愈

伸ノ脈沈弱ナリヲ用テ妙ナリ一婦人不長怔忡胸中水  
冷眩暈足冷ニ興テ得大効此水寒痰胃中ニ塞リテ有  
リ奔豚ル下ナシハ胸中ノ冷氣ニ着服メ能定スニシ

沉香 木香 蘇合子 枳實 七味

此方ハ腹脹氣喘ノ症諸藥効ナキ者ニ用テ宜シ虚スル  
者ハ防子ヲ加テル有

紅麋ニ味丸科心法治腎虚發熱

即ニ味地黃丸方中加知母黃蘗景岳名滋陰八味丸

此方ハ滋陰ノ劑ニテ虚熱ニ用ユ又腰以下血脈ノ煩熱

酸疼スル者ニテ用ユ先哲ノ説ニ腎虚ヲ治スルニ二ノ

心得アリ所謂腎ニハ水火ノ二ツ有テ其中人ノ性ニヨ

リ水虧テ火ノ盛ナル者アリ輕キハ坎方重キハ滋

陰降火ノ理ヲ用ユ又大衰テ水泛濫スル証アリ是ヲ八

味丸トス坎兩途ヲ辨メ坎方ノ之處ハ真水力乏クメ命

門ノ火ノ亢ル症ト心得ヘシ





スル者龔氏格別ノ趣意ナルヲ深ク味フバシ  
治小兒愛吃泥方同上

黃芩、橘皮、白朮、茯苓、甘草、石羔、胡黃連、使

君子、右八味

此方ハ吃泥ノミニ限ラズ小兒喜テ壁土瓦坏線香生米

茶葉十ドヲ食シ肚大青筋鼻ヲ搐ニ代テ咬ニ頭ヲ搖ニ

駁豎テ捷ヲ作ス者多ハ脾虛ニ津液乏ク胃熱去ラサル

ノ致ス處此方ヲ服メ効アリ又此症ニテ面黃肌瘦四肢

無力者ハ蟲積ニ屬スル也大七氣陽加熱柳ヲ與フハ

治肝虛内熱時驚惕時愛驚時狂怒時搐搦或大人中風小兒

驚風及立病癰癰人事狐惑一切心神失靈肝神昏亂諸証

彙

羚羊、半夏、當歸、所風、天麻、茯苓、酸枣人、人

參、白朮、釣藤、右十味人本方防汗酸天羊釣藤

此方ハ沉香天麻湯ハ証メ内熱アル者ニ用エ此証ノ一

等輕中者ハ抑肝散ナリ又大人類中ナト所ニ屬スル者



八味方ニ宜シ若瀉方ニ涉ル者ハ解語湯ヲ用ユヘシ方  
意皆相類ス

治

婦人骨蒸勞熱致嗽或有汗無汗比之於逍遙散之類取効  
甚捷宜即使方 四物湯生脉散ヲ合シ人多ク去リニ成ニ草亦

川芎

當歸

芍藥

茯苓

麥門

白朮

牡丹皮

地

骨皮

生地黃

五味子

甘草

右十一味

此方ハ

婦人骨蒸

初起ニ

與テ逍遙散

ヨリ其効捷ナリ

骨

蒸トハ

熱ノ内ニ

浮ク骨ヲ

蒸ス如ク

秘狀ニ

見エル故ニ

名ク外

臺秘要ニ

導テ出ツ

遵生八

鏡ニ

燒骨勞ト云

目病

ナリ

眠ヲタリ

通稱ト

見エ

ニ味

左

陰

降大湯

ノ症

十

トハ

腎虛勞傷

ヨリ根

サス者

ナリ

此方ハ

血營ニ

因ル者

也

也

治

小兒風疾

吐沫

氣喘

方景

言

射干

大黃

檳榔

牽牛子

麻黃

甘草

右三味

此方ハ

麻杏甘

石湯ノ

症ニ

メ

風疾

壅盛スル者

ニ宜シ

馬

脾風ノ

初起ニ

用テ

同ニ

効アリ

治上熱下寒嘔吐方 傷寒本義

吳茱萸、乾姜、黃連、人參 右四味

此方ハ呈萊萸湯ノ變方ニメ上熱ヲ目的トス吾門迄年

此方ニ本ヤテ上熱下寒ノ者ニ直ニ呈萊萸湯ニ手夏黃

連ヲ加テ特アリ

治鼓脹

一方新修

三琥珀

沉香

茯苓

地黃

犀角

右八味

此方ハ敗血流テ水氣ニ變スル者ヲ治ス但毫末敗血三

り出ル水氣ニハ東洋琥珀湯ナリ鼓脹ヲナス者ニハ此

方ニ宜シ

丁附理中湯全五葉名胃及呃逆及治腹寒系藥過多傷胃元

成者

即理中湯方中加丁香附子

此方ハ虛寒ノ噦逆ヲ治ス就中下利後ノ噦逆ニ効アリ

中焦ヲ理スル力アル故ナリ又及胃ノ虛証小兒吐乳ノ

脱候ニ運用スルナリ有何レ又中焦ヲ目的トス

治肺鎮石腸硬痛方



治

血狂一方本朝走馬傳

當飲、芍藥、川芎、地黃、乾姜、熟艾、大黃、桂枝

右八味

此方ハ烏藥ノ本邦走馬傳ニ出ツ血狂ハ大抵三黃湯心  
加辰砂桃核承氣湯ニテ治スル者ナレ氏數日ヲ経テ壞  
症ニナリタル者ハ此方ニ非シハ効ヲ收メカタシ西物  
湯ニ桂枝乾姜ヲ加ヘタル處ニ妙處アリト知ヘシ

酒查鼻方本朝經略

橘皮、莎草、楳榔 七三味一方以沉香代橘皮  
此方ハ左脇ハ硬痛ヲ治ス若飲ヲ禁ル者ハ良枳湯ニ宜  
シ若熱氣下心者ハ十棗湯加青皮芍藥ヲ與フヘシ以  
上三方左脇ノ硬痛ニハ効ナシ左脇ニマル者ハ紅肝飲  
柴胡疎肝湯也逆散吳茱萸茯苓定年羊夏湯ノ類選用ス  
ヘシ大抵病左右ヲ論セサシハ脇痛ハ治方ヲ異ニセサ  
シハ効ナシ先輩吳茱萸良姜ヲ以テ左右ヲ分一理アリ  
ト云フ

金匱也 黃連、黃芩、蒼朮、大黃、  
白芍、乾子、枳實、紅花、  
枳殼、桑、右九味、等分、

黃連、大黃、枳實、枳殼、桑、  
右七味、黃連、加黃芩、葛根、各三黃、枳子、湯一、名八仙飲子

此方ハ三黃、浮心、湯二、加味シタル者ニテ、總ハ面部ハ病

ニ効アリ、酒渣鼻ニ恨心ニサケス、若瘡、腫ア、者、大、亨、黃

湯ニ宜シ、清上防風湯ハ二湯ニリ、病勢緩ナ、九處ニ用ユ

治眼滿至方、梅、花、臭、盡、藏

、防、風、草、橘、皮、川、芎、枳、殼、蒼、朮、獨、活、子、厚、朴、枳、實

、黃、連、一、枚、水、味

此方ハ分消湯ヨリ、簡便ニシテ、眼滿ハ初起ニ効アリ、婦人

ニハ別メ宜シ、此方ヨリ一等重ヤ、分消湯トス、又一等

進テ、虛ニ屬スル者、行濕補氣養血湯トスル也

治喘一方、長山

、枳、殼、枳、實、半、夏、乾、姜、木、香、右、五、味

此方ハ、海、破、飲ヲ主トス、東郭ノ一方ト、緊、慢ノ別アリ、譬

ハ、胸、痺ニ、橘、皮、枳、實、桂、枝、湯ト、枳、殼、在、人、甘、草、湯ノ別アル

力、如シ、破、飲、力、カ、ヲ、緊ニセシト、破、ス、ハ、此、方、ヲ、用、ユ



會陰打撲一便瀉瀉通七八只血三少  
出足垂先挑接承氣湯用一佳若其三不泄  
則大黃開子湯一用二一三東郭

治  
三降氣ヲ專ニ  
打撲一方ニ  
セト上欲  
又ハ後方ヲ用  
エハ三

萍蓬、樓櫚、川芎、桂枝、大黃、丁香、甘草

七七木日久者加附子

此方ハ能ク撲筋骨疼痛ヲ治ス葎蓬一名川骨血分ヲ和  
ス撲搥骨疼ヲ去故ニ二味ヲ以主藥トス本邦血分ノ藥  
多ク川骨ヲ豆トスル者亦甚多ナリ日ヲ経テ不愈者情  
子ヲ加ルハ此品能ク溫經スルカ故也

名頭痛一方東郭

蘆薈、黃連、大黃、半夏、枳實、乾姜、吳茱萸、甘

草  
右八味

此方ハ半夏厚心湯ノ變方ニナリ濁飲上逆ノ頭痛ヲ治ス  
 胃虛ニ屬スル者ハ半夏白朮天麻湯ニ宜シ心下痞不大  
 便ナレハ此方ニテ一下スヘシ

喘一方同上

茯苓 厚朴 桂枝 杏仁 蘇子 甘草 白朮

新藥譜 卷之三

辨上二見ユ榮喘ト時大抵ノ藥激ノ患シ唯以方ト麻黃  
甘草湯トハ激マシメ効ヲ收メヤス

治吃逆 一方同上

半夏 茯苓 竹茹 茯苓 胡椒 乾姜 右三味

以方ハ橘皮竹茹湯ト又對ニラ裏寒ハ吃逆ニ用テ効アリ胡椒乾姜ヲ多量ニセシハ驗ナシ

治狂 一方同上

厚朴 大黃 枳實 黃芩 黃連 芒硝 二角 右七味

以方ハ大承氣湯ノ變方ニテ榮狂ノ劇症ニ用テ宜シ相  
田東郭屢經驗ト云病緩ナ者ハ下氣圓テ宜トス

治水腫鼓脹 一方同上 婦人產後水腫及一切因瘀血而榮腫

者投之効如神

厚朴 枳實 茯苓 附子 蒼朮 木通 甘草 當歸

川芎 黃連 獨活 紅花 茜草 右十三味一名驛馬方

以方ハ分消湯ヨリハ一等重クメ瘀血ヲ兼ル者ニ用エ  
然レ行濕補氣養血湯ニ比スレハ稍寒スル者ナリ一婦



血分腫ニテ本事後集ノ一方ニテ効ナキ者此方ニテ効ヲ得タリ

名骨硬一方名州誤吞釘錢骨不下咽者皆治之

縮砂 甘草 右二味包布白湯浸含口漸吞下

骨硬ノ方名治アル此方ノ簡便ニテ捷効アル如カス

若急ナレハ象牙ノ末ヲ服スルニ佳也又柑皮ヲ黑燒ニ

メ服スルニ

名癖方竹中氏

忍冬 樸椒 石羔 芍藥 大黃 甘草 當歸 右七味

此方ハ竹中又輔ノ家方ニテ痼癖痛甚キ者ヲ治ス其効

十取湯ニ優ナレト萬々也

名頭瘡一方一名大黃黃湯

忍冬 紅花 連莖 蒼朮 荆芥 防風 川芎 大黃

甘草 右九味福井家方有黃芩與紅花蒼朮

此方ハ頭瘡ニナラズ凡テ上部頭面ノ瘡瘡ニ用エ清

上防風湯ハ清熱ヲ主トシ此方ハ解毒ヲ主トス凡ナリ

肘后云疔腫無名者花菊一握搗汁入  
入口即生神驗之方也余日用極  
東郭曰其亦可余曾用以救人不少

治肩背拘急方中山攝州

青皮、茯苓、烏藥、荊芥、莢朮、甘草、右二味

以方ハ舊同僚中山攝州ハ傳ニテ氣鬱ヨリ肩背ニ拘急

スル者ニハ即効アリ若胸肋ニ疼痛アリテ迫ル者ハ迄

年々夏陽ニ宜ニ唯肩背ノ三張ル者ハ葛根加苧黃カ今

至獨治湯ヲ用ユベシ

沉香解毒湯青州治諸疔瘡

連蔓、沉香、木通、莢連、木香、櫻絲、黃芩

右八味

以方ハ立香連翹湯ノ輕キ症ニ用エ疔瘡ハ大抵十敗湯

加菊花大黃ニ宜ニ若熱毒甚キ者ハ黃連解毒湯加牛房

子ニ宜ニ下劑ノ宜ニカラ又處カ以方ノ主ナリ

治婦人癥塊痛震言薛同歌聞元記事以方治血壅脹滿

芍藥、玄胡索、木香、乾漆、莢朮、五靈脂、肉桂

右七味

以方ハ婦人脹滿血壅ニ屬スル者ヲ治ス靈樞所謂藏府



老人每更暑之候下利腹中冷痛瀝瀝有聲  
 小便頻數下利者難治  
 且此方若遇寒熱腹中者加附子  
 或女從來腹痛者服之脫胎不止之方  
 數下收斂熱血下利心下痞軟  
 下利不遂更下利之方攻下增劇  
 先生理中湯方與之漸愈先生曰病虛寒  
 方以扶元如中虛者利之故愈

外ニ在テ藏府ヲ排シテ胸脇ニ郭ニ皮膚ニ膜ルト云  
 症ニハ効ナシ是方消湯ナトノ所ナレ氏難治ノ者也  
 存靈胞カ脇膈同シク極大ノ病ナレ氏脇ハ治スヘシト  
 云ハ此方及薑甲湯等ノ治スル症ヲ言也

利部

理中湯傷寒論治飢食過度傷胃或胃虛不能消化致及嘔吐  
 逆物與氣上衝盛胃ニ決裂所傷吐血出其色鮮紅心腹絞  
 痛白汗自流名曰傷胃吐血

即金匱人參湯

此方ハ理中丸ヲ湯ニスル者ニメ理ハ治也中ハ中焦胃  
 ノ氣ヲ指乃胃中虛冷シ水穀化セズ繚亂吐下ニテ譬ハ  
 線ノ乱ルカ如シ治ル故ニ後世中寒及霍亂ノ毒藥トス  
 余カ門ニテハ太陰正治ノ方トメ中焦虛寒ヨリ生スル  
 諸症ニ活用スルナリ吐血下血崩漏吐逆等ヲ治ス皆此

婦年曾下血過多已後面赤青慘  
 喘白腹浮腫胸中動悸下利短氣  
 步食飲之時下血余六君子湯合  
 附子本香白芍此二鐵砂在之難用  
 下血此水氣亦在之此以天字復  
 凡一節之社會之交喉喉胸滿甚  
 已通身浮腫偏息卧之可臥之大  
 小便不利二區利水劑之與之  
 才之家曰恐支飲了之至之甘姜  
 辛之夏仁黃湯加黃芩大之此之  
 凡二三之漸之愈之得之洗腫  
 忽消散也之極

龍十リ  
 苓甘姜味辛夏仁湯 全通治半降咳而急與疾飲滿嘔而微腫者

茯苓、甘草、五味子、乾姜、細辛、半夏、杏仁

此方ハ小青龍ノ心下有水氣ト云處ヨリ要方シタル者  
 方天用ニハシ

苓甘姜味辛夏仁黃湯 同上治前症而腹中微結者

茯苓、甘草、五味子、乾姜、細辛、半夏、杏仁

龍膽湯 子名名嬰見出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚悸熱

大北咀者若己能進哺中食更不消壯熱及變蒸不解諸驚

見ノ套劑ト見ニ此乳驚病ノ初發以方ニ如ハナニ此症



本草綱目卷之八

或人麻疹右健忘ヲ發シ日時姓名不記  
スル能ハズ時々目眩ヲ發シ此ニ對シテ  
諸匠之ヲ治スル數月更効ナシ余其方ヲ與  
ハテ皆散ラシ用ニ數回ニシテ月眩止  
記名スルヲ獨タリノ稿

ニテ心下急迫アレハ大柴胡加羚羊角甘草効アリ其一  
等輕キ者ヲ抑肝散トス都テ大人小兒ノ痼症ニ活用ス

鯉 莫湯内上治妊腹大胎間有水氣  
鯉魚、蒼朮、生姜、芍藥、當歸、茯苓

右六味崔氏療水病身腫唯用鯉魚赤小豆  
以方ハ婦人血氣薄弱或ハ身長ノ懷孕シ子胞ノ爲ニ養

ヲ養ハル身腫虛メ水氣ヲ生シ滿身浮腫スル者ヲ主ト  
ス若血氣虛セメ水腫ヲ爲ス者ハ產寶所ニ湯ニ宜シ又

雞脚ト名ツケ但足部水氣アル者脚氣ノ治法ニ宜シ  
龍骨湯外腫療宿驚失志忽々驚悸悲傷不樂陽痿不起

竜骨、茯苓、桂枝、遠志、麥門、牡蛎、甘草、生姜  
右八味

以方ハ失心風ヲ主トス其人健忘心氣鬱々トシ大柴胡  
或ハ驚搐不眠時ニ獨語ニ或ハ痴ノ如ク狂ノ如キ者ヲ  
治ス以方ニメ一等處スル者ヲ歸脾湯トスル也

或人身中餘面色萎黃腹虛滿大便  
 溼手足微腫短氣高登能食六君  
 子湯加芍藥附子水各一兩鐵砂九  
 兼用人參數句ニシテ腹調和シ水  
 氣有面都  
 光澤ヲ生シ但向午ハ皆又烈シ全  
 失入余腸胃九ヲ長服シテ諸愈  
 或產後口半糜爛飲食進マズ下  
 時々逆脈浮細力ナシ者瀉之ヲ  
 ヲ病益甚シ余試ニ此方合補血湯  
 ハ下大ニ開キ嘔吐止ニ食漸ク進  
 九ヲ兼用シテ氣血大ニ復シ全ク  
 一妻麻疹中分挽シ疹忽後ニ出  
 飲良久ニ減シ身體虛弱始ト瘳  
 現入人參加當歸黃芪數日ニシ  
 飲食漸ク進ニ肌膚滋潤入余右

理中加二味湯日上療霍亂胸滿腹痛吐下

即理中湯方中加當歸芍藥

此方ハ元霍亂ノ腹痛ヲ治スル方ナレ氏中氣不足ノ腹  
 痛拘急ニ鍾々ノ症ヲ生スル者ヲ治ス理中湯ハ胃中ヲ

乾ス方也建中湯ハ胃中ヲ温ス方也此方ハ一燂一潤其  
 中ヲ得タリ

二君子湯局方治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺内熱  
 或飲食難化作酸屬虛大者

人參、蒼朮、茯苓、甘草、半夏、橘皮

右六味一方加旋覆花治膈証飲食全不入口又加赤石脂

治吐清水者多氣虛或加厚朴香附子治脾胃虛弱水腫

此方ハ理中湯ノ變方ニメ中氣ヲ扶テ胃ヲ開テ効アリ

故ニ老人脾胃虛弱ニモ疾アリ飲食ヲ思ハス或ハ大病

後脾胃虛シ食味ナキ者ニ用ニ陳皮半夏胸中胃口ノ停

飲ヲ推シ開ク一層力アリテ四君子湯ニ比スハ最

治用アリ千金方半夏湯ノ類數方アレ氏此方ノ平穩ニ



此湯之藥二種二忍つ一カラス四物湯加前  
方用之若新九之兼用シテ愈ハ可前

尚高良姜湯余可讀

清中安枕湯方未詳  
清肌安枕湯方在世部

小柴湯中加藹胡蘇姜門大寒

友松子巨一人喜唾數日不止臣為虫附  
恒以之不愈余為膏與正氣天香  
湯連前又一老臣寢所喜唾不  
了有照之亦明湯連意

良姜湯奇効治腸胃受風久為飧泄下利嘔逆腹內疼痛

良姜 木香 檳榔 茯苓 人參 肉豆蔻 吳茱萸  
波皮 縮砂 乾姜 古十味

此方久下痢ノ症ニメ漸痢湯ノ如ク上焦ノ不和ニモ非  
ス真武湯ノ如ク下焦ノ不足ニモ非ス唯陳寒凝結ハ腹  
內疼痛シ飲食之カ為ニ不能代者ヲ治ス  
理中安枕湯ニ書治傷寒吐蛔者手足冷胃中空虛

白朮 人參 乾姜 茯苓 烏梅 蜀椒 甘草 右七味

此方ハ胃中虛冷ハ吐蛇スル者ニ宜シ若胃中熱アリテ  
吐蛇スル者ハ清中安枕湯ナリ寒熱錯雜シテ吐蛇スル

者ハ烏梅圓ナリ若吐甚々以上ノ諸藥下ニ能ハザル者  
ハ寒熱ヲ誦ヒス甘草粉蜜湯ヲ與フハ又吐蛇ハ痛甚

キモノハ椒梅湯大ニ効アリ又吐蛇ニ流マズ胃中寒飲  
下リテ喜唾止マザル者此方ヲ用テ効アリ

龍胆浮肝湯 藥氏 肝經濕熱玉莖連瘡或便毒下疳懸癰腫痛

婦人陰門大腫者龍胆桴湯効惠美

小便赤澀陰囊腫痛

龍胆、黃芩、當歸、澤瀉、旋子、車前子、木通、甘草

草、地黃、七九味方本出蘭室及理例無黃芩旋子甘

草有萊胡今從通用

此方ハ肝經濕熱ト云カ目的ナル氏濕熱ノ治療ニ三萼

アリ濕熱上行ノ頭痛甚シク或耳鳴者ハ小柴胡湯

加竜胆胡黃連ニ宜シ若濕熱表ニ集藥ノ諸瘡ヲ生スル

者ハ九味柴胡湯ニ宜シ兼下部ニ流注メ下疳淋濁蝕

瘡ヲ生スル者ハ此方ノ主ナリ又主治ニ括テ囊癰便毒

懸癰及婦人陰癰痒痛ニ用テ皆熱ニ屬スル者ニ宜シ臭

氣者ハ奇良ヲ加ヘシ

理氣平肝散統旨治七情所傷癸症今用以治肝氣滯胸膈

痞滿變為諸証効

即四逆散方中加烏藥莎草川芎木香青皮

此方ハ柴胡疏肝湯ニ烏藥木香ヲ加タル者ニテ其源ハ

四逆散ニ出ツニ行通リ拘急ノ上胸脇下ニ迫リ腹痛下



此方者半夏治寒入心腹卒厥及小腹痛  
既氣病刺脾胃氣及手足極痛難忍腹  
中冷重者自汗不止等 尉玄仙曰此痛  
常ニカワリテ苦痛極クイカレテモセシタナキ  
賜ニ利膈去半湯ヲ用テ即効ヲ得ル方ナリト云フ  
一男年三十餘嘗溺飲アリ加之飲良便  
寒咽唯不刺名賜狀ナシ身體極弱  
脈沉細心下悸刺膈腹ヲタシト云余曰  
是恐ラハ頑痰胸膈ヲ妨害シ心腹ニ結  
ハル者真ノ胃音痰ニ非スト此方加吳  
茱萸ヲ與ニ安中散ヲ兼用ス數旬ニシテ全  
愈 稿

刺微咳等ヲナス者四逆散ナリ一等進ラ上部ニ迫リ氣  
逆胸痛ヲナシ鬱塞スル者ヲ柴胡疎肝湯トス今一等進  
テ身體極急瘧狀ノ如ク神氣鬱々不樂物ニ感動シヤス  
キ者此方ノ主ナリ

利

賜湯去逐七情氣與邪氣相結咽喉之間噎飲食曰噎結胸  
賜飲食尚賜不下曰賜公猶可治半夏下氣附子散邪施子  
解前而茶而中ニ妙方也 不單治無効至反胃津液枯燥而  
渴者雖盧扁何得治哉

半夏

附子 施子

右三味合甘草乾姜湯更佳

以方名古屋玄匠ノ工夫ニテ古施附湯ニ半夏ヲ加タル

モノ也其說匠方問餘ニ悉シ賜噎ノ初起ニ用テ効アリ

以方甚々服シ難ラ以テ吾門ニテハ甘草乾姜湯ヲ合メ

用ル也楊氏家藏方ニハ仲景ノ施子乾姜湯ヲ二氣散ト

名々賜噎ニ用テ即効方ト同意ナリ

龍

騰飲 賀川治血氣衝逆

大黃 黃芩 黃連 川芎 右四味或加紅花

一僧云三寸右脇下塊アリ、動悸アリ、時々  
 悸動胸中ヨリ肩背ニカケテ痛、數年迄  
 テ経テ治ムル能ハズ、診ニテ以テ方ヲ與テ  
 然癒セテ余用テ數回ニシテ愈

此方ハ三黃浮心湯ニ川芎ヲ加ヘタル者ニテ氣痞上逆  
 スル者ニ即効アリ血症ニハ紅花ヲ加ルヲ佳トス

良枳湯療治大堅塊痛在右者  
 、茯苓、桂枝、甘草、大棗、半夏、良姜、枳實

七七味痛在左者去良姜加吳茱萸  
 此方ハ苓桂甘薑湯ニ半夏良姜枳實ヲ加ル者ニテ飲癖  
 ハ痛アル者ニ用ユ苓桂甘薑湯ノ隣飲ニ効アルハ過山  
 崧ハ經験ナリ又吳茱萸ト良姜ト左右ヲ分ツハ和曰  
 東郭猶辨アル氏其実ハ同本ノ燈下集ニ出ト云考ヘシ

留部

療癰加味

此方ハ陳修園ノ創意ニテ加味逍遙散ニ合メ用余カ門  
 ニハ症ニヨリテ小柴胡湯或ハ順氣劑ニ合テ用ル也

貝母 夏枯草 枳實根 牡蛎 青皮

ルヲ



乙字湯  
 痔瘡  
 奇功  
 方忍冬  
 白朮水  
 三黃湯  
 奇功

右此味痛在左者去良姜加吳茱萸  
 或合逍遙散或合小柴胡湯

乙字湯部

乙字湯理痔瘡脫肛痛楚或下血腸風或前陰痒痛者諸  
 瘡疥誤結藥洗傳頓愈後上逆胃冒如氣癰纖憂細慮或如  
 心氣不足者並主之

柴胡、大黃、升麻、黃芩、甘草、當歸  
 右六味本有大棗今代以當歸更効  
 此方八原南陽ノ經驗ニテ諸痔瘡脱肛痛楚甚ク或ハ前  
 陰痒痛心氣不定ノ者ヲ治ス南陽ハ柴胡升麻ヲ升提ノ  
 意ニ用タル比ヤハリ濕熱清解ノ功ニ取ルカヨシ其内  
 升麻ハ古ヨリ犀角ノ代用ニテ止血ノ効アリ故方甘草  
 ヲ多量ニセサレハ効ナシ

治痢疾發熱腹痛心下痞裏後更使膿血者加大黃若已者加半夏是生薑湯加大黃一近人年三下利スルヲ三多諸藥効ナシ余移スルニ腹皮拘急ニテリ腸ヲ痛カシ乃熟方ニ與フ五十分割ニシテ全ク心

治霍亂病腹攻心腹痛發熱上逆心悸欲嘔吐及婦人血氣痛而心煩發熱頭痛者尾謹

刊曰一名石門曲骨上三寸

黃芩湯傷寒論 治下利腹痛急心下痞者

黃芩、甘草、芍藥、大棗、枳實

此方ハ少陽部位下利ノ神方ナリ後世ノ芍藥湯ナト、同日ノ論ニ非人但同シ下利ニテ文榮胡ハ從來寒熱ヲ主トス此方ハ腹痛ヲ主トス故ニ此症ニ吐氣ヲレハ榮胡ヲ用スル後方ヲ用ル也

黃芩加半夏生薑湯心下痞而嘔逆者

即黃芩湯方中加半夏生薑

辨見于上

黃連湯心下痞煩心下痞腹腹痛嘔吐上衝者

黃連、甘草、乾姜、桂枝、人參、半夏、大棗、枳實

此方ハ胸中有熱胃中有邪氣ト云カ本文ナリ此喻言カ濕象下之舌上如胎者丹田有熱胸中有寒仲景亦用此湯治之ノ說ニ從ラ各上如胎ノ四字ヲ一徵トスハ此症ノ胎ノ摸樣ハ各ノ奧ホト胎カ厚クカ、リツシ黃色

三枚



則在方時氣病起旁復篇作大病差後  
 虛煩不得眠心中煩而不得眠或腹脹  
 治久痢腹中熱痛心中煩而不得眠或腹脹  
 血者又應瘡內陷熱氣熾盛咽燥口渴心  
 悸煩躁清血者  
 煎法以水五合分煮三味取二合去  
 滓內阿膠烱消小冷內雞子黃  
 攪令相得服

黃連

阿膠湯口上治心中悸而煩不得眠者

按三

黃

方

七五味

上帶七舌上潤滑カナル胎ノ有モノハ假令腹痛ナク  
 下元離病乾吐有テ諸治効ナキニ決メ効アリ腹痛アル  
 ハ猶更ノ了也又坎方ハ半夏厚心湯ノ黃芩ヲ桂枝ニ代  
 カル方ナレ氏其効用大ニ異ナリ甘草乾姜桂枝人參ト  
 組タル趣意ハ桂枝人參湯ニ近ニ但彼ハ協熱利ニ用坎  
 ハ上熱下寒ニ用ノ黃連主藥タル所以也又按ニ坎桂枝  
 ハ腹痛ヲ主トス即千金生地黄湯ノ桂枝ト同旨也

黃芩

阿膠湯口上治心中悸而煩不得眠者

按三

黃

方

七五味

按三

黃

方

七五味

按三

上方小柯韻伯ノ所請少陰ノ得心湯ニテ病陰分ニ滯テ  
 上熱猶去テ入心煩或ハ虛躁スルモノヲ治ス故ニ吐血  
 暖血心煩シテ眠テス五心熱ハ漸々肉脫スル者凡諸病  
 日久シク熱氣血分ニ浸滯メ諸症ヲナス者毒痢腹痛膿  
 血止メス口舌乾ク者等ヲ治メ腫アリ又少陰ノ下利膿  
 血ニ用ルモノアリ併シ桃花湯トハ上下ノ辨別アリ又  
 痛浮不止者ト瘧瘧煩渴不寐者ニ治用ノ特効アリ

痰飲方

一 枇杷葉、桑白皮、欬冬花、杏仁、

本通各等

大黃剉減

如七味



以方加甘故名著敗建中湯名諸腸膿潰後  
荏苒不愈虛羸煩熱自汗盜汗諸膿不止  
新肉不長者若更寒下利四肢冷者更加附子

治臟毒下血為疫膿血不止腹痛瀉瀉小  
便不利面色痿黃日漸羸瘠或腹腫痛  
婦傷寒數日熱解之而血數行或咳嗽  
肝ノ如ク或漆黒ノ如ク數塊脫下之四肢厥冷  
汗出喘鳴絶ヤントス示方ヲ與下血ヒミ  
四肢温而熱證諸人事ヲ有ヤス脉微細升  
湯散火湯ヲ與ハ快復ス焉

黃著建中湯金匱

治小建中湯而盜汗自汗者

即小建中湯方中加黃著

此方ハ小建中湯ノ中氣不足腹裏拘急ヲ主トシ諸虛不  
足ヲ帶ル故黃著ヲ加ル也仲景ノ黃芪ハ太極表托止汗  
祛水ノ用トス此方ハ外體ノ不足ヲ目的トスル者ト知  
ルハミ此方ハ虛勞ノ症腹皮背ニ貼又熱ナク咳エル者  
ニ用ト雖或微熱アル者或汗出ル者汗無キ者俱ニ用工  
ハミ外臺黃芪湯ノ二方主治藥味少ニ異ナリト雖亦皆  
此方ニ隸屬ス

黃土湯

上舊注云主吐血衄血下血此方不論先後後血吐

血衄血脈緊者効崩漏脈緊者亦主之

阿膠、黃芩、黃土、甘草、白朮、附子、地黃、三七、味

此方ハ下血陰分ニ陷ル者收瀉スルヲ意アリ先後後血

ニ拘ラズ脈緊ヲ以テ用ルカ此方ノ目的ナリ吐血衄血

ヲ治スルモ此意ニテ用エハミ又崩漏緊脈ニ効アリ又

傷寒熱血分ヲ侵シ暴ニ下血スル者挑核承氣湯犀角地

黃湯等ヲ製テ血止ニ當位ニ陷リ危篤ナル者此方ヲ與  
テ性ニ奇驗ヲ得タリ

黃耆、茯苓湯、千金名男婦諸虛不足一切病後不如舊

、黃耆、茯苓、當歸、川芎、桂枝、芍藥、白朮、地黃

、人參、甘草、七十味

此方ハ即後世十全大補湯ナレトモ千金力舊キ故古ニ本

クナリハ珍湯ハ氣血兩虛ヲ治スル方ナリ右ニ黃耆、桂

枝ヲ加ル者ハ著黃建中湯ノ如ク諸不足ヲ目的トス故

ニ濟世ノ主老ニ虛勞不足並治セリ傷ヲ治スト云フ又瘡

瘍ニ因テ氣血俱ニ虛ニ羸瘦スル者此方ト之處アリ流

注瘰癧等屬少虛ニ用ユ此方ト人參養榮湯ニ桂枝

ヲ加スル者ハ八味丸ノ意ニテ桂枝ニテ地黃ノ濡滯ヲ

揮發スルナリ先考隋庵翁曰薛己諸病諸治ノ末ニ此方

ト補中益氣ト地黃丸ト君子湯ノ加減ヲ載スル者ハ萬

病共ニ氣血ヲ回復スルヲ主トスルノ意也ト訣旨ニテ

運用スルニ

運用スルニ



和國皆以湯酒煮藥用之奇功其  
外鼻之毒或穿或穿或黑或白之  
通之而二回者其加者皆名金花

有持膏之婦人年六十以上至難行不止或  
經行十日不其止其煩之煩之煩之  
下血之難者其方大之功之矣

黃連橘皮湯外臺療冬溫未即病至春被積寒所折不得哭至

夏得熱其春寒解冬溫毒始出肌中斑爛隱疹如錦文而咳

心肉吐吐清汁服赤口瘡下部亦生瘡已自得下利

黃連、橘皮、杏仁、麻黃、葛根、枳實、厚朴、甘草

七八味

以方八時毒一証ニテ頭瘟ニナレハ柴胡桔石牛蒡

連ノ之所ナレ其邪肌膚ヲ侵ハ赤斑ヲ發シ心煩下利

スル者ニ用テ効アリ其一等劇者ヲ六書三黃石羔湯ト

ス又其邪陷分ニ陷リ内攻セント欲スル者溫疫論托裏

擧斑陽トス其三方ニラ大抵時毒ノ斑ハ治スルナリ

黃連解毒湯内土治時疫苦煩悶乾吐口燥呻吟錯語不得臥

黃連、黃芩、黃蘗、梔子、芍藥、知母、大青、板藍根、玄參、

以方ハ胸中熱邪ヲ清解スルノ聖劑也一名倉公ノ火劑

トス其目的ハ梔子鼓湯ノ証ニシテ熱勢劇シキ者ニ用

工苦味ニ堪カスル者ハ泡劑ニメ與フハシ大熱有テ下

利洞泄スル者或疫病等ノ熱毒深ク洞下スル者ヲ治ス

黃連解毒湯此方毒入心內熱口乾煩悶  
 恍惚脈實者或加芒硝以重其下  
 謝志立產後寒症得數十見不解胸  
 中煩悶諸治人事多知之腹虛軟  
 舌上胎下之氣索然此症之常因  
 即此黃連解毒湯以治之

又狗猫鼠ノトノ毒ヲ解ス又喜笑不止者ヲ治ス是亦心  
 中懊惱ノナス所ナレハ也又可氏ハ此方ノ弊ヲ痛ク論  
 スレ氏実ハ其妙用ヲ紀ラヌ者ナリ又酒毒ヲ解スルニ  
 効ナリ外臺ノ文ヲ熟讀スハシ又外臺ニ黃蘗ヲ去大黃  
 ヲ加テ大黃湯ト名ク吉益東洞ハ其方ヲ用シ由証ニ依  
 テ加減スルニ由リ  
 和解湯 雞峰 治血氣虛弱外感寒邪身體疼痛壯熱惡寒腹中  
 疼痛鼻塞頭昏疾多咳嗽大便不調  
 芍藥、桂枝、甘草、乾姜、薤白、茯苓、半夏  
 七七味按雞峰本有厚朴人參生薑大棗炙甘草今從古  
 方同錄  
 此方傷風中寒ノトノ輕邪ニ用テ効アリ和氣飲ハ此方  
 ノ一等重キ處ニ用エ  
 和氣飲 續易簡後集  
 即此續散方中去麻黃  
 詳見于上



黃芪湯直指小兒治肝勞回春云并勞喘咳虛汗骨蒸渴而腹

浮少食者倍

黃耆、人參、鱉甲、當歸、地黃、茯苓、橘皮、川芎

芍藥、蝦蟆、半夏、柴胡、使君子、生薑、右十四味

地方、淨府散、表裏、方、三、淨府、血氣、三、少、三、虛

十、心、下、或、八、兩、肋、下、或、八、右、或、左、三、凝、下、三、急、下、三、

腹、堅、三、三、渴、下、三、或、下、三、或、下、三、或、下、三、或、下、三、

熱、三、三、三、脈、三、盛、三、三、三、標、的、三、三、三、方、三、既、三、日、數、三、經

三、血、氣、虛、耗、三、三、故、發、熱、三、三、三、骨、蒸、三、三、三、內、三、三、三、

三、立、三、三、如、三、三、三、且、盜、汗、出、三、三、三、以、蒸、熱、盜、汗、三、三、三、心、煩、熱

三、

世、三、

血、勞、疳、三、

學、古、三、

和肝斂、玉葉絕腸下、紅梗起一條作疼、

當歸、芍藥、三錢、青皮、茴香、木香、枳實、柴胡

縮砂 右九味

此方ハ榮胡疎肝湯同種ノ藥ナレ氏脇下ノ硬痛ニハ

方ヲ優トス其中左脇下ノ痛ニ宜シ右ニ在ル者ハハ榮

胡湯ニ芍藥青皮或ハ良枳湯ノ類及テ効アリ

加中飲本朝經覽

枇杷葉、藿香、縮砂、吳茱萸、桂枝、丁香、甘草

水香、我水 右九味

此方ハ蘭本伯傳ノ家方ニテ傷食ノ套劑ナリ夏月ハ傷

食ヨリ霍乱ヲ為者最多ヲ以俗常ニ暑中ニ用ル故ニ中

暑ノ方ニ混ス中暑伏熱ヲ治スルニハ局方ノ枇杷葉散

ヲ佳トス今俗間所用ノ枇杷葉湯ハ此方ノ藿香丁香ヲ

去リ香薷扁豆ヲ加シ方ナリ

黃連降逆湯

連、芩、芍、歸、防風、蒼朮、枳、殼、乾、甘、獨、朴、硝。

加部

高根湯 傷寒論

一編人産后百餘日忽然トシテ舌痛リシニ  
丁アタハス我月時病急ニシテ脚腫直ニシテ  
如ク幾トハスニトス此方ヲ與フニ諸証隨テ退ク後十寒湯ヲ作テ與フニ下利數十行ニ



金匱要略  
一男子小瘡  
シメ時ハ梅月最ニコレヲ攻メテ思ハス

或知傷ニ耳痛ニ用テ白朮  
白朮ニテサシテ根ヲ生シテリ其サシテシ  
シ入テ初角アリト也ト論ニカケニ

解頤初前與葛根如赤附湯時以紫丸  
攻之則愈若漸甚如斗大者不治青州  
宜止通症

項背強急ハ在坐胸中宛熱而眼目牙齒疾  
痛或口舌喉痛腐爛者加大黃其効速

葛根、麻黃、桂枝、芍藥、甘草、大棗、生薑

右七味或加蒼朮附子

本方外感ハ項背強急ニ用テ七八日ノ童子ニ知ル

天レ氏苗方ハ切用鍾ニアリテ思議ニハカラズ壁ハ積

年有聲ニ疑然アリテ其痛時分下ニサシヨム者共方

ニテ一汗スレハ忘ルハカ如シ又獨治地黃ヲ加テ産後

柔中風ヲ治シ又蒼朮附子又加テ肩痛臂痛ヲ治シ川芎

大黃ヲ加テ胎漏及眼耳痛ヲ治シ刺苾大黃ヲ加テ疳瘻

微毒ヲ治スルカ如キ其効用傳指ニカケテ宛ニ論中言

病下痢ニ用瘧病ニ用ルカ如シ

葛根加半夏湯同上

即葛根湯方中加半夏

本方ハ合病ハ吐ヲ治スルハニテ平素偶飲アリテ

本方ハ腹ニ難ク或ハ酒客外感ナリ及テ効ヲ得ルナ

其治用ハ上ニ準ムハシ  
葛根黃芩連湯同上  
治項背拘急心下痞心悸而下利者

甘草湯心陽不足產後下利

甘草湯心陽不足產後下利

甘草湯心陽不足產後下利

葛根 黃芩 黃連 甘草

白芍加紅夜石膏名六物葛根湯治口瘡

決方ハ表邪陷下ハ下利ニ動アリ尾州ハ醫師ハ野見早

牛ハ下利ニ用テ屢効アリ云余モハ見ハ下利ニ多ク

經脈ハ下利方ヲ喘々熱勢ノ内壅スル處ニメ主証ニ

下利古人酒客ハ表証ニ用ルハ治用ナリ紅夜石羔ヲ加

口瘡ヲ治スルニ用シ

甘草湯心陽不足治平陽心陽而心煩不得安者

即平夏厚心湯方中倍甘草

決方ハ胃中不和下利ヲ主スル故ニ穀不化雷鳴下利

方目的ナリ若穀不化ハ雷鳴ナク下利スル者ナラハ理

中道ノ之處ナリ外臺水穀不化ニ作リテ清穀ト文

異ニ不從テバハ產後ハ口瘡厚ニ用奇効アリ決等ハ

苓連ハ交健胃ト効アリ云フハ

甘草乾姜湯日ニ治厥而煩躁多涎末者

甘草 乾姜 右二味

甘草 乾姜 右二味



口舌生牙疼喉腫等症  
三子有背枳殼各一兩以水八升分  
下利等症又可用之

三才圖會  
卷之四  
藥部  
甘草湯

東洞先生言牙齒痛屬心火之痛  
ニ以方ヲ用テ即効アリ少シテ又痛ハ  
ルキニ効ナシ先生甘草湯主治病逼  
迫及咽喉急痛者

若胃及心胸鬱熱下唇軟或嚼難者兼消  
塊及胃熱者煎心胞煩悶咳嗽乾咽或下

此方ハ簡ニ大其用廣シ傷寒ノ煩躁吐逆ニ用ヒ肺痿ノ  
吐涎沫ヲ用ヒ傷胃ノ吐血ニ用ヒ又虛候ノ喘息ニ以テ  
黒錫丹ヲ送下ス凡肺痿ノ冷症ハ其人肺中冷氣虛  
津液ヲ溫和スルハ津液聚テ涎沫ニ化ス故ニ  
坐多ク出リ然レハ熱症ノ者ハ唾凝テ重濁ナルカ如  
非ハ又唾ナク咽渴セ之彼遺尿小便數ナリ此症ニ以テ方  
ヲ與テ甚ハ効ナリ又病人此方ヲ服スルヲ嫌ヒ歎  
ナク只多ク涎沫ヲ吐メ唾ニ非ル者ハ桂枝去芍藥加皂  
莢湯ヲ用テ効ナリ又煩躁ナクテモ但吐逆シテ苦味  
ノ藥用ヒ難キ者此方ヲ用テ弛ルハ速効ナリ  
甘草湯曰上 治半浮心煩而心煩不得安者甘草湯在誤記並  
甘草湯在一味  
此方モ亦其用廣シ第一咽痛ヲ治ス又諸藥吐メ不納者  
ヲ治ス又藥毒ヲ解シ又蒸藥ニメ脫肛痛楚ヲ治シ未  
ニ貼スルハ毒蟄竹木刺等ヲ治ス  
乾姜黃連黃芩人參湯曰上 治心煩下痞鞭而吐下者



方ハ簡ニメ其用廣シ傷寒ノ煩躁吐逆ニ用ヒ肺痿ノ  
涎沫ヲ用ヒ傷胃ノ吐血ニ用ヒ又虛候ノ喘息ニ效方  
ヲ黑錫丹ヲ送下ス凡肺痿ノ冷症ハ其人肺中冷氣虛

甘草湯上 治半浮心陽而心煩不得安者甘草心症証記  
 甘草右一味  
 此方天亦其用廣第一咽痛治入又諸藥吐

此方天亦其用廣シ第一咽痛ヲ治ス又諸藥吐メ不納者  
ヲ治シ又藥毒ヲ解シ又蒸藥ニメ脫肛痛楚ヲ治シ未ニ  
貼スレハ毒螫竹木刺等ヲ治ス  
乾姜黃連黃芩人參湯曰上  
治心煩心下痞鞭而吐下者

聖

利者宜其方是也

此方加麥人各賢者易治此婦人腰中使自利  
腰中痛者、此方治之、人平日小便失  
禁、腰中痛者、又男女遺尿、至十四五歲  
猶不已者、最為難治、斯方加麥人、能奏奇效、  
隨症加附子、是也

治飲家、半滿痛、欲吐、或胸腹疼痛者、是也  
甘遂、大黃、八分、蜜、半、匙、水、煎、入  
甘草、甘遂、此方治之、人平日小便失  
禁、腰中痛者、又男女遺尿、至十四五歲  
猶不已者、最為難治、斯方加麥人、能奏奇效、  
隨症加附子、是也

乾姜、黃連、黃芩、人參、右四味

此方八、腸熱、アリテ、吐逆、食ヲ不受者、ヲ治ス、半夏、生薑、諸

吐、吐ヲ止ムルノ藥ヲ與テ、寸効ナキ者、ニ特効アリ、又整

口痢、ニ用ユ

甘姜、芍藥、陽金、通、治、下、利、小便、不利、腰中、冷、如坐水中、或疼、重、形、寒、者

甘草、芍藥、乾姜、茯苓、右四味

此方ハ、一名、腎着、湯ト云テ、下部、腰間ノ水氣ニ用テ効アリ

リ、婦人久年、腰冷、帶下等、アリ、者、紅花ヲ加テ、與シ、ハ、更ニ

佳也、甘遂、半夏、湯、同、治、拘、挛、急、迫、心下痞滿、吐者

甘遂、半夏、芍藥、甘草、蜜、右五味

此方ハ、利メ、及テ、快ト心下、堅滿カ、目的也、脈ハ、伏メ、當ニ

ナキ、又、之、下、也、一、休、心下ノ留飲ヲ去ノ至方ナリ、此、特リ

留飲ノ、之、ニ、非、ス、支飲、及、脚氣等ノ、氣急、喘、アル者、ニ、用テ

緩、此、方、ナリ、好ナリ、控、喘、丹、元、氣、此、方、ノ、輕キ、處、ニ、エ、ク、者

ナリ、又、此、方、蟹ヲ、加テ、甘、遂、ハ、及テ、數、功、ナシ、ニ、宮、批、評



橋宗江院江胡差連可為糊元溫婦人  
惡阻不止者奇驗  
有持白紙張惡阻六楮全散功不若之下  
仲景師楮全散六楮全散夜寒心求三

婦人腹痛元一三十日諸匠エラ療ス  
レド寸効ヲ奏セズ後ハ吐シテ水菓口ニ  
入ルヲ得ス呼蹄シテ胸ヲ動カシテ  
乃決方ヲ與テ三劑ニシテ痛退ハ二十劑  
ニシテ全愈 古方後賢 常使水引日  
集衆新先生曰草部卷ハ二五 常使水引日  
其ノ中ニ有テ子前ハ二五 常使水引日  
又月ハ中ニ其ノ中ニ有テ子前ハ二五  
一漏葉長 疾ニ消ニ中ニ有テ子前ハ二五  
和田曰海囊病痛強ク甚難瘦シ方者  
以方ニテ治ムト云フ  
或女年十三才ヲ然トシ 吐氣ヲ逆シ散葉口ニ納  
ルエトマ馬ニ數日午ヲ束テ鬼神ヲ托メテ云ハ  
口中白沫ヲ吐シ脈特ニ洪盛ナ帶即就出  
ノ候ナリト甘草湯當湯ニ與テ服ハル

壯年之時蜜ヲ不加メ大敗ヲ取リ東洞ノ督責ヲ受シ  
有忽諸人カヲス  
乾姜人參半夏丸料同上 治嘔吐不止心下痞軟  
乾姜人參半夏丸 右三味  
治方ハ本忠胆ヲ治スル九ナシ也 今料トナシテ諸嘔吐  
不止胃氣虛ル者ニ用テ捷功ナリ  
甘草粉蜜湯同上 治吐涎沫心痛發作有時者  
甘草粉蜜湯 右三味  
治方ハ就蟲口吐涎ヲ治スルナシナラズ吐涎ナクトモ  
心腹痛甚者ニ用テ故烏梅丸鵝胡菜湯ナリノ劑ヲ投テ  
及テ發痛ル者方ヲ與テ弛ル者ハ必腹痛止リナリ  
鹿子蟲積痛ヲ治スルニ藥ノ苦味ヲ嫌ヒ強與テハ嘔噦  
タル者故方ニ宜シ論中毒藥不止ノ四字釋ク味ナハシ  
故ニ又衆病諸藥ヲ服メ嘔逆止マサル者ニ効アリ一婦  
人傷寒熱甚々嘔逆止マズ小柴胡ヲ用テ解セズ一医水  
逆トメ五苓散ヲ與メ益劇シ故方ヲ與テ嘔速ニ差即至

三、此吐急止後微熱煩渴不大便飲良方

婦人女子素患胃弱夜在不眠者人多  
定以症發則定定矣熱戰慄錯語心神恍惚  
唇不紅而微紅已服方立効之痼症狂  
症勢弱前証者亦有奇驗方也

甘麥大棗湯 口上 治急迫而狂驚者

甘草 大棗 小麦 右三味

此方婦人藏躁之症也凡藥中凡此方下劑  
傷人過拘攣之結塊也凡用此方下劑也

又小兒啼泣止之方也者用之速効也又大人小兒  
用之月有痛急者食甘緩之之意也昔小兒之先哲

啼客忤在拘攣之者用榮胡也右二拘攣之者用  
此方ト久レ氏派也一カラス客忤ハ大抵此方ニテ治ス

陷胸湯 治胸中心下結積飲食不消

大黃 黃連 甘草 枳實 芍藥 右五味

此方ハ大陷胸湯也小陷胸湯トノ間ノ藥也故ニ一匡中  
陷胸湯ト名ク結積胸中或ハ心下三アリテ拒痛スル者

ヲ治ス此飲食不消ハ胸中ニ邪アル故也中脘ニ滿ナト  
下ハ益宜ニ又小兒食積ヨリ胸中ニ痰喘壅盛スル者ヲ



老人若吐氣了者ハ并夏甘草ヲ加フニ  
甘竹茹湯月止治產後内虚煩熱短氣

・竹茹、黄芩、人参、茯苓、甘草、右五味

以水八升皮大九升下等輕者處用二升後煩熱了り

下利一名膏淋用力大等處宜之他病了り天内虚煩

熱下利四字ヲ目的トメ用レハ中ヲザルナシ甘淡音通

入淡竹也

高良姜湯同上治卒心腹絞痛如刺而脇支滿煩悶不可忍

・良姜、厚朴、芍药、桂枝

右四味又治肝經受寒而色青慘厥而泄利者

此方ハ心腹絞痛ヲ主トス故ニ只腹痛ノミニテハ効ナ

ク少シクテ心ニカ、ルヲ目的トス且痛ニ劇キ程ニ

口ニキナリ是以大建中ノ治スルヲ能ハサル處ニ高

中ニ良姜温中ノ効アリ安中散ニ伍スル是ト同ニ乾姜

ニ比シテハ其力一等優ナリ又厚朴ニ伍ス下利ヲ止ム

故虚寒下利腹痛ノ症直武トトニテ効ナキ者ヲ治ス有

一女年十九小腹塊アリ心下より小腹に生れり相  
急シテ痛甚を衝逆痛其方授へハカス  
默々トシメ飲之良ヲ欲セス臥微細足微令  
之驚動トメ莫ヲ與テ命ス示シ曰果症  
ナリ乃解急之蜀椒湯ヲ與テ服入ル數日  
衝逆止ミ小腹塊消サス但腹裏尚急  
飲之良愈マス因テ小建中湯加蜀椒ヲ與  
漸次快一服也  
一層脂腸塊ヲ生シ衝逆動シ刺痛  
逆煩躁然ヤント飲ス一服之ヲ服シテ益劇  
シ余與之病トシ方ヲ與テ兩三日ノ間利

持氏ハ病新ノ腹ニ滿アル者ヲ目的トメ用ニ腹滿十  
者ハ皆緩四逆重武專ノ之處ト云又奇効良方ノ良姜湯  
ハ此方ノ証ニメ一等腹ニ凝結アリテ下利不食スル云

加味理中湯方中

即理中湯方中加麥門冬

此方ハ理中湯ノ症ニメ咳嗽吐痰或ハ煩渴微腫スル者

ヲ治ス千金ニ理中湯ノ加減種々アリ此方ヲ尤古ニ

述スト

解急蜀椒湯外臺主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出

欲絶

即大建中湯附子緩急湯合方本無人參今從大建中湯

此方ハ大建中ノ附子緩急湯下ニ合ニタル方ニ其症

云ニ方ニ近ク寒病心腹ニ迫リテ切痛スル者ヲ主トス

烏頭桂枝湯ト其証勢急ニ此方上下ノ分アリ且烏頭桂

枝湯ハ腹中絞痛拘急轉側ヲ得ガハ力目的ト人此方ハ



[illegible]

力

四十五

婦人年五十餘建全拜其母名湯拜其  
為翻肉而腐腹及寸齒斷乃以腐藥  
拔去其翻肉服以地方而外用煎藥者  
凡百日餘毒盡而全愈

婦人年五十餘建全拜其母名湯拜其  
為翻肉而腐腹及寸齒斷乃以腐藥  
拔去其翻肉服以地方而外用煎藥者  
凡百日餘毒盡而全愈

ク脇下苦悶スル故大小柴胡ナト用エシ氏及テ敬スル  
者或ハ鳩尾ニテキビク痛ミ晝夜悶乱ニ建中浮心ノ  
類ヲ用エシ氏寸効ナキ者ニ與テ意外ノ効ヲ奏ス昔西  
京一婦人アリ心腹痛ヲ患諸医ナラズ盡メ愈ス一能ハ  
之ニ老匠以方ヲ用ニ貼ニ之霍然タリ其昔征韓ノ役清  
正ノ匠師ノ以方ニテ兵卒ヲ療セシ其氣滿ヲ揮霍セシ  
加故ナリ但局方ノ至治ニ不流スニ方ナク又蘇葉ハ能  
ク食積ヲ解ニ故ニ食毒魚毒ヨリ来ル腹痛又ハ喘息ニ  
紫蘇ヲ多量ニ用ヒハ即効アリ

甘露飲 口舌丈夫小兒胃中客熱牙宜齒爛目至欲閉錢不

飲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疹已發未發又療脾胃濕熱

醉飽房勞黃疸腹痛或時身熱並重腹之

生地黃、乾地黃、天門、麥門、枇杷葉、黃芩、甘草

石斛、枳實、茵陳、芍藥、華圓青劑以地方治各症極驗

此方ハ脾胃濕熱ト云カ目的ニテ濕熱ヨリ来ル口齒ノ

諸瘡ニ用テ効アリ若シ上焦腸熱ヨリ来ル口齒ノ病ハ加



桃冷腸散三非ハ効ナシ此方は調胃承氣ヤ厚心加石  
煎ナリ用ル程ノ即熱ニモ今ナラズ血虚ヲ帶テ緩ナ  
此處ニ用ナ也又黃疸腹滿ニ此方ヲ用ルハ茵陳蒿湯等  
ヲ用テ攻下ノ後濕熱未全ク除カサル者ニ宜ク房勞ニ  
ハ更ニ効ナシ

解勞散揚梅治積氣堅硬壅塞胸脇引背徹痛

即中逆散方中加黃甲茯苓  
此方ハ四逆散ノ變方ニテ所謂痼癆爲勞者ニ効アリ又  
骨蒸ノ初起ニ用エハ眞ノ虛勞ニハ効ナシ又四逆散

和症ハ大腹中ニ堅塊アリ者用テ特驗アリ

乾地黃湯良方婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱

地黃大黃黃連黃芩柴胡芍藥甘草石七味

此方ハ大柴胡湯ノ變方ニテ熱血分ニ沉滯スル者ニ効

アリ故全門熱入血室ヲ治スル正而ノ者ヲハ柴胡加地

黃トシ變而ノ者ヲ此方ノ治トスル也又傷寒遺熱ヲ治

スルニ參胡芍藥湯ヲ慢治トシ此方ヲ緊治トスル也

或人肩後骨疼痛其痛兩手三指其甚  
 書夜苦楚不堪人耳其之ヲ察シテ寸動ナ  
 シ小國ハ事親者ヲ湯ヲ與ハ別山草  
 辰砂木ヲ以燭鼻マシム鼻中清涕ヲ  
 流ス二三日病脱然トメ愈也  
 川芎茶調散方治偏正頭痛  
 薄荷 密閉子 荊芥 羌活 蒼朮  
 白芷 甘草 防風 細辛 水 煎 取  
 赤茶 湯 調 下 方 如 前 煎 取 湯 服

香茅湯傳門治偏正頭痛

石膏、桂枝、川芎、甘草、薄荷、荊芥

右六味中藏經無桂枝薄荷各香茅散名一切頭風

此方ハ中藏經ハ香茅散ニ本ツキタル張子知工夫

一着高クハ偏頭痛ニハ奇効アリ若此症ニハ肩背強急

上痛ハ者本事方ハ釣藤散ヲ佳トス

加味四物湯五傷名諸痿四肢軟弱不能舉動

羌活、麥門、黃蘗、蒼朮、地黃、芍藥、川芎、五味

子、人參、黃連、知母、牛膝、杜仲

右七味或去人參加羚羊

此方ハ滋血生津清濕ノ三功ヲ兼テ諸痿ヲ治ス凡痿証

ハ初起ハ叙方集驗ノ一方ニ宜シ若癰固ニハ動カ難者

ハ痿躄湯ヲ用テ之ヲ又筋變甚者ハ二角湯ヲ用ル有

若壞症ニテ中逆不振者ハ此方ニ宜シ蓋此方ハ大防風

トハ陰陽ノ別アリテ彼ハ專テ下部ヲ主トシ此方ハ專

上焦ハ津液ヲ滋メ下部ニ及ス其牛膝尤妙ナリ

上焦ハ津液ヲ滋メ下部ニ及ス其牛膝尤妙ナリ



栗園先生世ニ所謂海旁ナル者ヲ治スニ方ヲ用ニ解勞散ナリ腹裏  
拘急ヲ主トスニハ抑肝扶脾散ナリ志氣鬱塞ヲ主トスニハ黃芩湯ナ  
リ血燥羸弱ヲ主トスニハ

東野曰不然。應氏曰。無之。死。不  
利。於。生。之。事。子。孫。傳。之。明。功。  
於。後。世。之。事。名。分。制。之。於。下。  
皆。云。萬。方。之。長。有。功。於。生。死。之。  
事。人。之。所。附。子。孫。死。之。事。

香砂六君子湯  
治脾胃虛弱而兼宿食痰火飲食不進嘔吐泄心或泄痢後脾胃不調或風寒病後餘熱不退噎噦不止氣力弱者

即六君子湯方中加荊草縮砂藿香  
以方ハ後世ニテ尊奉スル訓ナリ氏奮砂ヲ能ハ開胃ノ  
手段ニテ別ニ哥効ハナシ但乎胃散ニ加ル片ハ消食ノ  
力ヲ速ニシ六君子湯ニ加ル片ハ開胃ノ力ヲ増スト心  
得ヘシ又老人慮人食后ニナルト至テ賦ケナリ頭モ重  
ク手足倦怠氣塞ル者以方ニ宜ニ若至テ重キ者半夏白  
朮天麻湯ニ宜ニ

加味逍遙散女科撮要  
即局方逍遙散方中加牡丹施子  
以方ハ清熱ヲ主トメ上ノ血症ニ効アリ故ニ逍遙散  
ノ症ニメ頭痛面熱脊脊強リ鼻衄十十アリニ在ナリ  
下部ハ濕熱ヲ解メ婦人ノ疲疾臍肝下トヨリ一等  
虛候ノ者ニ用テ効アリ凡テ以方ノ症ニメ寒熱甚ク胸



腸二直リ吐氣考アル者ハ小葉胡楊ニ施丹ヲ加フハ  
又男子婦人遍身ニ疥癬ノ症者ヲ藥ニ甚痒諸症効ナキ  
者此方ニ四物湯ヲ合メ驗アリ華岡氏ハ此方ニ地骨皮  
荆芥ヲ加テ鵝掌風ニ用ユ又老臣ノ傳ニ大便結人朝  
夕快ク通セ又ト云者何病ニ限ラズ此方ヲ用レハ大便  
快通ノ諸病モ治ト云即小葉胡楊ヲ用テ津液通スルト  
同旨ナリ

加味犀角地黄湯曰春一壘吐血衄血咳血咯血唾血並皆治  
之

即千金犀角地黄湯加當歸黃芩黃連

此方ハ即千金犀角地黄湯方後ノ加減ニ本ツキモノ者

ニノ諸失血ニ用ヒ易シ方後ニ若吐血紫黑血塊胸中氣塞

加桃鴉トアレ比如缺症ニハ桃梗承氣湯ヲ用ルニ優ト

ニ過於病ハ犀角ヲ升麻ニ代テ治血衄劑トス亦千金ニ

據ル者ナリ

加減涼膈散曰上治三焦火盛口舌生瘡

和由東郭曰丹毒、先涼膈散加石美  
ナト用ラヨシ免角熱毒多急解云

大黃、黃芩、桔梗、名膏、薄荷、連葉、旋子、甘草  
 若ハ味加桔梗防風菊衣不通車前子療眼疾  
 以方ハ涼膈散ヨリハ用ヒ易ク口舌ヲ治スルノミナラ  
 之諸病ニ治用スハ在人ノ膈散ヲ調胃承氣ノ變方ト  
 スレバ其方意ハ膈熱ヲ主トシ浮心諸類ニ近シ故ニ系  
 膈散ノ一等劇シキ處ハ三黃加芒硝湯ヲ用ルナリ  
 香枳湯同上治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉浮遲而  
 弱以名寒脹

厚朴、木香、肉子、若三味  
 以方ハ寒氣腹痛ヲ治ス中寒或霍亂吐浮ノ後間決症ヲ  
 リ大抵厚朴生姜甘草半夏湯ノ等重キ者ト知ルハ

行濕補氣養血湯同上治氣血虛弱腹鼓脹存腫  
 人參、蒼朮、茯苓、芍藥、川芎、木通、厚朴  
 大腹皮、蘿蔔子、海金沙、木香、橘皮、甘草、蘇葉  
 若十五味

力



此方八鼓脹ノ未症ニ用ルナリ辨前治鼓脹一方條下ニ  
見工

加減逍遙散清世子午潮熱者宋國先生曰治婦人血熱期時

老若奇効

當歸、芍藥、白朮、萊菔、茯苓、胡黃連、麥門、甘

草、黃芩、秦艽、木通、地骨皮、車前子、右十三味

此方ハ婦人血熱固着ノ骨蒸狀ニ似タル者効アリ就中

小便不利或淋瀝スル者ニ宜シ

加味升陽涼濕湯清世金書治下利大便裏急後重數至廁而

不能便又拘急白膿血便勿利之升其陽則瀉其自退矣

防風、芍藥、茯苓、葛根、甘草、蘇葉、山查子、獨

活、木香、乾姜、桂枝、生姜、右十三味

此方ハ桃花湯白頭翁湯ノ後重ニ非ス又大柴胡湯四

逆散ノ裏急ニ非ス一種濕熱ヨリ来ル處ノ類痢ニ

裏急後重スル者ニ効アリ後世痢疾ノ初起後重甚ヤニ

然ルハ升陽涼濕湯ヲ用工ニ効ナシ以馬合ハ葛根湯

加味胃益湯方中玄蘇葉、本青、生  
 姜、芍藥、加丁香、高麗、赤小豆、桂  
 枝、治飲食不化、水腫、如神也、  
 陸

ニテ發汗スルハ後重ユルム者ナリ

加味四君子湯正宗治痔瘡痔漏下血不止面色痿黃心忪耳

鳴脚弱氣乏及一切脾虛口淡食不知味又治中氣虛不能

攝血致便血不禁者並効

即四君子湯方中加白朮、芍藥、生薑、大棗

此方ハ下血止マ、面色萎黃短氣心忪スル者ヲ治ス、四

君子湯ト理中湯ハ下血虛候ノ者ニ効アリ、肚門潰爛ノ

膿血ヲ出ス者ハ直ニ四君子ニ黃芪、槐角ヲ加テ宜シ、又

松子ノ經脈也又痛ア、ン者ハ四君子ニ黃耆、建中湯ヲ合

シ、白扁豆砂人ヲ加ルニ宜シ、即朱氏ニ妙散是ナリ

加味胃益湯藥事治一切水腫脹滿隨証加減効効如神

、蒼朮、茯苓、猪苓、澤瀉、厚朴、橘皮、蘇葉、木香

、白朮、生薑、芍藥、十一味

此方ハ水穀不化ヨリ来ル水氣ヲ治ス、傷寒差後ニ用ル

ナリ又痢後風ニハ別メ効アリ

行氣香蘇散 金鑑名曰傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿

力

四九



疼痛外感風寒氣逆頭痛身熱增寒遍身骨節麻木疼痛七  
情惱怒相冲飲食不下心腹氣痛栗園先生曰治病狹內熱  
諸藥與効者

柴胡、獨活、木香、烏頭、蘇葉、蒼朮、川芎、獨活

右十一味偏墮氣增寒壯熱者加茵香木香我水三校不通  
效方ハ香蘇散ノ症ニメ滯食ヲ兼邪氣内壅メ解セサル  
者ニ効アリ往々至局夫原健助十ニ者平素疝塊アリ飲  
食爲之化スル能ハス時々外感メ邪氣遷延ニ至諸外感  
ノ藥ヲ投メ解セメ余效方ヲ與テ愈後外感毎ニ效方ニ  
テ百中ノ後世ノ方策亦毎ニハカラス

加味小陷胸湯 治火動其疾嘈雜

即小陷胸湯方中加枳實枳子

效方ハ嘈雜ニ音効アリ外薑小呂半夏茯苓湯ニ心下注  
洋嘈煩ノ語ヲル本事方嘈雜ニ作ル之ヲ始トス胸ノヤ  
ケル下也大抵ハ安中散ニテ治スル氏劇者ハ效方ト云

洋醫所謂慢性萎縮性鼻炎云々  
臭鼻ノ症方ニヨリ

初生児胎毒強ク面色紫青髪稠密者等  
九ノ葉用 得嬰類如  
初生児其色青紅頭發黃枯節々而形體  
言麻痺帶聲低而少者方主之 人多甘草  
黃耆 自戒石水魚腹 口前

萊菔湯ニ非サレハ効ナシ

加味ハ取散 治鼻常在患鼻年久愈

猪苓、澤潯、茯苓、木通、地黃、藁本、枳子、杏仁

知母、黃蘗、古十味

此方ハ鼻淵腦漏ノ如ク臭水ヲ流スニ非ス唯鼻ニ一瘡

ト患鼻ヲ覺テ如何トモシ難キ者ヲ治ス又鼻墨臭香ヲ

通セサル者ニ用テ下有

加味ハ萊菔湯李朝花匠傳治暑疫協熱痢

即ハ萊菔湯方中加竹筴麥門黃連滑石十枚也

此方ハ一老匠ノ傳ニ夏秋間ノ傷寒協熱痢ニ經験ヲ

取リシ方ナレバ余ハ毎ニ滑石ヲ去リテ入參飲子ノ邪

勢一尋重ク煩熱心悶スル者ヲ治ス又竹筴溫胆湯ノ症

ニハ性寒寒熱スル者ヲ治ス

甘連湯取原方出小児初生至四五歳便不和吐乳腹脹滯食

無故發熱夜啼腹痛諸証皆主之

甘草 黃連 紅花 大黃 右四味



此初生嬰兒氣不通者 左右足細脈分調小通上  
此方加膏金一種小兒胎毒二因以客傷而  
奇功了了和以傳但更外肌表動靜  
發瘡毒一切之胎毒用之

此方ハ專ラ胎毎ラ去ヲ主トス世マクリト觸スル者數  
方アリ比以方ヲ優トス連竟ヲ加テ吐乳ヲ治シ錢連亨  
ヲ加テ驚癇ヲ治シ竹葉ヲ加テ腹痛ヲ治スルカ如キ  
治用尤廣シ

甘草黃連石膏湯東洞

甘草、黃連、石膏、三味按本事方名鵲石散治傷寒

狂或棄衣奔走踰垣上屋

此方出處詳ナラザル氏本方ニ石膏散ト云テ黃連

焦ノニ味ヲ末トシ甘草煎汁ニテ送下ス方アリ東洞

方ノ意ニテ用ト云今方家參連白虎湯ノ之處ノ驚癇

用ユ又風引湯ノ劇キ症ニ用ユ又胃ノ痛ニ用ユ兒二三

歲ニ至ルマテ骨格不堅諸藥無効ニ此方ニテ治シタリ

此方ハ凡テ煩熱渴ヲ主トメ用ユ一ハ余缺方ノ症ニメ

吐逆ニシ者ニハ半夏加茯苓湯ヲ主メ効ヲ奏ス

甘草湯腹証奇驗 名痼癲腹中拘攣急迫或腹滿時々息迫上

衝者

甘草、桂枝、芍藥、河膠、大黃、右五味

此方癰腫之急迫ヲ緩メニ効アリ、紫胡龍骨牡蠣湯、紫  
圓或ハ沉香天麻湯ナト投シ反テ激動シ苦肉止マサル  
者此方ヲ用ルトキハ一時ノ効ヲ奏スルナリ

加味四物湯、福井梅毒有壯熱者先用此湯解其熱後用高良劑  
當飯、地黃、知母、黃蘗、黃連、蔓荊子、旋子、川

芎、右八味

此方能徵毒ノ壯熱ヲ解ス蓋徵毒ノ熱ヲ解スル者小葉  
胡加竜膽胡黃連ニ如ク者ナシ若其人血燥メ熱解シカ  
タキモノハ此方ニ宜シ又徵毒ノ熱アル者承劑ヲ投ス  
ハカラス血燥ニハ土茯苓ヲ用ユハ力ナド楓亭ヨリ以

昔ヲ得タリ

暖高方東郭○台州方鈴名加味百合地黃湯、用法同要之暖  
方亦同

、麦門、阿膠、百合、乾姜、白朮、地黃、五味子、甘  
草、龍鞭、右九味



此方ハ束郭ノ経脈ニテ肺痿ノ咳嗽ヲ治ス若熱ニ屬ス  
ル者ハ聖濟人參養榮湯ニ宜シ此方ト昇岳ノ四陰煎ハ

伯仲ノ方トスヘシ

甲字湯南陽理療血

即桂枝茯苓丸科方中加甘草生姜

此方ハ桂苓丸ノ症ニシテ數スル者ニ適當ス若塊癰動

カサル者ハ蠶甲ヲ加フヘシ

香葛湯本治暑熱感冒

即香蘇散方中加桔梗葛根

此方ハ暑熱感冒ニ効アリ其他感冒桂麻ノ用ト難者對

酌ニ與フヘシ

加味寧痛湯家方

即寧痛湯方中加橘皮茯苓

此方ハ予家ノ經驗ニメ沉痾滯氣湯ノ症ニメ一等衝逆

甚キ者ヲ寧痛湯トス寧痛湯ノ症ニメ一等衝逆劇ノ胸

中痞悶ニメ此方トス橘皮茯苓ヲ加ル所以ハ外臺茯苓

加減滲濕湯ノ症ニ懸寄ノ煩見ニ症ニ  
 洋医所謂浸性皮膚炎ノ症ニ  
 肉芽腫起ス中不能或不便  
 痛等ノ症カ目下ノ桂芍知母湯  
 ノ症ニ寄重キ者ナリ

淺田宗國先生常加折肝散江芍  
 藥黃連解羊角

苓飲ト同ク胸中ヲ至トスル也

加減滲濕湯、當飯、芍藥、地黃、木香、乳香、縮砂

、牛膝、甘草、黃芩、橘皮、茯苓、防風、獨活、蒼朮

與部

、桂枝、右十五味

薏苡附子散科、全道、治胸中痺寒或浮腫者

薏苡、附子、右二味

此方ハ散ニテ瞑眩ニ堪一カタキ故科トスルナリ胸痛  
 急劇ノ症ヲ治ス又腸癰急ニ脱候ヲ現ス者ニテ用ユ

抑肝散、撮要、治肝經虛、發搐或發熱、咬牙或驚悸、寒熱或不

寐土而嘔吐、痰涎、腹脹、少食、腫臥不安

、柴胡、甘草、川芎、當飯、白朮、茯苓、鈞藤

右七味、東郭去白朮、茯苓、加芍藥、名抑揚、又去川芎、加半夏

、旋子、黃連、新草、名加減抑肝散

此方ハ四逆散ノ掌方ニテ凡テ肝部ニ屬シ筋脈強急ス  
 ル者ヲ治ス四逆散ハ腹中任脈通リ拘急ハ胸脇ノ下ニ



白濁丸  
治一切  
淋病  
白濁  
赤白  
帶下  
等症

衝之者ヲ主トス此方ハ左腹拘急ヨリノ四逆筋脈ニ掌  
急スル者ヲ主トス此方ヲ大人半身不遂ニ用ルハ東郭  
ノ經驗ナリ半身不遂并ノ不寐ノ証ニ此方ヲ用ユルハ心  
下ヨリ任脈通リ變急動悸アリ心下ニ氣聚リテ痞スル  
氣味アリ延年ヲ以按セハ左ノ三見ハナク病人ニ同ハ  
ハ必病ト云又左脇下梁チレ氏少筋急アル症ナラハ怒  
氣ハナシナト同ハ三若怒氣アルハ此方効ナシト云  
下シ又道遠散ト此方トハニ味ヲ異ニメ其攻用同シ  
テス此處ニ着眼メ用ユルハシ

薏苡仁湯正宗

、即四味腸癰湯方中加芍藥

辨見于腸癰條

薏苡仁湯用臣指掌治牛足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸

、薏苡、芍藥、芍藥、麻黃、桂枝、甘草、蒼朮、三七味

以方ハ麻黃加朮湯麻黃杏仁薏苡甘草湯ノ一等重牛處

一用ルナリ其他桂芍如母湯ノ症ニメ附子ノ應セサル

五十二



若雷聲隆隆然定矣。頭眩腹痛如裂。晝夜不能眠者。若心下痞胸膈煩熱者。兼服浮心湯。黃連解熱湯。若苦熱胸膈有飲。心中滿。肩背痠痛者。當以瓜蒂散吐之。又治小兒丹毒赤。逆大熱煩渴驚風。或疾喘壅盛者。兼用葶藶散或龍葵丸。尾莖。

便不通身體凝固シテ起卧スルヲ能ハス時

么惡寒入其子屢治水入其腹益甚

先生云又曰水ナリ大奔行スヘシト云方

三因ヲ九機切シ興テ全愈橋

范狂症胸脇疼痛示鞭塞腹拘率壇中動其

者加戴新有奇効又治鐵毒沉滯頭痛

耳鳴眼目雲翳或赤脉疼痛

腹中平者時心以氣在胃同散等攻之大便下

結者加云硝房佳及重

一、各々其森々シク、左脇下鞭満大リ、盤ノ

如少腹及耳內痛時仁侯三有熱

子川之丁卯之夏遊重更身懷三朝慶之

西申春草然三西シハナリミヤヤクカ如ク才才

三才圖會

[illegible]

大青龍湯傷寒論治時疫咳嗽渴欲飲水上衛身痠重者

麻黃、桂枝、甘草、杏仁、生薑、大棗、芍藥、七味

此方發汗峻矣、劑ハ勿論ニ、其他過飲或肺脹其脈緊

大表症盛す者ニ用テ効アリ又天行毒服或ハ風眠ノ

初起方ニ車前子ヲ加テ大發汗スルハ高効アリ蓋

風眼ハ目ノ受熱ナリ故ニ暖祭ニ非シハ効ナシ万位ハ

蘇黃易ノ一等重キヲ方卜ル也

火藥用易同上。名小葉用易正。而腹滿拘攣。乏劇者。

藥用。黃芩、芍藥、半夏、生姜、甘草、大枣。

五八林口鳥用定名變指小大交魚其平置切上因市大黃

老人以力起者，其腹脹不大，便熱甚，皆臍而吐蛔者，又加

草名大黃加羊銑煎甘草名大

新爭餒其  
 他  
 所  
 加  
 不  
 會  
 管  
 分  
 香  
 附  
 子  
 甘  
 溫  
 平  
 性  
 加  
 益  
 自

方方陽ノ極地ニ用ハ勿論ニ又ハ下急當々微煩ト云

今日の世、所謂痛症、溺室ニ用エ凡ハ非常ノ

聖藥先生常言黃ヲ去シテ用  
左明下有塊癖等症加黃芩中自

若經水調上衝甚報中生理膜或赤脈起延脘  
胞立爛或齒齒之痛小便急者又治打撲  
損傷腹又救家少腹急結痛連腰胸莖中疾

効ヲ奏ス惠美三白ハ此症ノ一等重キニ否附子甘草ヲ  
加フ高階枳實ハ大聖太黃ヲ去幹羊角鈎藤甘草ヲ加フ  
何レモ痛症ノ主藥トス方今半身不遂メ不語スル者世  
匠中風ヲ以目スレハ肝鎖經逆ヲ塞キ血氣ノ順行ヲシ  
ク遂ニ不遂ヲ為也肝實ニ屬スル者以方ニ宜シ尤左脇  
ヲリ心下一カケヲ凝リ或ハ左脇ノ筋脈拘攣シ之ヲ按  
テ痛大便秘シ喜怒哀等ノ証ヲ目的トスベシ和田家ノ口  
訣ニ男婦共ニ櫛ケツル髪ニ髮ヌケ年不相應ニ髮ノ少  
ナキハ所火ノナス處也此方大ニ効アリト云又痢疾初  
起發熱心下痞メ吐下ニ症早ク此方ニ目ヲ射ヘシ又  
小兒疳積ニ毒ヨリ来ル者ニ此方加苜蓿ヲ用テ其勢  
ヲ挫キ其跡ハハ葉胡小建中ノ類ニヲ調理スル也其他  
茵陳ヲ加テ發黃心下痞積者ヲ治シ鶴胡菜ヲ加テ蛇蟲  
熱吐ヲ治スルノ類運用最廣シ  
●桃枝承氣湯日上 治血症小腹急結上衝紫  
●芒硝 大黃 桂枝 甘草 桃仁 石五味 瘀血 發瘕 加

夕



荊芥血瀝痛加附子表泄吐血覺胸中氣塞上吐紫血  
 次方傷寒舊血少腹急結う若スルハ勿論ニメ諸血証ニ  
 運用スニシ警ハ吐血衄血止マサルカ如キ次方ヲ用ヅ

レハ効ナシ又走馬疳漸血不止者以方ニ非レハ治  
スルヲ能ハス癰疽及瘡瘍發黑色ニハ內陷ヤント欲ス  
ル者以方ニテ快下スルハ思フ外揮發スル者ナリ又  
婦人陰門腫痛或血淋ニ効アリ若產後惡露下ルヲ少ク  
腹痛者ト胞衣下ラヌヲ日ヲ經ル者トハ以方ヲ煮上テ  
清酒ヲ入飲ミテニハイ宜クメ徐クニ與フベシ又打撲  
經閉等瘀血ノ腰痛ニ用テ瘀血ノ目的ハ必晝輕メ夜重  
者也痛風候ニテ晝輕メ夜痛ミハケシキハ血ニオウル  
者也又數年齒痛止マサル者以方ヲ丸トメ服スレハ驗  
アリ其他荊芥ヲ加テ瘧病及發狂ヲ治シ附子ヲ加テ血

大陷胸湯凡上  
治結胸從心下至小腹  
鞅滿而痛不可近者

天黃、芒硝、甘草、台三味

台三味

打肩急以披針放血與六分取收浮可以  
回一生於九死矣又小兒急驚風胸滿心下  
名鞭咽喉痰潮直視症乎胸動奔馬也

者真心痛之下脈弱苦悶欲死者宜吳方尺蠖

一男年十腹滿痛吐甚其家ヲ納ル一婦之症病トモ之聲之増劇シ胸腹脹痛煩躁見ル思ハ余其方ヲ作リ淡煎ヲ飲セシハ須臾ニシテ吐利傾クカ如ク腹之痛煩躁頭ニ減シ後更中陽ヲ與ハ時ニ大渴胎丸ヲ兼用シテ予復之病

一閑齊門人楊誥順治一婦人頭髮發火每梳之覺火氣至夜即見火與三黃相若湯產。予親婦歸家衣裏有煤習投之於暗處首見火珠皆肝火之所為不足佐其先哲証

胸氣胸腹脹滿一身浮腫胸動如忍清氣而逆一便閉者衝心之甚也非方不難折斷其迅劇之勢湯將旋轉之毒也八味九種可參者接腎之腹中有堅硬便怒燥尿寒有力者非方不能治也附子湯真神湯其方皆可用云佳老劑度大熱腹滿痛如錐刺口舌乾燥或破裂

此方熱實結胸ノ主藥トス其他胃痛劇者ニ特効アリ一士人胸背微痛晝夜苦楚忍フヘカラス百治効ナク自死セントス大陷胸湯ヲ服スル三貼ニメ霍然タリ又脚氣衝心昏悶欲絶者此方ヲ服メ蘇セリ凡醫者死地ニ臨テ又此方致無シハアルベカラヌ又留飲ニ因テ肩背ニ凝者ニ速効アリ是ヨリメ小兒ノ龜背ナドニモ此方ヲ用ルヲアリ其輕キ者ハ大陷胸丸ニ宜シ又小兒龜胸ニナラント欲スル成此方ヲ早ク用シハ効ヲ收ルモノナリ

大黃ニ連浮心湯口上 治心煩不安痞按之濡者

大黃、黃連、黃芩 右三味

此方ハ上焦浮下ノ劑ニメ其用尤癰シ局方三黃湯ノ主

治熱讀スバシ但氣急ト云フ目的ナリ

大承氣湯口上 治腹堅滿或下利臭穢或燥屎者

凡有燥屎者腸下必熱也肌膚有之枯燥也

大黃、厚朴、枳實、芒硝 右四味

此方ハ胃實ヲ治スルカ主劑ナリ凡承氣ハ即順氣ノ意ニテ氣ノ凝結甚キ者ニ治用スルノ有當歸ヲ加テ痰在

夕

廿五



老人海頭痛多寢其痛乃ニテ奪カカリ  
 詔ヤルルヲ四日餘諸臣奏スルヲ得ズ  
 余診スニ腹痛シテ大便秘通十四日之上苦  
 面目黧黑乃其方以劑ヲ與テ下利スル  
 去其行諸症頓ニ退キ六七日ニシテ全ク治シタ  
 リエヒヨリ腹滿シテ偏頭痛スルモノアリハ其  
 ノ方以藥ヲ功ヲ得又去テ下利方使覺

当、四逆湯同上  
 、当、桂枝、芍药、细辛、大枣、甘草、通草、左七味  
 决方ハ厥深表寒ノ厥冷ヲ治スル薬ナリ元桂枝湯ノ  
 薬方ナレハ桂枝湯ノ症ニメ血分ノ閉塞スル者ニ用テ  
 効アリ故ニ先哲ハ厥深病ノミニ非ズ寒熱脈緩シテ乎

東郭氏曰凡生湯之症之門畢九  
又曰婦人經閉之症下利之症  
加吳茱萸湯之症又曰經閉之  
症之胸腹之症及腰之症手足  
痛之症而微利腰脚酸麻或微  
腹者之症

一婦人年三十二歲食之、マズ日ニ腹痛  
シ腹痛之症一三月許諸症血積トシ  
テモ治之或ハ瘀血ヲ下入藥ヲ用テ病イ  
コシ甚シ余診スルニ脘傷ニ塊物アリ  
牛走リヒロケタル如クニシラ下及ニ腸肋  
ノ物多ク重クコレヲ按ヤハ痛クハツカラス  
輕クコレヲ按ヤバサマナシ乃決方ヲ作  
與テ病日ニ消シテ全愈ニ方候

老人傳食醫曰軍國之省人事中滿腹腹之面  
血色顯上於行脈伏如起其狀形勢中風者特

足冷ニ可用ト云又加吳茱萸生薑ハ後世ノ所謂病積ノ套  
劑トナスハハ臨癰ノ輕キハ決方ニテ治スル也若重キ  
者ハ高功散ヲ兼用スルニ  
当飯四逆加吳茱萸生湯日上  
即當飯四逆湯方中加吳茱萸生薑

辨見于前

大建中湯金匱 治胸腹大痛嘔不能飲食腹皮起如有頭足者

蜀椒、乾姜、人參、膠饈 右四味

決方ハ小建中湯ト方意大ニ異ナレ膠饈一味マルニ

決方建中ノ意明ナリ寒氣ノ腹痛ヲ治スル決方ニ如

ハナシ蓋大腹痛ニハ胸ニカ、リ、心、カ、腹中塊ノ如

ク凝結スルカ目的也故ニ諸積痛ノ甚クメ下カラ上ハ

ハ決方ノ一等重キ者也又小建中湯ノ症ニハ一等衰弱

腹裏拘急スル者ハ千金大建中湯ヲ宜トス

大建中湯方 治腹絞痛惡寒者

大建中湯方

治腹絞痛惡寒者



芒良前度屬宜附之  
新崎同林云腰痛接痛宜食之  
多アリ方ヲ用テ大ニ切ルヲアリ

東都新記云  
在在作新  
百

大黃、附子、細辛、右三味

此方ハ偏痛ヲ主トス左ニテモ右ニテモ拘ルナシ胸  
下モ廣ク取テ胸肋ヨリ腰マテモ痛ニ用テ宜シ但シ馬  
頭桂枝湯ハ腹中ノ中央ニ在ラ夫曰リ片腹ニ及モ也  
此方ハ脇下痛ヨリ他ニ引ハルナリ蓋大黃附子ト伍ス  
ル者皆尋常ノ症ニアラズ附子浮心湯温脾湯ノ如キ示  
然リ凡頑固偏僻拔キ難モノハ皆陰陽兩端ニ滯ル故ニ  
非常ノ悟ヲ為ス附子石羔ト伍スルモ示然リトス  
大半夏湯口上外臺云治心下痞硬者及憂怒之餘得食  
輒噎胸中逆七痛

東周先生遺附此方也

半夏、人參、蜜、右三味

此方嘔吐ニ用ルハ心下痞鞭カ目的ナリ先小半夏湯  
ヲ與テ不差者ニ此方ヲ與フハシ大小柴胡湯大小承氣  
湯ノ例ノ如シ蓋小半夏湯ニ比スルハ蜜ヲ伍スルニ深  
意アリ腸咽ノ間交通ノ氣降ヲ得ヌメ嘔逆スル者蜜ノ  
賦潤ヲ以テ融和シ半夏人參ノカラメ徐々ニ胃中ニ翰

事同先生主治大便秘閉急迫者

茅根花柳損名顯日赤湯治蛇虫心腹痛惡心  
症候之診施用之法詳于楊黃區說小兒好食生  
米茶炭壁泥或偏嗜五味者屬蛔虫宜攻方又  
小兒三歲以上五七歲以內服面磨黃飲之良  
好是時年例不省人事直視身如驚風  
而昏者有顧瘤者宜早用鷓鴣湯殺伐蛇虫  
蕩滌腸垢可以免後患是也

大

大黃甘草湯

右二味

以方八所謂南無ヲ求ント欲セハ必先北牖ヲ開ノ意ニ  
テ胃中ノ壅滯ヲ大便秘ニ導キテ上逆ノ吐ヲ止ル也姪  
娠惡阻不大使者亦効アリ同理也丹溪小便不通ヲ治ス  
ルニ吐法ヲ用テ肺氣ヲ開提シ上竅通メ下竅亦通セシ  
ム此方ト法ハ異ナレバ理即同キ也其他一切ノ吐瀉  
胃ノ熱ニ屬スル者皆用エハ胃熱ヲ解セント欲セハ  
大便秘結或食已即吐或手足心熱或目黃赤或ハ上氣頭  
痛セハ胃熱ト知ヘシ上沖ノ症ヲ目的トヌ用レハ大十  
ル誤ハ十三虛症ニ天大便秘久ク燥結スル者此方ヲ用是

旋セシム古方ノ妙ト云ヘシ故ニ此方能腸噎ヲ治ス腸  
噎ノ症ハ心火逆滿シラツフツト枯燥メマリ此方必  
ス効アリ若枯燥セザル者ハ水飲ニテ上ノ腸ニテ効ナ  
シ又胃反腸噎トモニ食ニムセキ氣力乏キニ此方ニ  
羊角ヲ加テ用テ羊角ノ能ハ外薑羚羊角湯ノ條ニ辨ス  
大黃甘草湯口上蒙國先生曰小兒吐乳大便秘服之

父



小便淋瀝  
腸癰、父頭汗アリ。頭面赤者ナリト東郭

大黃牡丹皮湯ハ子ヲ墮要ス。絞リ動アリト前  
產後惡露不盡過數日更熱交作脈數急小  
腹或腰骨痛劇者癰腫之兆也。能審病之  
情機早可以下之。已膿潰者宜早方  
一女子十四歲初左腰腫痛。食後發熱  
毒消々膿汁淋瀝。下之。膿大如脂。直下  
持ノ。努。三。日。下。ア。タ。ハ。ズ。ニ。六。日。下。及  
ブ。諸。毒。遂。入。ル。一。日。得。入。余。ニ。治。ヲ。求。メ。即。チ  
放。方。ヲ。下。シ。飲。シ。メ。時。を。見。覺。ス。九。ニ。テ。二  
日。改。兩。月。餘。ニ。シ。テ。全。ク。愈。タリ。古。方。使。實。

此方ハ、  
大黃牡丹皮湯ハ、  
子ヲ墮要ス。

妊娠產後下利腹痛、便不利、腸癰、癰腫、方或  
或腹目赤、痛者、若下利不止、是定者、加附子、若不下利、人便、必者、加大黃、又婦人經斷、已三四月、診之、有腹中寒、急胎、不應、子年、或腹中痛、痛類血瘀。

權道ナリ、必之粒ニ膠ス、ハカラズ、讚州ノ御池、字作ハ、其  
方ヲ丸トメ、多ク用エ、即今ノ大甘丸、中川修亭ハ調胃承  
氣湯ヲ丸トメ、能吐水病ヲ治ス、ト云、皆同意也。

大黃、牡丹皮、桃仁、瓜子、芒硝、右五味

此方ハ、腸癰膿潰以前ニ用ル藥ナリ、凡其ヲ桃核承氣湯

ト相似タリ、故ニ先聲、瘀血衝心ニ運用ス、凡桃核承氣ハ

証ニメ、小便不利ス、人者ハ、此方ニ宜シ、其他内痔、毒淋、便

毒、用テ効アリ、皆排血利尿ノ功アルカ故ナリ、又痢病

魚腦ノ如ク下ス者、此方ヲ用ユ、ハ効ヲ奏ス、若虛スル

者、駝車丸ノ類ニ宜シ、疝疾久ク痊サレ者、小腸胃腐爛

メ、赤白ヲ下ス者、ト見做ス、トハ後藤良山ノ發明ニメ、奧

村良箴其說ニ本キ、陽症ニハ、此方ヲ用ヒ、陰症ニハ、薑、苳

附子敗醬散ヲ用テ、牛膝ヨリ治スト云、古今未發ノ見ト

云フヘシ  
當改芍藥散科同上

此方ハ、  
大黃牡丹皮湯ハ、  
子ヲ墮要ス。

不止者有奇効  
留東郭曰妊婦大腹痛ニ常々香薷散ハ小劑ニ合シテ用スルニ功アル者ナレ  
又白朮血過多ノ眩暈悸ろ體工故ニ滿下  
經水チロト多クンテ目眩スル、類考改  
膠必温、陽ヲ輕キニ泄方、用ニ功アリナリ、皆歎曰左ノ症ニ聯珠履ハ  
更テ功マレバと思フ

其男子素虛三藏少氣物三堪北能  
之腹重者危時之矢精其脈沈  
細臣多江虛旁卜之案謬曰天票  
薄弱自北刊氣三虛旁工証口奔之  
此非工權天食滿液一江七八年  
可也三已一三味建中加地黃  
也勝易方之按一真桂枝加竜蛇  
方江之歸卧三服工一服

十日腹中動輒若驚者胎氣速脹又懷妊已累月胎氣縮小長腹中拘急者亦宜此方又

・當歸・芍藥・茯苓・白朮・澤浮・川芎 右六味

此方ハ古益南涯得意ニテ諸病ニ皆用ス其治驗續建殊

録ニ悉シ全体ハ婦人ノ腹痛ヲ治スル刀本ナシ凡如

血ニ利水ヲ兼タル方故建中湯ノ症ニ水氣ヲ兼ル者カ

道遙散ノ症ニ痛ヲ帶ル者カ何レニモ廣ク用エベシ葦

岡青州ハ吳茱萸ヲ加テ多ク用ラレタリ又胎動腹痛ニ

此方ハ疝痛トアリ芍歸膠攻湯ニハ只腹痛トアリテ輕

キニ似タレ凡爾ヲス此方ハ痛甚クハ大腹ニアルナリ

膠艾湯ハ少腹ニアルテ腰ニカハル故早ク治セサレハ

將隨胎ノ兆トナル也二湯ノ分ヲ能辨別メ用エハミ

當歸建中湯同上 金匱要婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止或

・當歸・桂枝・芍藥・生薑・甘草・大棗・膠饅 左味

轉小建中湯ノ條下ニ詳ニス方後地黄阿膠ヲ加ル者去

血過多ノ症ニ用テ十補湯ナトヨリハ確當ス故ニ余上

部ノ失血過多ニ千金ノ胎前湯ヲ用ヒ下部ノ失血過多

ニ此方ヲ用テ内補湯ト名ツク



男、女、體、肉、小、腹、滿、痛、者、淋、毒、沉、滯、微、熱、小、腹、滿、痛、  
 不可忍、腹、滿、者、皆、能、治、之、是、也、  
 一、僧、三、人、淋、瀝、下、重、一、數、字、時、腹、中、  
 出、或、米、泔、水、如、大、便、下、利、之、時、必、閉、在、  
 下、利、之、時、必、淋、瀝、之、時、必、閉、在、  
 余、診、之、必、少、腹、滿、之、時、必、閉、在、  
 中、之、時、必、少、腹、滿、之、時、必、閉、在、  
 子、病、之、時、必、少、腹、滿、之、時、必、閉、在、  
 或、婦、人、之、時、必、少、腹、滿、之、時、必、閉、在、  
 療、之、增、劇、通、曰、死、則、命、是、危、此、是、余、乃、  
 與、方、大、小、便、快、利、得、其、人、必、安、然、以、之、虛、不、可、長、湯、  
 之、君、子、知、之、其、藥、之、在、之、則、斷、之、沉、病、全、愈、  
 一、女、子、下、利、不、良、虛、弱、少、氣、肌、熱、  
 足、微、腫、在、腹、中、不、治、之、余、診、白、脈、沉、  
 之、數、之、且、腹、中、或、之、或、之、或、之、  
 腹、之、數、下、利、止、之、食、進、之、遂、之、愈、

大

大黃、甘遂、湯、口、上、治、小、腹、滿、如、敦、狀、小、便、微、難、或、經、水、不、調、者、

大黃、甘草、阿膠、右三味

以、方、八、水、血、二、物、去、之、主、之、水、氣、力、重、之、ナ、リ、テ、

血、八、客、ナ、リ、微、難、ト、云、者、ハ、一、向、不、通、ニ、非、之、以、症、ニ、多、ク、ア、

此、者、ナ、リ、然、之、婦、人、急、ニ、小、腹、滿、結、小、便、不、利、ス、ル、者、ニ、速、

効、アリ、又、男、子、病、ニ、ラ、小、便、閉、塞、少、腹、滿、通、ス、ル、者、以、方、尤、

驗、アリ

大

建、中、湯、今、生、內、虛、絕、裏、急、少、氣、今、足、厥、逆、少、腹、脹、急、或、腹、滿、

弦、急、不、能、食、起、即、微、汗、出、腸、痛、或、腹、中、寒、痛、不、堪、勞、苦、唇、口、

全、乾、精、自、出、或、年、足、不、寒、中、熱、而、煩、苦、酸、疼、不、能、久、立、多、夢、

補、中、益、氣

黃、耆、人、參、當、歸、桂、枝、大、棗、半、夏、生、姜、芍、藥

附、子、甘、草、右、十、味

辨、前、金、匱、大、建、中、湯、一、條、二、見、二、同、名、ニ、テ、遠、志、龍、骨、ノ、入、

方、ハ、桂、枝、加、龍、蚶、湯、ノ、症、一、等、重、ク、積、氣、虛、乏、ノ、者、ニ、與、之、効、ヲ、得、シ、テ、アリ

或人胸痺ヲ患フ數月晝夜徹痛眠ル能ハス  
父之藏腹胃ヲ死ニ類ス衆医ヲ求ス先  
生方加附子ヲ與ヘ之其元氣毒ヲ以テ數  
旬ヲ經テ政ニ復ス焉

或人其和目眩吐食ヲ納ルコト能ハス  
支飲トシハ半夏加茯苓湯ヲ與ヘ吐氣止  
目眩稍差後浴湯ヲテ忽チ服喝針ヲ灸  
シ目眩初ヨリモ甚シ始テ知頭風ノ初起  
骨氣上達吐食ヲ棄ルコトヲ因テ灸ヲ  
與ヘ數日シテ全愈先生曰頭痛頭風  
凡テ病頭腦ニ屬スル者動モスル大吐  
吐ヲ灸ハ知ラスシハアルハカラハ痛

当飲湯曰上治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛南陽曰療胸痺心痛  
并陳舊腹痛旁治潁囊病

、當飲、芍藥、半夏、厚朴、桂枝、乾姜、人參、黃芪、  
蜀椒、甘草、右十味寒病加附子小西方云大冷加附子

一枚良  
此方ハ心腹冷氣絞痛肩背ハ微メ痛者ヲ治ス津田玄仙  
ハ此方ヨリ枳縮ニ陳揚カ効有ト云ハトモ枳縮ニ陳ハ

胸膈ニ停痰アリテ肩背ハ微メ痛者ニ宜ミ此方ハ腹  
中ニ拘急アリテ痛ミソルヨリ肩背ハ微メ痛スル者

ニ宜ミ此方位ノ方別混スハカラズ  
大三五散同上治風眩口喎目斜耳聾

細辛、防風、乾姜、天雄、山茱萸、薯蕷、右六味  
此方ハ陽虛風寒入腦ノ六字カ主意ニテ一夜ノ内ニ口

眼喎邪ヲ灸シ他連ル處ナク神思少シモ愛ラヌ者ニ効  
アリ是ハ大抵中風ノ一症トモ治風ノ藥ヲ與シ反効ナシ

是ハ一種ノ頭風也童ヤ者ハ時々禁固ニテ下スベシ又

父



外ニ芒處ナク唯耳聾者ニ効アリ若熱有テ兩脇ハ拘急  
ニ耳聾ハ難キ者ハ小柴胡湯ノ行ク處ナリ諸病耳鳴リ

或ハ頭痛シテ足冷ル者ニ用テ妙効アリ  
大向膠湯日上治男子絕傷或從高墮下微者唾血甚者吐血

及至瘡傷經

即芎歸膠艾湯加乾姜

此方ハ芎歸膠艾湯ト主治同シ蓋乾姜ヲ加ル處ニ深意  
アリ地黄乾姜ト伍スルハ血分ノハタラキ一層強ク  
ナル也咳者方治血狂一方モ同旨ナリ

斷創湯外臺

半夏・干姜・人參・黃連・附子・茯苓・甘草・大棗

右八味千金加龍骨治胸心下伏水

此方ハ半夏厚朴湯ノ變方ニメ本心下ニ水飲アリ既ニ  
陰位ニ陷リテ下利止マサル者ヲ治ス又小兒疳利ノ脫

症ニ用テ効アリ疳利ハ黃連附子ト伍セザレハ効ヲ奏  
セズ又痢病諸藥効ヲ奏セズ利止ニ難キ者此方ヲ用テ

一前能治水氣上衝故用之柳氣衝心煩效

却理解散下通明陽氣全不

腹了少汗

唐中一方口上療苦脚氣攻心以方甚散腫氣極驗

●檳榔、生薑、橘皮、芫花、蘇葉、木瓜、七三味近

世名大檳榔湯或加大黃散腫下氣朱氏集驗加桔梗名

雞鳴散治脚氣第一隻藥不同男女皆可服

此方以脚氣衝心主方十之八虛証三六効十之大抵胸

滿氣急之其氣上衝也欲之者効下若以方

用其腫益盛ニナリラクルハ本藥湯ヲ兼用スハシ要

スル者有持桂里ハ大黃ヲ加フ其効速也ト云若偏身洪

腫メ心不苦肉スル者过山慈ハ越婢湯ヲ合メ用余ハ述

卷ヲ加ラ雙解散ト名ク朱氏集驗ニハ桂梗ヲ加テ雞鳴

散ト名ツク脚氣ト套藥トス

●當歸、鶴虱、日、上療九種心痛蛔蟲冷氣先從面肋胸背撮痛

欲變吐

●當歸、鶴虱、橘皮、人參、檳榔、枳實、芍藥、桂枝

生薑、大棗、七十味

父

六十



此方ハ蛇蟲ニ至心痛止マサル者ヲ治ス鶴龜倭産効ナ  
シ森立之ヲ説ニ從テ變名ヤメシナリ用ヘシ若此  
方ヲ用蛇蟲去ノ後心痛猶不止者ハ甘草粉蜜湯特効アリ

当飯大黃湯同上療冷氣奪引腰背肋下腹内痛

当飯芍藥桂枝乾姜吳茱萸人参大黃甘草

草右八味據仲景方加枳實茯苓名十味当飯湯

此方ハ桂枝加芍藥湯ノ變方ニテ溫下ノ劑ナリ俗ニ所  
謂病積ニテ腰背ヨリ肋下ヘサシコミ痛者此方ノ目録

也若心下堅滿メ胸膈マラモ及者ハ方後ニ云仲景方ノ

枳實茯苓ヲ加ル者ヲ用ヘシ其方千金方名十三吾内十

味当飯湯ト名メタ此方及十味当飯湯ハ背ヘ廻ラ痛者

ヲ主トス病ニテ腹ヤ腰ニ廻ルモノハ多クアセ凡脊ニ

廻ル者ハ方ニ於着眼ノ第一ナリ凡千金外臺ニ冷氣ト

云者ハ上ハ淡飲ヲ指シ下ハ病氣ヲ云仲景ハ淡飲ヲ寒

飲ト云病氣ヲ久寒ト云

當歸白朮湯三因治酒疸發黃心下有痞癰堅滿身體沉重

妨胃飲食小便赤澀者

白朮、茯苓、甘草、當歸、茵陳、猪苓、枳實、黃芩

杏仁、半夏、芍藥

此方以心下及脇下三病癰下利發黃三太柴胡湯加茵

陳或八神湯延身并夏場諸性堅ノ制攻撃ノ品ヲ施マ氏

寸効ナク胃氣振ハ大飲食減少黃色依然タル者ニ用ニ

往々効ヲ奏ス三因ニ酒疸トナシ氏諸疸ニ通用ノ飲

癖ヲ主トス

大連薏湯曰春名不見傷風感冒發熱疾壅風熱丹毒腫痛頸

項有核頸赤癰癰眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝

胎毒痘疹餘毒一切熱毒并治之

連薏、薤白、通草、防風、牛蒡子、甘草、蟬退、白

飯、芍藥、柴胡、黃芩、山梔子、滑石、車前子

右於四味  
此方八元痘疹收靨ノ期ニ及テ餘毒甚ク諸患症ヲ現ス

夕



ルヲ治スル方ナレ氏今運用シテ大人老煩血分ニ瘀滯アリテ身體短々奥之ノ患瘡ヲ瘡ニ諸治効ナキ者ニ與テ哥効アリ若熱毒甚キ者ハ犀角ヲ加フル佳トス

尊赤散曰春治麻疹已出證諸小便利者  
地黄、滑石、木通、甘草、燈草 右五味

此方ハ心經裏熱アリテ或ハ聲音瘖セシ言諾スル不能ハス或ハ口眼喎斜半身不遂スル者ヲ治ス此症肝風ト混シ易シ小兒直訣及局方尊赤散圓ノ條ヲ熟讀メ了解スヘシ傷寒用エル尊赤各半湯モ此意ヲ得テ與フヘシ故文熱田文蒼中風不語ニ尊赤各半湯ヲ與テ哥効ヲ得シト云心胞絡ノ裏熱ニ着眼シタル也

大防風湯曰一名鶴膝風而膝腫大而痛脛枯脂局方云一切麻痺痿軟風濕挾虛者

地黄、當歸、芍藥、川芎、黃芪、防風、杜仲、蒼朮、附子、人參、獨活、甘草、牛膝 右十三味  
此方曰一選方ニハ鶴膝風ノ主劑トシ局方ニハ麻痺痿

世所謂神仙者與抑肝扶脾散我後為至重  
 服辰砂散或左至九則愈（青那）  
 某女不欲食良唯良他物請治無効方與  
 四物湯加人參白朮橘皮而愈（見前散治）

軟ノ套割トスレ其目的ハ腔枯暗ト力風濕挾虛トカ  
 云氣血衰弱ノ候カ笑レハ効ナシ若実スル者ニ與レハ  
 及至要（陰毒）  
 大七氣湯（生）治ニ聚狀如癥瘕隨氣上下心腹疼痛攻刺腰  
 脇

三稜・莪朮・枳實・桂枝・橘皮・薑黃・甘草・芍藥  
 益智（右九味）  
 以方後世ニテハ續聚ノ主劑トスレ其後ハ破氣ヲ主  
 トス堅塊ノ者ハ無鑿ニ非レハ効ナシ故古方續聚ノ方  
 多ク以ニ呂ヲ用ル也其方ハ腹中ニ瘕氣アリテ飲食ニ  
 嗜忌アリ或ハ食臭ヲ患動モスレハ嘔吐腹痛ヲ發シ須  
 臾ニ大忌ルカ如モノニ効アリ又蛇ヲ兼ル者ニ枳實  
 ヲ加テ用後世所謂神仙方トノ類ハ余其方ニ神仙散  
 ヲ兼服セシメテ往々効ヲ奏セリ  
 當飯飲子同上治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥  
 當飯芍藥・川芎・地黃・黃蘗・防風・荆芥・何首

★



或内足指甲脚痛堪云カヲ夜ニ至レハ止熱  
 益甚脚ヲ抱テ膝近ク落シ四立華鍾ニ坐方ラ  
 尽スト雖寸効ナシ余ニテ訪スルニ風毒ニアラズ脱  
 疽ニアラス一高証ナリ因テ其初起ヲ問ハハ其  
 人直中ニテ疥癬ヲ發シ搔痒ニ堪ヘズ藥  
 湯ニ浴シ疥癬愈シ症輕ナリ以証ヲ發スト  
 云余斷シテ濕熱微注トシテ效ナラ作リ大  
 黃ヲ加テ投ス服スル一二日其痛止ラ截  
 シ旬日ナラスシテ全愈ニ届

烏、黃芪、甘草、右丁味  
 以方ハ老人血燥ヨリメ癰癤ヲ生スル者ニ用エ若血熱  
 アレハ溫清飲ニ宜シ又以方ヲ服メ効ナキモノ四物湯  
 ニ荆芥浮萍ヲ加ヘ長服ヤシメラ効アリ  
 当飯忙痛場前定治濕熱為病肩背沉重肢節疼痛胸脇不利  
 栗園先生曰濕熱下注足脛腫痛生瘡赤腫膿水不絕者宜

白朮、人參、苦參、升麻、葛根、蒼朮、防風、蛇母  
 澤瀉、黃芩、楮朮、當歸、甘草、茵陳、羌活  
 右十五味青州曰治附骨疽用附子制痛及劇者  
 以方ハ濕熱血分ニ沉滯メ肢節疼痛スル者ニ用エ其初  
 蘇黃加朮湯麻杏人薤苡甘葛湯等ニテ發汗後疼痛止マ  
 ス及テ發熱或ハ浮腫スル者ニ宜シ青州ハ附子制ヲ用  
 テ及テ劇痛スル者ニ用エ世ニ皮膚黧黑ノ人又ハ黑光  
 リアル人多ハ内ニ濕熱アル故ナリ如以病人ニ遇ハ淋  
 病又陰癰ノ類ハ十キヤト向ヘシ必アルモノ也左スレ



# 藥之證誤

藥見晨榮  
藥見雪知陳粉蘇

弄玉湯  
答主戒百陳木建

波之部  
胃散散子胃散合方

羊脂湯  
胃散湯

白頭翁湯  
紫日人養補水休眠

白頭建柏素  
王湯

一審少沃花地紅桂附  
藥之部

麥門冬湯  
藥之部

麥羊多甘米水  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

藥見晨榮  
藥見雪知陳粉蘇

弄玉湯  
答主戒百陳木建

波之部  
胃散散子胃散合方

羊脂湯  
胃散湯

白頭翁湯  
紫日人養補水休眠

白頭建柏素  
王湯

一審少沃花地紅桂附  
藥之部

麥門冬湯  
藥之部

麥羊多甘米水  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部

羊負自朴  
藥之部



多歸六黃湯八獨盜汗ノミニ亦之  
自汗流盜汗者之可用ナリ  
友松氏曰盜汗不止者九味清脾  
湯加地骨皮帶下甲枚目奇効

腎臟當於逆渴治之乎是病形容枯槁  
左脇有形其大如臂以熱手握之漚漚在膚  
甚至上攻于心悶絕者之也熱踰裏矣方難  
右匡宗必讀醫教

ハ愈濕熱家ニテ脚氣ナドト稱シ腰股或足脛少シツ、  
痛ヲアシ歩行ニ妨アリテ難キスル者也此方ヲ用ル片

当假三黄汤<sup>急</sup>治盗汗之圣剂也徐灵胎曰阴虚有火盗汗

熱癸

茅根、生地黃、熟地黃、黃蘗、黃芩、黃連、黃芪

右七味

此方乃陰虛火動ノ盜汗ヲ治スル方ナリ氏總テ血分

熱アリテ自汗盜汗スル者ニ効アリ又眼中翳膜ヲ生

シ膿水淋漓俗ニ所謂膿眼ニ効アリ又血虛眼ノ熱アル

者宜シ

当散四逆湯寶鑑名脐腹冷痛相引腰膝而痛

当归、附子、桂枝、商陆、葶苈、芍药、茯苓、延胡

索、川棟子、厚朴、七十味

方藥胡附子卜伍之丁古方ノ意ニ非シ氏姑ク四逆

散ノ裏方ト見做メ腹中ニ行通リニ拘急アリ腰膝ニ引

冷痛之者治之此方一等甚久腰脚冷痛之者

導滯通經湯救苦治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

水香、白朮、桑白、橘皮、茯苓

右五味藥而時加澤厚今從之

此方不氣閉口裏水氣二効アリ矣又可ノ所謂氣復

下ノ症數日浮腫之者又久病ノ者一旦ニ浮腫之

者皆氣不宣通之候皆治方宜シ

導水茯苓湯治水腫遍身如烟臥喘滿不能轉側出如割

而絕少雖有而如黑豆汁者

茯苓、麥門、澤厚、蒼朮、桑白、蘇葉、橘皮、木瓜

大腹皮、橘皮、縮砂、木香、燈心草 右十三味

此方乃大劑之濃煎也其効十三是劉教授蒞庭ノ

經脈ナリ要如熱河刺氣酒ノ義未詳此方ノ目的ハ遍身

如烟臥之狀牛按而塌塌而起隨聚而高變氣云言平リ若

爛臥之狀如ニノ牛按ノ高變之ノ才氣ハ之或ハ氣衰



用藏血諸症類方  
 大黃牡丹湯。桃核承氣湯。桃仁承氣湯。  
 騰龍湯。桂枝桃仁湯。桃仁湯。犀角湯。  
 及其加味方。抵當湯。

ヨリ瘀水溢出スル者ハ虚候ニメ死期近キニ在リ此方  
 虚実問ニアルハ此湯ヲ合點メ諸水腫日ヲ経テ不愈如  
 爛肌者ニ用テ効アリ

此裏消毒飲正京治癰疽已成不得内消

人參、川芎、芍藥、黃芩、芍藥、白朮、茯苓、白芷

金銀花、甘草、桔梗、皂角刺 七十二味

此方ハ千金内補散ト伯仲ト割リシ氏内補散ハ此膿ヲ

主トシ此方ハ消毒ヲ兼メ故ニ毒壅メ候ヲ帶ル者此方

ヲ與ル日佐トメ餘ハ内補散ノ條ニ辨ス

桃仁承氣湯温疫論晝日熱減至夜熱甚者瘀血也

大黃、芒硝、桃仁、芍藥、芍藥、牡丹、右三味

此方ハ傷寒論ノ裏方ニメ其証一尋緩十ニ處ニ用エ作

者ノ趣意ハ胃実ノ証ニメ下劑ヲ與ハス夜ニ至テ發熱

スル者ハ熱血分ニ導ル者也下劑ヲ與サレハ瘀血トナ

ル此方ヲ用エシト云ト云如以証ハ矢張本論ノ方ガ

宜キ也又既ニ下メ後晝日熱減ニ夜ニ至テ熱出ル者瘀

大保元湯係赤名頂陷根竅雖紅而皮軟且薄血有餘而氣不足者  
 足者

桃

仁陽用上耶予血分者宜之

桃仁、牡丹、當歸、芍藥、阿膠、滑石、石六味

此方吳氏八耶血分方予者用止氏吾門ニテハ水分

血分二道ニ涉ル者ニ用ニ故ニ猪苓湯ヲ証ニメ耶血分

ニ波及ニ心者不其方ヲ用又水與血結テ血宜ニ在者大

黃甘遂湯ヲ以攻下ノ後其方ヲ與ル時ハ工合至ニ宜キ

也

大

保元湯係赤名頂陷根竅雖紅而皮軟且薄血有餘而氣不

足者

足者

方ハ二ルナリ

龍湯トニ桃核承氣湯ノ一等輕キ處ヲ桂枝桃仁湯及此

故ニ血ヲ見サル前ニ此方及犀角地黄湯ヲ斟酌メ用ニ

或ハ暴ニ下血ノ手足厥冷シ絶汗出一夜ヲ経メ死ス

一平也此症下ヲ失シ自ラ下血スル者ハ甚危篤ニ至ル

血行ヲサル故也此場合ニテ此方及犀角地黄湯ヲ用ニ



或人未生先生之診云其証微毒數年骨  
 髓之沉痛之骨節疼痛肌肉枯槁寒  
 熱休作飲食不進年三十餘三三之始  
 老耄如如之百方療之効ナシ先生芳  
 う與之兼虎腔骨丸う以之全効矣

大

川芎、黃芪、人參、桂枝、甘草、白朮、右三味  
 以方ハ瘰癧元氣虛ハ起脹スル能ハサル者ヲ至トスレ  
 反凡テ小兒虛弱ニメ立運立軟ノ兆アリ他餘症ナキ者  
 二用テ三味ノ餌元場ヨリ効優ナリ吉村扁耆ハ三味ノ  
 方ハ瘰癧ヨリ及テ慢驚風ニ効アリト云試シヘシ  
 面中飲本朝経験治下疳梅毒其他一切濕毒瘡身不愈或  
 頭面腐潰或鼻柱腐場已成癰疽者神効  
 遺糧、牛膝、甘草、黃連、枳榔、人參、大黃、桂枝  
 黃芩、沉香、川芎、杜仲、右十二味一名奇驗方  
 以方ハ療治茶談ニ載スル如ク微毒ノ沉病癰疾ニナリ  
 テ余何ト云スバカラザル者ニ効アリ其中上部ノ癰毒  
 三宜ニ下部ノ癰毒ハ七度煎ニ宜シ又身體癰毒アリテ  
 虛損甚キ者ハ葢建湯ニ宜シ本邦唐瘡ノ名方ニ奇驗方  
 ト稱スル者數方アレ氏以方第一トス

導水湯日上

薏苡、茯苓、枳榔、木仙、芫花、猪苓、澤母、厚朴

々

六十五

右ハ味或加附子

此方ハ導水茯苓湯ノ輕症ヲ治ス知方ニ導水疎水禹水  
ト稱スル者類方アリ氏此方最簡便ニメ古方ニ近シ

桃花湯荷原名腹滿水多者栗園先生曰解酒毒甚速

桃花、大黃、右二味今加甘草

此方ハ外臺桃花一味ノ方ヨリ出テ腹水ヲ去ルニ即効  
アリ又能酒毒ヲ下ス也

大神湯亦田家方治黃肝病如神

茵陳、大黃、人參、旋子、茯苓、縮砂、黃芩、甘草

右八味末効則加澤蘭乾漆

此方黃肝ノ重症ニ用ユ黃肝ハ大抵子胃散加鉄砂針砂

湯厚脾湯加長蛇ノ類ニテ治スレ氏重実ノ症ニ至リテ

ハ此方又宜ト入又虛症ニ至リテハ三君子湯亦并蜜ヲ

宜トス

大寧心湯此方論治宿痰腎火胸動高亢大便秘者若大便秘

者去大黃加羊夏名小寧心湯



大黃・茯苓・茯苓・茯苓・竹筴・黃連・紅母・石膏  
 右七味藥田方函大學心湯本方中去茯苓茯苓加青皮芍  
 藥甘草治小兒驚癇  
 此方ハ蓬州區負喜多村良澤病大ヲ鎮スルノ至方トス  
 千金溫膽湯ノ症ニハ寒スル者ニ用工藥田家ニハ小  
 兒湯瘦煩渴甚者ノ至方トス

禮部

羚羊

羚羊湯外臺治氣不通不得食  
 不通・橘皮・厚朴・吳茱萸・乾姜・羚羊・附子

右七味

此方ハ氣噎ニテ食餌咽ニツマリ不下者ニ用工飲膈ノ  
 者ニハ効ナシ一士人病ニテ飲食ヲ硬塞スル者アリ其

方ニテ効ヲ得タリ古方膈噎ニ辛溫ノ劑ヲ用ルハ其辛

効ヲ以テ達スルノ意ナリ羚羊角噎ヲ治ス亦古意ナリ

原南陽先生羚羊角湯ヲ妊娠  
 子之痼用一ツ但以烏頭替附子  
 煎法水三合一合ニ割ニ分服其  
 他子之痼ニ三黃湯蓋三黃湯ニ至神  
 湯等ヲ用ス

醫家秘傳  
此方治  
二成

勇暑發達下利數日止之加之噦逆  
之煩熱口渴渴之疲勞甚之區不治上  
之新去手方方與之橘皮亦加丁香等  
用之下利日減噦逆止之漸之解之得  
之

或見生之歲青便之止之時之發熱腹  
痛顏色慘之區皆之驚風之漸ト之全診曰  
脾胃虛弱暑熱之堪之然リ以方方與之  
數日之止青便止之面色光澤之生之且發熱  
時之腹痛全之漸ト之淨漸散之與之白之  
ニシテ字之同前

羚羊角湯得効治筋痛肢節未痛

羚羊、桂枝、附子、獨活、芍藥、防風、川芎、生薑

有八味

此方ハ筋痛ト云ヲ目的トス一婦人腹痛其シク肩背ノ  
筋脉強急メ動搖シカタキ者此ヲ用テ治ス羚羊附子ト  
伍スルハ前方ト同旨ニテ格別ノ治用アリ

連

理場要訣治傷寒陰証自利而渴此是陰在下陽放上京  
因泄瀉津液既去枯燥而渴其人雖引飲自少而常喜溫不  
可投冷劑

即理中丸方中加黃連花之○金匱散用肺旁下利

此方ハ桂枝人參湯ト表裏ニテ裏寒ニ表熱ヲ挾テ下利

スル者ハ彼方ナリ瀉下ニ在陽ヲ上ニ陽メ下利スル者

ハ此方ナリ此意ニテ傷寒ノミナラス諸病ニ用エヘ

連葛解醒湯大還酒續腹痛泄瀉

黃連、葛根、滑石、梔子、神麴、青皮、木香、古七味

此方ハ酒客ノ久痢ニ効アリ俗病得ナドト喝ルモノ真



聯珠飲ノ証ニシテ動悸甚ク面部四肢黃腫スル者茵陳湯ヲ用ユ但脫  
血甚シク屢上則スル者千金大阿膠湯ヲ用ユ若下利下血甚者一老臣  
ノ傳ニヨリニ犀角一炙阿膠一分研末服セシム下血久シク不止虛癰  
スル者六君子湯加炮姜ヲ用ユ傷寒下血虛脫者黃土湯ヲ用ユ  
示異示下血スルモノニテ用ユ痔血ニ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ用ユ濕  
熱多者三溫清飲ヲ用過酒下血ノモノニ三黃湯加紅花ヲ用スナリ

近處内改者、車驚湯、藥丸、兼用、  
毒甚、シキ者、如、身、赤、血、湯、傷、  
赤、小、豆、湯、用、之、日、三、八、日、三、動、

行、湯、改、者、車、驚、湯、藥、丸、兼、用、  
毒、甚、者、ハ、如、身、赤、血、湯、傷、  
赤、小、豆、湯、用、之、日、三、八、日、三、動、

一、年、子、五、六、產、后、頭、眩、甚、者、  
シ、キ、ト、キ、ハ、筋、中、主、ハ、カ、カ、ノ、一、身、動、搖、等、  
傍、人、ヲ、シ、テ、身、體、壓、セ、月、ヲ、用、テ、シ、テ、  
足、半、掌、行、テ、各、シ、テ、有、之、而、眠、  
如、或、眠、子、シ、シ、ハ、次、一、身、動、搖、不、能、  
方、ヲ、與、劇、シ、ト、ハ、妙、香、散、ヲ、服、シ、  
之、二、相、減、至、後、三、年、ハ、一、身、動、搖、  
之、而、生、足、常、微、冷、時、血、或、冷、血、不、  
氣、上、攻、復、成、小、豆、因、之、方、兼、用、加、紅、

武湯七、成湯等、ヲ、與、  
方、ヲ、用、エ、バ、又、酒、毒、  
解、ス、  
丁、葛、花、解、醒、湯、  
日、リ、優、

連、  
本、朝、經、  
治、胎、毒、

桔、梗、甘、草、連、薤、木、通、紅、花、  
七、五、味、合、今、金、立、

香、場、名、曰、立、香、連、薤、湯、  
又、本、方、中、去、木、通、甘、草、  
加、沉、香、丁、香、

金、銀、花、菊、金、木、香、  
桂、柳、大、黃、名、紅、花、散、  
治、胎、毒、血、毒、寒、熱、往、

來、腹、痛、胸、膈、痞、塞、  
疔、毒、諸、証、  
此、方、ハ、痘、疹、ノ、餘、毒、  
ヲ、治、ス、大、連、薤、飲、  
日、リ、ハ、簡、ニ、用、  
七、

易、  
之、毒、深、中、者、  
ハ、大、連、薤、飲、  
ノ、方、ニ、本、方、  
ヲ、加、減、ス、  
ハ、シ、

聯、  
珠、飲、  
新、治、血、虛、眩、暈、  
心、不、通、滿、  
癸、熱、自、汗、  
婦、人、百、病、

即、  
苓、桂、朮、甘、湯、  
四、物、湯、  
方、

次、  
方、ハ、水、分、  
下、血、分、  
二、道、  
二、步、  
九、症、  
ヲ、治、ス、  
婦、人、失、血、或、

產、後、男、子、  
病、疾、下、血、  
ノ、後、面、部、  
浮、腫、或、面、  
脚、微、腫、  
ノ、心、下、及、

水、分、  
二、動、悸、  
下、リ、頭、痛、  
眩、暈、  
ヲ、癸、  
ニ、又、  
ハ、周、身、  
青、黃、  
浮、腫、  
ノ、

黃、肝、狀、  
ヲ、為、ス、  
者、  
二、効、  
アリ、

レ、  
シ、





辰岡

下  
懷  
心  
近  
月  
飲

まふし  
に

說服所

丁巳

印人及色樣備

就昭信所遺觀



男其病疾ヲ患一ニ匡類リ之ヲ下  
 台重蓋其シク虚極ニ加之迄達其  
 藥食口ニ納ルニト能ク先  
 半夏加夜ニ湯ヲ與テ吐氣稍安  
 因テ白頭翁加甘膠湯ヲ與テ下利  
 漸ニ減シ後調理ホニ復シ同家  
 女婦傷深シキヲ協桂枝利ノ如クシ  
 ン寒多ク尤甚シ余遂挽湯ヲ與テ二  
 三日後上熱下冷ノ後ニ現シ腹痛  
 甚シ因テ外臺増損四順湯ヲ與  
 與テ所苦蓋セリ鼻用シテ遂ニ瘳

人參・附子・乾姜・甘草・龍骨・黃連

右六味今加茯苓

此方ハ四逆湯ノ症ニメ寒熱錯雜ニル者ヲ治ス故ニ腹

元陽既濟湯ノ一等重キ處ニ用ユ又下利不止ノ證ニ注

意メ凡理中四逆ヲ與テ下利止メサル者ニ用ユ古方龍

骨黃連ト伍スル者ハ下利ヲ收瀉スルノ手段ナリ斷病

湯ノ方意モ亦同シ

増損理中湯内証療下後或不下心下結胸膈痞塞胸中

氣急厥逆欲絶心起高胸手不得近不過二三日反以下後

虛逆氣毒相激

即理中丸方中加枳實茯苓牡蛎枳實根

以方ハ理中丸ノ症ニメ心下結滿或ハ胃中氣急結胃ニ

類メ其寒ハ虛氣上逆メ胸部ヲ壓迫スル者ヲ治メ治人

書ノ枳實理中湯ハ以方ノ一等輕キ者ナリ

蘇恭一方犀角湯曰上  
 犀角一兩羊脂一射干一兩  
 玃香一兩木香一兩  
 丁香一兩石脂一兩  
 麥門

年餘、麝香、人參、茯苓、右十二味、蘇恭云、若風熱、  
但毒氣入胃、唯心、煩、索、水、瀝、胸、面、乾、吐、好、叫、欲、斷、絕、者、服、以、

方、八、脚、氣、衝、心、腸、熱、甚、少、困、悶、之、者、治、之、又、傷、寒、腸、  
熱、人、症、二、工、用、工、即、紫、雪、ト、同、意、十、リ

蘇子湯、日上、療、氣、上、迫、滿、或、氣、不、通、煩、悶、喘、吐、  
蘇子、乾姜、橘皮、茯苓、半夏、桂枝、人參、甘草、

右八味、  
此方、八、午、至、蘇子湯ノ類、方ニメ、虛、氣、上、逆、メ、氣、喘、之、ル、  
者、ヲ、治、之、蘇子湯ニ比スルハ、利、水、ノ、効、アリ、半、夏、乾、

姜、ト、伍、ス、ル、ハ、心、下、ノ、飲、ヲ、目、的、ト、ス、ル、也、  
息、奔、揚、三、因、若、肺、之、積、在、右、脇、下、大、如、覆、杯、久、之、不、愈、病、酒、之、

要、熱、氣、逆、喘、咳、發、為、肺、癰、  
桂枝、吳茱萸、桑白、半夏、葶藶、人參、甘草、

右七味、  
此方、八、定、年、半、夏、湯、ノ、症、ノ、如、ク、脇、下、ニ、飲、積、アリ、ヲ、時、々、

衝、逆、メ、呼、吸、促、迫、氣、喘、絶、セ、ン、ト、領、ス、症、者、ニ、宜、シ、蓋、半、夏、



和田東郭曰此方鼓脹下利アモ二ハ効アリト云

湯ニ比スレハ塊癰ハ輕クノ上ニ迫ノ勢強ニトス或人脇下ノ左右ヲ以二方ノ別トスルハ肺積ノ名ニ泥々云ノト云ハシ

搜風解毒湯本綱治楊梅瘡及楊梅瘋毒及誤服輕粉藥筋骨疼痛不能動履者

防風。道狸。金銀花。木通。薏苡。木瓜。皂角子。

白鮮皮ノ如ハ味倚生外科經疏名加味遺狸湯福井氏去

遺狸加草薺名ハ味草薺湯治楊梅瘡已後用高良而頭痛

此方ハ解毒劑ノ元祖ニテ微毒ノ套藥トスル氏承藥ヲ

敗スルハ後筋骨疼痛スル者ニ非シハ効ナシ尋常ノ微

瘡ナレハ龜川ノ解毒劑ヲ穩當トス

壯原湯本水治下焦虛寒中滿腫脹小便不利上氣喘急陰囊

兩腿皆腫或面有浮氣

人參。蒼朮。茯苓。破胡紙。桂枝。附子。乾姜。縮砂

如ハ味

此方ハ元中滿腫脹カ目的ニテ鼓脹ノ藥ナレ氏陰水ニ

テ桂姜連草黃平肉湯真武湯ノ類ヲ投ニ腹滿及テ甚ク  
元氣振ハス小便不利スル者ニ用テ動アリスベテ肉子  
劑塊方ノ類ヲ用エル腹滿鼓脹ハ腹平滿メ大便艱七サ  
凡者ナリ平陽ノ處ニ下劑ヲヤルト益早ク脹ヲナス者  
也厚朴七物ノ類ヲ始メ下劑ヲ與ル腹滿ハツレポリト  
脹又ノナリ是ヲ腹滿瀉湯ノ別トス

桑白皮湯脚氣論

桑白皮 沉香 防己 木通 厚朴 茯苓 枳實 郁李

仁 蘇葉 生姜 犀角 右十一味

此方蠶瀕元策ノ家方ニテ脚氣腫氣ノ衝心状ニナリク  
ルニ用エ唐侍中一方犀角旋覆花湯ニ比スレハ利水ノ  
力強ク沉香紹胃湯ニ比スレハ降氣ノ力乏トス

瘡瘍解毒湯

連花 枳實 桔梗 爵金 丁香 沉香 木香 忍冬

紅花 甘草 右十味

此方一切腫瘍ニ用エ此中昭毒ニ屬スル者ニ効アリ



霍亂吐下盡後脫汗如珠氣息微急欲令轉筋乾乾不止煩躁腹脹脈微欲絕者灸生刺灸于一線非以方不備挽回也服後脫汗煩躁俱止亦便利者為佳非若受猪胆以煎胆代之子炳曰慢驚風危篤者以方有効斯言信矣但曰代猪胆以水銀鉅丹全汁等又有

リ連薤湯ノ一考重中者。メ五香連薤湯ヨリハ稍輕ト、桑白皮湯桑名郭曰外臺定上氣息鳴平喘候飲絶者入口氣下

・桑白、豆豉黃、右二味元和紀用經名降氣湯

以方ハ外臺平喘ノ至トス凡ハ急迫喘氣ヲ禁ミ困灼ス

ル者ヲ治ス又以意ニテ諸方ニ合メ用ヘシ導水鎖言ニ

三日坊ヲ治スト云云以症ナルハ有持桂里ハ以方酒

ニテ煎シサレハ効ナシト云

津部

通豚即四通湯傷寒論治四逆湯症而吐利厥冷甚者

即四通湯倍乾姜附子

通豚四通加猪膽汁湯曰上治前症而乾嘔煩躁不安者

即通豚四通湯方中加猪膽汁

二方共ニ四通湯ノ重症ヲ治ス後世ニテハ姜附湯參附

湯ナドノ單方ヲ用シ凡甘草アル處ニ妙旨アリ姜附ノ

多量ヲ混和スル力アリ故通脉ト名ケ地麦ノ滋潤ヲ分  
布スル力アリ故復脉ト名ク漫然ニ非ルナリ加猪膽汁  
場ハ瀉盛格場ト云カ目的ナリ格場ノ証ニ以テ加ル  
ハ白通場ト同旨ナリ

追風通氣散同者以藥流注癰疽榮背傷折非以不能効

、玄飯、木通、芍藥、白芷、茴香、枳實、甘草、阿育

烏、烏藥 七九味

以方ハ氣血流注メ癰瘡ヲナシト欲スル者ヲ解散ス

就中痛甚キ者ニ効アリ打撲疝氣等對症ノ藥ヲ與テ効

ナク痛及テ劇者ニ用エ後世ニテハ流注毒實証ノ者ニ

以方ヲ用エ虛症ノ者ニ正宗ノ益氣養榮湯ヲ用エルナリ

通關散對也治喉痺腫痛不能言語或痺或四肢冷痺者

桔梗、甘草、人參、茯苓、薄荷、防風、荆芥、乾姜

、白朮 七九味或加附子

以方ハ喉痺ノ脫症ニ用エ凡喉痺ノ症輕者ハ桔梗湯重  
者ハ苦酒湯危劇ノ者ハ桔梗白散ニテ大抵治スル氏脫



友松子曰梅毒癰痛久不愈者托  
 搗火酒煎服愈  
 南陽草解毒治瘡毒上攻頭痛甚  
 或結毒經久或項背強急往來寒熱  
 或虛癰狀以勞瘵者華用龍腦頂  
 珠丸最妙  
 解毒丸  
 防風 玄參 川芎 天麻 烏頭  
 蔓荊子 燈心草 兩前  
 加土味水煎服法極妙不愈用  
 於瘡癰痛諸頭痛諸藥不功者皆  
 可用若敗痛甚者加辛夷同煎

候ノ者ニ至ラハ此方ニ附子ヲ加ヘサレハ効ナシ  
 通經導滯湯正尋治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛  
 芫花 芍藥 當歸 川芎 地黃 獨活 右十三味  
 此方ハ瘀血流注ヲ治ス又婦人風濕疼痛年ヲ經テ血分  
 ニ關係スル者ニ効アリ又瘀血流注ノ甚者ニ至テハ桂  
 苓丸斜加附子將軍加挑核承氣湯加附子非レハ効ナシ  
 頭風神方廣筆託  
 遺糧 金銀花 蔓荊子 玄參 防風 天麻 辛荊  
 黑豆 川芎 燈心草 芽茶 右十一味一名山牛湯  
 此方ハ結毒ノ頭痛或耳鳴者ニ効アリ又結毒ノ眼ニ入  
 テ痛者ヲ治ス何レモ結毒葦聖丹ヲ兼服スルヲ優トス  
 此方惟濕毒ノ三ニ非ス他症腫痛或耳鳴等ノ症ニ用ラ  
 効アリ

車郭曰此方中人參ヲ去ハハ喘急ヲ憚  
 カルヲ去フニハ此方肺虚喘鳴痰咳  
 然ハ多ク法ハ虚里動其ノ人參ヲ用  
 肺下及心下動悸其ノ人參ヲ用  
 此方及喘鳴ノ候ニ虚里動靜  
 肺痿消瘦者ハ大抵動悸靜ナラ  
 ズ因テ元氣セサルヲ目的トス

酢二切腫物ヲ食スハ再腫或ハ再瘡スル  
 ナリト云東郭

寧肺湯 補部

止嗽  
 五味子、人參、白朮、當歸、地黃、川芎、芍藥、甘  
 草、麥門、桑白、茯苓、阿膠  
 此方ハ八珍湯ノ人參ヲ去リ五味  
 者ニメ肺痿虚敗ノ者又ハ咳嗽數年ヲ經テ血虚骨立ノ  
 ル者ヲ治ス榮衛俱虚發熱ト云カ目的ナリ若熱ナク虚  
 敗スル者ハ炙甘草湯加桔梗ヲ佳トス阿膠ハ潤燥緩急  
 ノ能アリテ肺部ヲ潤シ咳嗽ヲ緩ムルノミナラズ癰  
 用ルハ裏急ヲ緩メ淋ニ用レハ裏迫ヲ解キ其他諸失血  
 帶下ニ用皆潤燥ヲ主トスナリ

寧心部

内補散 千金治癰疽發背已潰排膿生肉  
 桂枝、白芷、人參、桔梗、川芎、甘草、防風、厚朴



当飯 右九味今加黃耆各半金内北散

此方ハ癰疽及痘疹補托ノ主劑ナリ揮發ノ力弱ナル者

ニハ反鼻ヲ加フハ癰疽ニ限ラズ一切ノ腫物初メ熱

ア心時ハ十敗陽ヲ用ヒ隨ルヤ否ヤ分明ナラザル時ハ

北裏消毒飲ヲ用テ口潰ルヲ見定メ其虛實ニ隨リ以

方ヲ與フハ

内疎連場保命治癰疽腫硬吐噎痰熱而煩脉沉實藏府叙

澁當急疎刺之

黃連、芍藥、當飯、樨榔、木香、黃芩、旋子、薄荷

枳椇、甘草、連薊、大黃 右十二味

此方ハ癰疽發熱強キ者ニ用ユ餘ハ主治ノ如シ多味ナ

レ氏癰疽内壅ノ症ニ至ラハ調胃承氣湯導腸散ヨリハ

用工合宜シ若坎方ノ應セサル者ハ千金五刺湯ニ宜シ

魚鱗丸 牛部

治脾氣橫弛四肢浮腫心腹脹滿喘不得臥蘇

澤如紫小便不利諸證又與瘰癧者

赤豆、以各內煎

冬日子、酉日子、猪年、亥年

各一  
大腹皮  
臥光皮  
合皮

海金砂  
石  
五斤  
加冰水一盞半煮

壬子年正月二日

莪朮 三棱 大腹 木香 枳實 檳榔 生薑

右六味寶鑑有郁李仁今從之特効

方、胸、腹、腰、泄、卜、云、力、目的、二、方、腹、中、二、伏、梁、ノ、矢、キ、堅

塊アリテ脹滿シ四肢浮腫ヲナス者ニ効アリ若クは症ニ

テ虚候下ニ着ハ、變製ハ氣飲加陳子力三因ハ復元丹ヲ

興

烏梅丸科傷寒

字部

烏梅、細辛、乾姜、黃連、當歸、附子、蜀椒、桂枝

人參 黃蘗 右十味

此方、蛇厥、冷通、二、三者也、痛、煩、發、作、止、之、也、

輕キ症ニハ起ル時ハカリ厥ル者アリ柯琴ハ蛇厥ノ

三十九ノ凡テ厥陰ノ至方ト入最厥陰ハ寒熱錯雜ノ症

多牛故茂草四垂場屋茅茨場外ハ泥ク其方ヲ運用メ



難疽果只眼潰堅硬疼痛不可忍者已潰後毒氣凝結腐蝕不復新肉生者附骨疽瘰癧瘰癧不盡者久年瘰癧毒死端不動者并主之七宝子野梅●隨症兼用又有可用莖葉者足莖或男年十六腰脚疼痛久不愈背脊之力為二拘攣之行步不能久二三逐之藥用シテ効ハシ先生方ヲ與ハレ毒丸ヲ兼用諸証曰ニ後ハ或女年十七右手臂頸リ指頭ニ至ルヲ腫痛忍ハカラス敷返シヲ療メ効ナシ先生方ヲ與ハレ痛大ニ減ス後掌後ノ肉頑腫シテ牛ヲ運スルハ筋父因腫上ニ莖葉膏ヲ貼シ和方土骨皮湯ヲ與ハレ膿潰シテ全治ス

與痛纏胸膈痛上連心膈下控膈囊苦楚不可忍手足逆冷汗如膏者非攻方不能救也尾

効ヲ奏フル多シ故ニ別ニ蛇蟲ノ假ナクメ之胸ニ差口ニ痛アル者ニ用ヒ又及胃ノ壞症ニ攻方ヲ半夏乾姜人參九料ニテ送下メ奇効アリ又能久下利ヲ治スルナリ

烏頭湯 全置 治骨節疼痛不可屈伸及腹中絞痛手足痠冷者

麻黃 芍藥 黃芪 甘草 烏頭 蜜 右三味

攻方ハ歷節ノ劇症ニ用テ速効アリ又白虎風痛甚キニ之用工白虎風ノ事ハ聖濟總錄ニ詳ナリ不可屈伸ト云カ目的ナリ一婦人臂痛甚ク不可屈伸晝夜號泣衆臣治ラ盡メ治スル能ハス年攻方ヲ用テ速ニ治ス又腰痛數年不止拘攣セントスル者少翁門人申川良哉攻方ヲ用ヒ腰ニ莖葉膏ヲ貼メ全治ス青洲翁ハ囊腫ニ用テ効ヲ奏セリ攻方ハ甘草分量ナカレ且鹽ヲ加サレハ効ナシ攻ニ味能血脈ヲ和シ筋骨ヲ緩メルナリ

烏頭桂枝湯 同上 治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身疼痛者即桂枝湯方中加烏頭蜜

男子子中三教等病氣ヲ患、腰冷テ水中ニ生  
んが知シ大抵毎旬定ニ茶ヲ煮テ片ハ腹痛  
大ニ痛ク足重ク起ス難居申其方ヲ與ル  
ニテ劑シテ二病者大ニ吐水病大テ手ヲ腹  
ニ控延丹ニテ下シテ全ク愈ヘリ古方便也

各州老帶下生藥 杏仁甘草各三分  
了香一分 枳實二片 肥土五厘 右  
丸為蜜三日一換之

或年然腸胃ニ依然トシノ愈エヌ心下動  
悸アリ夜間安眠ヲ得ス胃弱トシトス  
止元湯香泥之ヲ煮スル數ヲ初メキク以  
集置下下ノ介介通腸湯加黃連酸棗仁ヲ與  
一服胃ノ弱小鳥沉散ヲ飯セシ教句ニシテ

溫經湯曰上

此方ハ寒病ノ主劑也故ニ腰腹陰囊ニカケ苦痛スル者  
ニ用ニ工後世ニテハ附子建中湯ヲ用シ此方蜜煎ニシ  
タル方カ速効アリ又失精家常ニ腰足冷テ膈腹力ナク  
脚弱ク羸瘦腰痛者此方及大烏頭煎効アリ証ニ依テ度  
茸ヲ加工或ハ末トシ加入スルニ佳ナリ

吳茱萸、芍藥、川芎、芍藥、人參、桂枝、阿膠、牡

丹、生薑、甘草、半夏、麥門、右十二味

以方ハ胞門虛寒ト云カ月經ニテ凡婦人血室虛弱ニ

月水不調腰冷腹痛頭疼下血鍾今虛寒ノ候ハル者ニ用

ニ年五十五云々ニ拘ルハカラヌ及テ方後ハ主治ニ據ル

ハシ又下血ノ証唇口乾燥牛掌煩熱上熱下寒腹塊ナキ

者ヲ適証トメ用若癥塊アリ快ク血不下者ハ桂枝茯苓

丸ニ宜シ其又一等重キ者ヲ桃核承氣湯トスルナリ

溫膽湯今金 治大病後虛煩不得眠以膽寒故也

半夏、枳實、甘草、竹茹、生薑、橘皮、茯苓

或年然腸胃ニ依然トシノ愈エヌ心下動  
悸アリ夜間安眠ヲ得ス胃弱トシトス  
止元湯香泥之ヲ煮スル數ヲ初メキク以  
集置下下ノ介介通腸湯加黃連酸棗仁ヲ與  
一服胃ノ弱小鳥沉散ヲ飯セシ教句ニシテ  
夜快寢シ宿疾之ハカノ愈有



寒其初中暑者泄瀉多患之爾後連日下利  
止之即延醫診治余診之曰白痢傷寒  
之極也其痛在下利時必微痛覺其  
積三層人宜取去之治之ハシト方ヲ與下  
ハハ四五日痛止ニ下利亦減人真武湯ヲ  
與之至愈也  
或人夜間腹中急痛刺スカ如ク須臾ニシテ  
一候傾瀉ス如埃ノ數句覆醫錯治驗ナシ  
余診曰積滯アリ加之久寒ハ下宜ナ  
リ治下利ノ方藥効ヲ委セサルコトヲ過  
脾湯ヲ與下スコトニ三日痛大減入因  
下至高良姜湯ヲ投ス於是下利霍然  
トシテ愈也

右七味本無茯苓之從三因或加麥門人參或加黃連散寒  
此方ハ堅痰ノ劑也古人淡飲ノ了ヲ膽寒ト云胆温ハ淡  
飲ヲ温散スル也此方ハ靈起流水湯ニ振振ハ其力一層  
優ナク後世ノ竹茹温膽清心温胆等ノ祖方也

温脾湯同治下久者白連等不止及霍乱脾胃冷寒不消  
大黃・人參・甘草・乾姜・附子

右五味又本方中去甘草加桂枝治積久冷熱赤白痢僧深  
方治脾氣不足虛弱下利上入下出即本方

此方ハ温下ノ極劑ト云桂枝加大黃湯大黃附子湯ニ比  
スレハ其力尤強シ脾胃冷寒ト云カ目的也本方方天茲

ニ本キテ連年腹痛泄瀉休作寒時者ハ痛冷ノ所為トメ  
温下又ハナリ傷寒ニ書ハ黃龍湯ニ注意ニテ然熱利ニ

用ユル也又浮又已証ニ此方ノ應スル處アリ泄瀉ニ限  
ラズ温藥効ナキ証ニ大黃ト附子ト組合セ寒熱交ハ用

温脾湯本方治痢冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作寒時腹諸  
エルト深味アリ心得ハシ

一女年二十餘經閉三月肌肉削消氣字  
衆人云故ナシ言説錯處時在走ヤト  
家臣大ニ驚キ余カ診ラセ診之脉細數  
肌熱アリ腹中虛軟綿ノ如ク大便多シ  
至赤爛精神恍惚大ニ驚キ真ニ病  
ニ非ス又黃血ニ非ス此ハ氣血所屬ト  
誤ニ溫清飲加大黃ヲ喫テ腹スルニ數  
日肌熱漸ク去リ大候、潤利ノ象服ス  
ルニ牛黃清心丸ヲ以テメ精神稍足リ  
肌肉大ニ復シ經事ハ未ル乃只六六  
神益志滿ヲ以テ調理常ニ復ニ爲

溫

皆溫下ノ劑也

脘腹飲回春治婦人經脈不任或如豆計五色相雜面色痿黃

・当飯、芍藥、地黃、芍藥、黃芩、黃連、黃蘗、梔子

七八味

以方ハ溫ト清ト相言ニル處ニ妙アリテ婦人漏下或ハ

帶下或ハ男子下血久不止者ニ用テ驗アリ小栗豐後ノ

室下血不止十餘年面色萎黃腰痛如折面脚微腫アリテ

張氏牛ヲ束又余以方ヲ喫ニ至愈

雲林參苓白朮散曰意氣虛泄浮凡虛浮者飲食入胃即浮水

・熱藥不効宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也  
即千金溫脾湯方中去人參加厚朴桂枝

以方ハ千金方胎胎ニ千金熱痢門ノ溫脾湯ハ即四逆加

人參湯ニ加大黃冷痢門ハ去甘草加桂心今事方ハ去皮

人參加甘草厚朴俱ニ三味トニ其病症ニ通ノ取捨ニ

シ畢竟ハ仲師桂枝加大黃湯大黃附子湯ノ意ニ本キテ

皆溫下ノ劑也

脘腹飲回春治婦人經脈不任或如豆計五色相雜面色痿黃

・当飯、芍藥、地黃、芍藥、黃芩、黃連、黃蘗、梔子

七八味

以方ハ溫ト清ト相言ニル處ニ妙アリテ婦人漏下或ハ

帶下或ハ男子下血久不止者ニ用テ驗アリ小栗豐後ノ

室下血不止十餘年面色萎黃腰痛如折面脚微腫アリテ

張氏牛ヲ束又余以方ヲ喫ニ至愈

雲林參苓白朮散曰意氣虛泄浮凡虛浮者飲食入胃即浮水



婦人乳痛ハ蓋西洋臣所謂乳房神經  
之痛也

穀不化脉微弱是也

人參、白朮、茯苓、縮砂、薯蕷、藿香、橘皮、乾姜

肉豆蔻、訶子、蓮肉、甘草、生薑、燈心草、右十四味

此方ハ局方ノ參苓白朮散ヨリハ收濡ノ力優トス故ニ

胃虛下利不止者ニ効アリ

烏苓通氣湯同者治一切病氣無問遠近寒熱

烏藥、香薷、芍藥、香附、山查、陳皮、茯苓、白朮

、檳榔、玄胡、厚朴、木香、甘草、生薑、右十四味

此方ハ後世病ノ套劑トスルハ疎氣利水力主意ニテ寒

疝諸症溫散和申、藥効ナキ者ニ用テ通氣ノ驗著ルシ

其他婦人兩乳痛甚シキ者ハ見陰囊急痛スル者ニ與テ

即効アリ通氣ニ早玩味スベシ

溫肺湯月海雜錄

麻黃、杏仁、五味子、桂枝、甘草、右五味

此方ハ麻黃湯ニ五味子ヲ加ル者ニテ外感ノ咳嗽甚シ

キ者ヲ治ス三拗湯五拗湯ヨリハ其効著シ

一老臣曰、吾入夜、氣喘、而不眠、  
者、宜用此藥、蓋此藥、曰、每夜、  
不、ト、吾、方、藥、ク、ト、云、ケ、タ、ハ、又、モ、  
其、向、是、ノ、思、ハ、ハ、ル、ル、者、ナリ、  
此、置、  
光、二、十、日、湯、ナル、

治咽中生瘡音啞者

欬方々纏喉風咽中紅墨飲食藥汁下心下筋不入語言出

テサル者ニ用テ奇効アリ一海内ヲ打破スルノ代針ト

五ノハ三喜也亦枕邊鏡ハ作盛癢日金氣ニ鎮卵ヲ用ル

ノ意ニテ用テ明中ニ爲メ生スル者ニ用テ効アリト云

才意舉世相終世治心惟小使不利惡寒而渴者

[illegible]

水丸一症

用  
工  
一  
三  
又  
肖  
曷  
八  
木  
丸  
ノ  
症  
二  
ノ  
更  
不  
刊  
工  
ノ  
者  
一  
其

方二  
宣三  
蓋六  
方八  
尺酉  
ヲ製  
二  
ル  
ヤ  
十  
七  
掛  
二  
付  
子

下焦ノ火ヲ補灰芒萁薯蕷中焦ノ土ヲ補枳朮芩上焦ヲ清

シ水ト火ト上下ニアリテ中ノ水氣ヲ蒸タテル趣向也



緩中場時後

即時後茯苓緩中場

此方ハ小建中ノ變方ニテ能中氣ヲユルノ積聚ヲ和ス

ルノ力ヲアリ故ニ後世ニハ緩急場ト稱スルナリ但高

階ノ緩急場ハ紫胡桂枝乾姜場ニ薑甲芍藥ヲ加ル者ニ

ハ此方ト混スハ力ヲス若助下或ハ脘脩ニ疾癰アリテ

寒熱盜汗咳嗽等アル者ハ高階ノ方ニ宜シ

薑香正氣散局方治傷寒頭痛憎寒此熱腹痛霍亂

大腹、蘇葉、藿香、白芷、茯苓、厚朴、蒼朮、橘皮

枳椇、半夏、甘草、右十一味

此方ハ元嶺南方ニテ山嵐瘴氣ヲ去カ主意ナリ夫ニリ

夏月脾胃ニ水湿ノ氣ヲ蓄ハ腹痛下利ハ頭痛惡寒等ノ

外症ヲ顯ス者ヲ治ニ世ニ不換金正氣散ト同ク夏ノ感

冒藥トスレバ方意大ニ異ナリ

九味清脾湯治瘴瘧但熱不寒或熱多寒少

橘皮、厚朴、白朮、半夏、紫胡、黃芩、茯苓、甘草

草葉 九味

此方ハハ小葉胡湯ノ憂方ニシテ瘡病ノミナラズ熱少陽部  
部ニマリテ類瘡ノ狀ヲ爲ス者ニ効アリ蓋ホ荳蔻亦ヲ  
伍スル者ハ濕邪ヲ脱ルノ意アリ若濕邪ノ候ナク但熱  
固着ノ瘡狀ヲナシ乾咳ナト強キ者ハ東郭經驗ノ小葉  
故場ニ葛根草葉天花粉ヲ加ル者ヲ用ユ一ニ又吳又可  
ノ達原飲ハ此方ヲ脱胎シタルモノ也

驅風解毒湯口上治癰腫腫痛

荆芥、防風、獨活、甘草、連薊、牛蒡子

右六味東郭加枳椇石為含藥治纏喉風

此方原時毒ノ癰腫腫痛ヲ治ス然レ共此症大抵ハ葛根

湯加枳石ニテ宜シ若硬腫久ク散セサル者ハ此方ニ桔

石ヲ加テ用ユ一ニ東郭子ハ纏喉風熱氣甚ク咽腫痛

水藥屑滴モ下ラス言諾スルヲ解ハサル者ニ此加味ノ

方ヲ水煎シ冷水ニ浸シ極冷ナラシメ之ニ嚙シテ奇効

ヲ得ルト云余ハ咽腫腫痛甚キ者毎ニ此方ヲ極冷ニ



二

二叔隸寒大指觸物則氣宇暫塞不  
可名狀諸治無効余以為血氣壅滯  
方速愈多取桂山

宜之唯胸中痛背三月之微咳熱促十者八方之主也  
九味柴胡湯要治肝膽經毒熱瘰癧或耳內耳下生瘡發熱  
潮熱或肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹脇肋結核  
柴胡、黃芩、人參、施子、半夏、龍胆、當歸、芍藥  
甘草、右九味  
此方八小柴胡湯之變方之凡瘰癧、癰、寒熱、凡者之治  
之後世之肝經、濕熱、ト云、目的トス、シ但シ濕熱下  
部ニ專ニハ心者ハ龍胆、厚朴、湯ニ宜ク此部ニ專ニナル  
者ハ小柴胡湯加竜胆、胡黃連ニ宜シ此方ハ其中位ノ者  
矣治不也  
治絡氣飲胃元治流注塊或痛或不痛者或發乍寒乍熱示  
曰流注風  
水通、羌活、柴胡、升麻、白芷、桔梗、藟苈、當歸  
川芎、紅花、甘草、連芫、皂角刺、木鱉子、威靈仙  
右十五味素稟虛弱而脈微細者加人參、黃芪、脈洪大者加  
玄參、天花粉



寒年平子餘水氣ヲ患々周身洪腫小便不利  
 氣急促白面脚氣腫滿トシラシテ効ナシ  
 診ニ白子足麻痺セシ且虛里動ナシ脚氣  
 非ス但水ヲ利スシ導水散ヲ與フ自  
 苦タリシヲ熱診スルニ其人喘氣アリテ  
 肺氣不利ニ余試ニ三子養親湯ヲ與ントス  
 然レトモ腹痛甚シキヲ以テ法ヲ與フニ三日  
 シテ肺氣利シ小便快通水氣漸ニ消散ス後  
 痛生胃氣九ヲ與シテ五劑ハ滿

此方ハ多味ナシ便流注毒頑固ノ者ヲ効力スル力アリ  
 若膿膿ハ後ハ桂枝加朮附子湯ヲ製消毒ノ類ニ宜シ

廓清散 景岳治三焦壅滯氣道不清小便不通身腫脹

厚朴、大腹、澤瀉、茯苓、橘皮、枳實、白芍子、蘿

蔔子、右八味或郁李仁

以方ハ導水散々場ヨリ簡ニ効多シ蓋三子養親湯ノ

症ハ中焦壅塞スル者ヲ治ス

空倉瘧

川芎、黃耆、白芷、牛旁、桂枝、當歸、鹿茸、白朮

穿山甲、地黃

右十味去白芷牛旁地黃白朮加附子升麻名再造飲子

以方ハ大保元湯參耆鹿茸湯ヨリハ其力ヲ一等強クメ

瘧瘧氣血不足灌膿スル能ハサル者ヲ治ス若毒瘧ヲ兼

ル者ハ透膿散加反鼻ヲ與フベシ

駁邪湯 臣方問 瘧疾初發先寒後熱者俱用之

桂枝、乾姜、蒼朮、半夏、附子、柴胡、甘草

此方ト半夏厚朴湯ハ固ヨリ梅桂氣  
ニ用エルモノ多シ桂ハ固ハ半夏厚  
朴湯加浮石ヲ用エ奇功アリト云フ

寛中湯東郭

右七味續名方選加硫黃少許數日連進治勞瘵難截者  
此方ハ瘵邪陰分ニ陷リテ數十日解ヤス瘵勞ノ状ヲ為  
ス者ヲ治ス此方ノ症ニナ一等虛候ヲ帶ル者ハ匠王湯  
加附子ニ宜シ丹水子瘵ニ桂附ノ劑ヲ用ヒテシハ巢  
源ニ風寒濕ノ三氣ニリ諸病起ルト云ニ據レリ巢氏ノ  
説ハ元來虛邪賊風ヲ題トメ設ケタルナリ

半夏、茯苓、厚朴、干姜、蘇子、甘草

右六味或加吳茱萸

此方ハ半夏厚朴湯ニ甘草干姜湯ヲ合シ蘇葉ヲ蘇子ニ  
代タル方ニメ利氣ヲ主トス胃中ニ氣マハスリテ心下  
マラズ及シ氣宇鬱塞ナル者ニ宜シ東郭ハ婦人ノ經閉  
ニテ氣宇鬱塞スル者先此方ヲ用テ經水通スト云入手  
ノ人ト云ベシ

九味茶胡助肝固治微毒為勞收者

柴胡、黃芩、木通、芍藥、枳實、炮子、澤厚、地黃、車前



子、甘草 右九味

此方ハ高階叔固ノ自製ニテ濕勞ノ主方トス其要ハ乾  
要ノ柴胡湯ト竜胆泻肝湯ヲ取捨シタル者ナリ余濕勞  
ヲ治スルニ四苓ノ別アリ寒熱止マニ羸瘦スル者ヲ其  
方トシ盜汗不止咳嗽短氣胸腹動甚者ヲ柴胡姜桂湯加  
天石トシ結毒咳嗽人連ニ虛勞收ヲナス者ヲ枳實湯ト  
ス身體酸疼或痿弱微熱アリテ氣宇不樂在苒不愈者ヲ  
逍遙解毒トスル也

九味

半夏湯飲病論是升提滲利之劑治飲之主方也

半夏、升麻、猪苓、橘皮、澤泻、茯苓、柴胡、甘草

生姜 右九味

此方ハ石岐升庵

名厚古

ノ發明ニテ仲景治飲ノ方太小

青龍湯甘遂半夏湯十壺湯ノ類アレバ皆重劑ニナ容易

ニ用難シ此方ハ升提滲利ヲ主トメ治飲ノ主劑トス凡

飲食ノ不和ヨリ水飲ヲ生シ或ハ其氣心肺ヲ熏蒸シ頭

眩健忘種々証候ヲ現スル者ヲ治スト云中年以後肥滿

栗園先生方シ大刑病ニ用<sup>而</sup>眞入麻  
痺疾痛等シ兼<sup>又</sup>ハ烏頭<sup>強</sup>シ  
カ<sup>タリ</sup>

シ其人<sup>支</sup>飲<sup>上</sup>逆<sup>シ</sup>シ<sup>シ</sup>雲霧<sup>ハ</sup>中<sup>ニ</sup>居<sup>ル</sup>カ<sup>ハ</sup>如<sup>キ</sup>者余<sup>往</sup>ニ  
用<sup>テ</sup>驗<sup>アリ</sup>

九味<sup>栲</sup>湯<sup>家</sup>方<sup>治</sup>脚氣<sup>腫</sup>滿<sup>短</sup>氣<sup>及</sup>心腹<sup>痞</sup>積<sup>氣</sup>血<sup>凝</sup>滯<sup>者</sup>

、<sup>栲</sup>、<sup>大</sup>、<sup>厚</sup>、<sup>桂</sup>、<sup>木</sup>、<sup>蘇</sup>、<sup>甘</sup>

、<sup>生</sup>、<sup>右</sup>、<sup>或</sup>、<sup>去</sup>、<sup>大</sup>、<sup>加</sup>、<sup>吳</sup>、<sup>苴</sup>、<sup>苳</sup>、<sup>南</sup>、<sup>湯</sup>、<sup>以</sup>、<sup>枳</sup>、<sup>實</sup>、<sup>代</sup>、<sup>木</sup>

杏<sup>理</sup>脚<sup>氣</sup>之<sup>血</sup>凝<sup>滯</sup>為<sup>腫</sup>者

以<sup>方</sup>ハ<sup>和</sup>方<sup>ノ</sup>七<sup>味</sup>栲<sup>湯</sup>ノ<sup>枳</sup>實<sup>ヲ</sup>去<sup>リ</sup>厚<sup>朴</sup>木<sup>杏</sup>紫<sup>蘇</sup>

ヲ<sup>加</sup>ハ<sup>タル</sup>者<sup>ナリ</sup>脚<sup>氣</sup>腫<sup>滿</sup>短<sup>氣</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>唐</sup>侍<sup>中</sup>ノ<sup>一</sup>方

ヨ<sup>リ</sup>ハ<sup>腹</sup>シ<sup>易</sup>ク<sup>メ</sup>効<sup>アリ</sup>也<sup>臣</sup>栲<sup>蘇</sup>散<sup>ヲ</sup>用<sup>シ</sup>氏<sup>以</sup>方

ヨ<sup>リ</sup>大<sup>ニ</sup>劣<sup>レリ</sup>

○<sup>治</sup>血<sup>解</sup>毒<sup>湯</sup>方<sup>上</sup>即<sup>解</sup>毒<sup>劑</sup>方<sup>中</sup>加<sup>當</sup>歸<sup>紅</sup>花<sup>荆</sup>芥

以<sup>方</sup>ハ<sup>解</sup>毒<sup>劑</sup>ノ<sup>症</sup>ニ<sup>メ</sup>血<sup>燥</sup>ヲ<sup>帶</sup>ル<sup>者</sup>ニ<sup>用</sup>工<sup>總</sup>ノ<sup>遺</sup>癰

ヲ<sup>用</sup>エ<sup>ル</sup>症<sup>血</sup>氣<sup>枯</sup>燥<sup>者</sup>當<sup>歸</sup>麥<sup>門</sup>山<sup>梔</sup>子<sup>紅</sup>花<sup>ノ</sup>類<sup>ヲ</sup>加

ハ<sup>ザ</sup>ル<sup>ハ</sup>効<sup>ナシ</sup>老<sup>臣</sup>乃<sup>十</sup>リ<sup>又</sup>以<sup>方</sup>ニ<sup>反</sup>鼻<sup>ヲ</sup>加<sup>テ</sup>天

刑<sup>病</sup>ニ<sup>用</sup>工

託<sup>胸</sup>湯<sup>東</sup>郭<sup>即</sup>桑<sup>白</sup>皮<sup>湯</sup>方<sup>中</sup>加<sup>犀</sup>角<sup>灰</sup>苓



治久咳不止或產後喘咳頭項生疾癰聚之如  
貫珠者去細辛五味子倍射干加貝母于  
有効兼用南呂丸尾莖

也部

射干麻黃湯金匱

射干・麻黃・生薑・細辛・紫苑・款冬花・五味子  
大棗・半夏 右九味

此方ハ後世ノ所謂哮喘ニ用上水雞声ハ哮喘ノ呼吸ヲ  
形容スル也射干紫苑款冬ハ肺氣ヲ利シ麻黃細辛生薑  
ノ發散ト半夏ノ降逆五味子ノ收斂大棗ノ安中ヲ合メ  
一方ノ妙用ヲナスト西洋合鍊ノ製藥ヨリ實ニ勝レリ

此方ハ和田東郭外臺急喘ヲ治スル桑白吳茱萸二味ヲ  
中ニ犀角按蒼ヲ加テ駝胃湯ト名ケ脚氣毒衝心昏悶欲  
死ヲ治ス又沉香降氣湯ヲ合メ用ルヲ天ヨリ梧竹樓方  
集ニハ此方ニ沉香甘草洋參ヲ加人參按蒼湯ト名クト  
云之ヲ外臺大犀角湯ニ比スルハ其効ヤ、勝ル然レ氏  
原之ヲ大犀角湯ニ取テ其方犀角

喘而汗發痛突壯要寒身體疼痛者

放甘葶杏仁  
右四味

陽傷寒無汗ノ症ニ用桂麻ノ辨仲暑氏嚴然父

り犯ス一カラス又端家風冥ニ惑メ罷スル者

二 愈朝川善庵終身以一方二行端身

二  
人  
糸  
六  
一

上名急自道或自行或無行而唯領渴者有表物

二、甘亭、石燕、石四、冰、四、雙、快、幸、方、蓋、用、馬、個、氣

重陽  
一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十

食林人言曰 勇二子仁出而世云九月白十

成可勝而也運生者魚之

即三味湯

即神祖ノ御袖葉ナリ飢食ノ主方トス

麻黃杏仁甘草湯曰上治喘咳或自汗或無汗而喘煩渴者有痰飲者

麻黃、杏仁、甘草、石膏、桂枝、芍藥、知母、地骨皮、桑葉、冬桑葉、用烏膠同

以方八麻黃湯ノ裏面ノ藥ニ行出而喘下云力目的十



此方ヲ馬潤以申ユルハ、乾枯サシカラウ所  
一ノ兒下歲許身體腫脹煩渴喘急ハ  
更ニ禁食ニカフ以テエテ攻メ大ニ下利ハ  
ハ一立六行之明方ヲ續テ服セシメテハ功  
ヲ收メ宜方便覺

婦人秉性素弱每姓娠水腫隨胎者其用煎藥  
如米泔湯水防已湯等則有直隨胎者宜早方  
又宜灸子茯苓散亦良○山行冒瘴南務或  
入窟穴井中或窺室瓦堂諸濕氣熱氣常  
關一處而暈倒氣絕者俱可大劑連服即

リ熱肉裏ニ沈淪メ上肺即ニ熏蒸スル者ヲ麻石ノ力ニ  
テ解スル也故ニ決方ト越婢湯ハ奥大熱ト云字ヲ下メ  
アリ

麻黃附子細辛湯同上

治喘急息迫或自汗或更汗而惡寒或身微痛有痰飲

廟黃 附子 經子

右三才

方少陰ノ表熱ヲ解スルナリ一老人咳嗽吐痰午後背  
 洒淅惡寒シ後微似汗ヲ發シ不止一匡湯壺ノ惡寒ニシ  
 匡王湯ヲ與テ効ナシ此方ヲ服ス僅五貼ニテ愈凡テ寒  
 邪ノ初發ヲ仕損メ勞傷ヲナス者此方及麻黃附子甘草  
 湯ニテ治スルナリ此方ハモト表熱ヲ兼ル者故後世  
 ノ感冒挾陰ノ証ト同シ又陰分ノ頭痛ニ防風川芎ヲ加  
 テ効ナリ又陰分ノ水氣能枝去芍藥湯ヲ合テ用ニ陳修  
 園ハ知母ヲ加テ去水ノ聖藥トス

麻黃加朮湯

治本方症而小便不利者

即前董場方中加毫水

東方ハ風濕初起癸表ノ葉ナリ曆節ノ初起ニ至坎方ニ

治婦人浮腫喘急息或身體麻痺或寒或熱者又若風濕三痛風發熱劇痛關節腫起者加承陶育奇効是也

膚字肉字改心反相了

一若一等重中者八越婢加朮湯二宜シ

麻黃杏仁、薏苡、甘草 七四味

此方ハ風濕ノ流注ノ痛解セサル者ヲ治ス蓋此症風濕

皮膚ニ有テ未至關節故ニ發熱身痛ノハハハ此方ニテ

陽トモ若シ汗後病不瘥關節ニ聚テ痛熱甚キ都ハ當歸

痛湯ニ宜シ又男子周身疣子數百ヲ生シ走痛スル

者此方ヲ與テ即治ス

麻黃湯ハ金匱小兒丹毒及風毒風疹

麻黃、獨活、射干、桂枝、甘草、木香、石羔、黃芩

七八味

此方ハ風疹麻疹熱甚シク發泄シカタキ者ニ効アリ麻

疹ハ咽喉ニ別ニ宜シ小兒丹毒ニハ葦圓ヲ兼用スヘシ

麻黃湯外薑治少ハ喘嗽頭面熱



麻黄、芍药、甘草、桂枝、石羔、芍药、杏仁、生姜

麻黄方ハ小青龍湯ノ症ニ表熱甚者ヲ治ス但小青龍ハ熱ヲ主トセム心下水氣ヲ主トスルナリ

蔓荊子散 回春治上衝熱耳内生膿或耳聾

蔓荊子、芍药、麦門、木通、決明、茯苓、桑

白、甘草、菊花、升麻

右十一味方本出仁齋直指方治内熱耳出膿汁

以方ハ上部ニ熱ヲ釀メ耳鳴耳聾ヲナシ或ハ耳内膿汁

ヲ出ス者ヲ治ス但老人婦女血燥ヨリ来ル者ニ宜シ小

児聾耳ニハ効ナシ葛根黄芩湯ヲ與フヘシ

曼倩湯南陽治陳久腹痛榮作游蠱嘈雜吐食者以方與了字

湯同効只有殺蠱是驗者

即四逆散方中加豆豉黃連

此方ハ脾疾游蠱ハ症腹裏拘急脇肋ニ水飲ヲ停蓄スルヲ目的トメ用エ若游蠱ハ症拘急セム脇肋軟ナル者ハ

東郭翁曰聾耳ニ連堯湯通聖  
甘芳蔓陽ノ類ヲ用エヘシト

荳蔻甘棗湯 非甘之効十三

計部

桂枝湯 治衝頭痛發熱汗出惡寒腹拘挛者

桂枝芍藥甘草生薑大枣 七五味

以方八穀方八祖之古方以二胞胎之者百有餘方

其變化運用愚辨之待女

桂枝加厚朴杏子湯 治桂枝湯而胸滿微喘者

即桂枝湯方中加厚朴杏仁

以方八風家喘咳之者二用二老人八十每二感冒ハ喘

之凡者以方ヲ持藥ニ効アリ

桂枝麻黃各半湯 治桂麻二方症相半者

即桂枝湯麻黃湯合方

以方ハ外邪ノ壞症ニナリタル者ニ治用スハシ類瘧ノ

者ハ勿論其他風疹ヲ染ハ痒痛スル者ニ宜シ一男子風

用子ヲ十久シ病ヲ上氣喘喘急止シノ手  
背足附上浮腫シ良ハシス起即ナルヲ辨ス  
殺匿己ニ代ストス以方ヲ與テ一劑ニシテ喘急  
止マリ心ヲ腹ニ日ニ減シテ全効ヲ收メ

此方傳



桂枝湯六分厚心腹  
陰痛或拘攣初  
感腰腹旁痛者  
者了了而不大便者  
然下藥後又與附子  
如干陰證下字者以此

邪後腰痛止ニ又匿疝トメ療ニ其痛益劇ニ一夕此方ヲ  
 服ヤミメ發汗シテ脱然トメ癒  
 挂枝人參湯同上 治人參湯症而上衝急迫劇者

即人參湯方中加桂枝

欬方ハ協熱利ヲ治ス下利ヲ治スルハ理中丸ニ據ルニ  
 似タルトモ心下痞アリテ表証ヲ帶ル故金匱ノ人多勸  
 ニ桂枝ヲ加フ方名苟延也二痢疾最初ニ一棰欬方ヲ用  
 ル場合アリ其症腹痛便血ニナク惡寒烈ク脉緊ナク者  
 欬方ヲ與ル片ハスツト弛ク者也葵子ヲ所宜ト認スヘ  
 カラス丹水子ハ欬方ニ枳實茯苓ヲ加テ逆挽湯ト名ツ  
 ク是ハ匡廬法律ニ據テ舟ヲ逆流ニ挽クト又意ニテ欬  
 方ト同ク不利ヲ止ル手段ナリ

桂

枝加芍藥大黃湯同上治桂枝湯而腹拘牽甚有停滯者

即桂枝湯方中加芍藥大黃

此方ハ温下ノ祖劑ナリ温下ノ義金匱ニ出テ寒実ノ者  
 ハ是非此策ナケレハナラマナリ此方腹滿時痛ノ三ノ

一男子瘧疾ヲ病ミ百餘日余診スニ此瘧  
殊ニ甚シ其方ヲ與フニ劑ニシテ大ニ吐水ヲ  
全ク若シタリ古方候覽

治痛風走逐骨節疼痛手足痺痛者  
並同藥質丸是也

ラズ痢病ノ熱邪薄ク裏急後重スル者ニ効アリ一病人  
痢疾左ノ横骨ノ上ニ當テ處ラ定テ往々リ二寸程ノ處  
痛堪難ク始終年ニテ按シ居シテ有時桂里痢毒ナリト  
メ其方ニテ快愈セリト云又厚朴七物湯ノ其方ノ一寄  
重キ者ト知ルベシ

桂枝加附子湯同工 主治桂枝芍藥知母湯余下誤載焉

即桂枝湯方中加附子

其方ニ汗出惡風ニ用ルノミナラズ其用廣シ千金ニハ  
產後ノ漏汗四肢微急ニ用テアリ後世方ニハ寒病ニ用  
エ又其方ニ水ヲ加テ風濕或ハ流注蠱毒ノ骨節疼痛ヲ  
治ス

桂枝芍藥知母湯 金匱 (治桂枝湯證而惡寒或支節微痛者)

桂枝、芍藥、甘草、麻黃、生薑、蒼朮、知母、防風

附子 各九味

其方ハ身體痠痛ト云カ目的ニテ歷節數日ヲ經テ骨節  
カ水ノコブノ如ク腫起シ兩脚微腫アリヲワルタルク



遺尿症、甘姜苓朮湯、冒頭ヲ見ヘシ  
婦人、氣鬱結、胸脇動甚、寒熱交作、經行常  
愆、期多要、驚悸、鬼交、漏精、身體漸就羸  
瘦、其狀恰似勞瘵、婦室女情慾妄動、  
不遂者、多在坎症、宜坎方是也  
或見九歲、コレトモ、從來多病、ミテ其子日、收畜  
歲、鬼所為、コレトシ、然坎甲、胸膈、交結、ミレニ  
龜胸ノ形アリ、早、便頻數、連、夜、尿、尿、ミレニ  
細、尿、尿、診、視、ミレニ、事、候、アリト、馬、馬、湯、ヲ、進  
ハレ、世、遺尿、共、龜胸、全、愈、スト、云、フ

疼痛ノ為ニ逆上ノ頭眩乾吐ナトスル者ヲ治ス又腰痛  
鶴膝風ニ之用ニ又俗ニキビニ脚氣ト稱スル者坎方効  
アリ脚腫如脫トハ足クヒ腫テクツ脱スル力如ク行步  
スルテ不能ヲ云  
東同先生主治桂枝湯症而胸腹有動者

桂枝加龍骨牡蛎湯同上

即桂枝湯方中加龍骨牡蛎ハ白ハ虛弱浮熱汗出者除桂  
枝加白薇附子故曰ニ加龍骨湯

坎方ハ虛勞失精ノ主方ナル氏治用ノ小兒遺尿ニ効  
アリ故尾州殿ノ老如年六十餘ハ便頻數一時向山ニ度

上廁所腹痛急シテ他苦シム所ナシ坎方ヲ長服メ愈

桂枝加黃耆湯同上  
治桂枝湯症而黃汗或盜汗者

即桂枝湯方中加黃芪  
坎方能シ盜汗ヲ治ス又芍藥ヲ倍メ耆故建中

湯ト名ケ痘瘡及諸瘡瘍ノ内托劑トス又及鼻ヲ加テ揮

發ノ効尤優ナリ

桂姜草棗黃辛附湯同上

ケ

桂枝、生姜、甘草、大棗、麻黃、細辛、附子、七味  
辨上ノ麻黃附子細辛湯ノ條ニ見ユ茲ニ一奇説アリ仙  
臺工藤球卿曰凡大氣ノ一轉ハ萬病ヲ治スル極意ナル  
ニ別ラ血症ノ治ニ專要トセリ昔身一婦人勞暖ヲ建フ  
致血氣急肌熱午ヲ烙如ク肌膚削脱シ脈細數也予視ラ  
死症トス一區矢ヲ治スヘシトシ桂枝湯薑黃辛附湯ヲ  
用テ全愈ヲ得タリ予大ニ敬服メコルニ倣テ大氣一轉  
ノ理ヲ察明メ乳岩各疽及諸翻花瘡等數十人ヲ治シ得  
タリ翻花瘡ニ薑辛附湯ヲ用タル意ハ陰陽相隔リテ氣  
ノ續制ナキユヘ血肉其交ヲ失テ漸々頑固シ出血ニ至  
至ル也トメ金匱ノ陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃  
散ト云ニ本キラ此湯ヲ擬シタルナリ一婦人乳岩結核  
處ニ癰爛シ少ク翻花ノキサシアリ時々出血ス戊午初  
春ニ至リテ疼痛甚ク結核增長メ初テ臥床ニアリ正月  
二十八日薑辛附湯ヲ喫テ四五日疼痛退キ結核減メ床  
ヲ起ラ事ヲ視ルニ平日ノ如シニヘテ陰陽相得スメ勞



治經至經期頭重眩暈腹中腰脚疼痛者經水  
 上衝頭痛眼中生翳赤脈橫痠痛羞明  
 腹中拘攣者又血淋腸風下血按用皆有  
 効以上諸証加大黃為佳是也  
 或婦人手足左跗上腫腫其形痛如蠶  
 軟赤色帶時之痛痛者能治之  
 皆風濕或傷冷毒之之瘰癧瘰癧之先  
 生診曰發瘰癧注之為人瘰癧宜行血散  
 入之方加附子與之當發熱加芍藥  
 若石方以痛處之瘰癧全治之

類ヲナシ類血吐血顏色脫ノ為ス一カヲサルニ以湯ヲ  
 與テ起死回生ヲ得シ一アリト余謂ラク以湯ノミニ限  
 テス凡テ古方ハ以意ヲ體認シテ運用スル時ハ變化無  
 窮ノ妙ヲ得ヘシ

桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龍骨桂枝湯日三服動劇者

即桂枝湯方中去芍藥加牡蛎龍骨蜀漆

以方ハ火邪ヲ至ト故ニ湯火傷ノ煩悶疼痛スル者又

灸瘡ニテ發熱スル者ニ効アリ牡蛎ノ末一味ヲ麻油ニ

調シ湯火傷ニ塗レハ忽火毒ヲ去其効推メ知ルベシ

桂枝茯苓丸科日上 治經水有塊或胎動拘攣上衝下悸者

桂枝 茯苓 牡丹 桃仁 芍藥

七五味本方中加車前子茅根大黃名桂枝茯苓湯治瘀血

變成水腫者一方去大黃加琥珀或加薤白帶治之

以方ハ瘀血云リ来ル癥瘕ヲ去カ至意ニテ凡テ瘀血ヨ

リ生スル諸症ニ治用スヘシ原南陽ハ甘草大黃ヲ加テ

腸癰ヲ治スト云余門ニテハ大黃附子ヲ加テ血滯痛及

婦人經閉三月腹膨脹其形如月ノ形ノ如クシ  
テ里滿膨動ヤム消穀意鐵四股枯柴匠以  
テ膨脹ト云々診曰ク血滯アリ治スハシ世方  
散更甲太黄ヲ加フ兼ルニ硝石大同ヲ以テ服之  
二月ヲ經月水始テ通シ腹滿平ヲ成シ尚前  
方ヲ服スハ下年翁シテ愈金愈

古今經脈主中風陽寒脈浮者即此方  
此是風頭頸鳴乾吐者即此方

打撲疼痛ヲ治ス車前子茅根ヲ加ラ血分腫及產後ノ水  
氣ヲ治スルナリ又此方ト桃核承氣湯トノ別ハ桃承ニ  
如狂少腹急結アリ此方其癥不去故也リ目的トス又温  
經湯ノ如ク上熱下寒ノ候ナシ

堅中湯々々治虛勞内傷寒熱吐逆吐血

半夏、大棗、茯苓、芍藥、乾姜、甘草、薤白、七味本無

大棗有大黃今以茯苓代之或加當歸或加吳茱萸

此方ハ小建中湯ノ變方ニ其用廣シ古方家ニテハ小

建中湯加茯苓ヲ用ユレ此方ノ伍用力負ニ勝ナリ

雞鳴散口上治從高隨下崩中

大黃、當歸、桃仁、芍藥、七味

此方ハ打撲ノ主藥ナリ後世ニテハ此湯ハ當歸散ナ

ト用ユレ其効大ニ鈍也トス

解肌湯外臺主治天行病二三日頭痛壯熱者

即葛根湯方中加黃芩

此方ハ葛根湯ノ症壯熱甚ク少湯ニ進マントスル者ヲ



治之故二疫症熱ツヨク異汗者世医達原飲加麻黃十ト  
ヲ用ル場ニメ一鼓強ク發ス一キ症アラハ此方ヲ與ヘ  
シ其餘痘瘡ノ初起敗毒散ヲ用ル症ニ此方ノ行ク處ア

蠲

痺湯楊氏治風濕相搏身體煩疼項臂痛重動數難及手  
足冷痺腰腿沉重筋脉無力

・當歸・羌活・黃芩・芍藥・黃耆・防風・甘草・生薑

右八味外科秘要去黃耆防風甘草加白芷遺種名蠲痺消  
毒散治時瘡肢節筋痛

此方ハ麻痺筋痛ノ要藥トス風寒濕三氣合メ痺ヲ成ス

ト云カ目的ナリ又痺症ノ筋ヲ舒ルニ牽繩ノ舒筋湯ヲ

リ參考スヘシ

桂枝桃仁湯良方治經道不通繞臍寒疝痛微

・即桂枝湯方中加桃仁地黃

此方ハ虛候ノ經閉ニ乾血勞ノ初起ニ用ス桂枝湯全  
量妊娠ノ首ニ用テ和血ノ至トス又桂枝桃人ト伍スル

中風、身重、血分、走、九、桂枝、茯苓、九、桃核、承氣湯、同、肯、十

建中湯治却治痘淡白頂陷腹鳴下利寒顫咬牙者

人參、黃芪、白朮、當歸、川芎、附子、乾姜、桂枝、丁香、甘草、七十味

此方ハ痘毒内陷メ下利寒戰ノ者ヲ主トス此意ニラ

痘諸瘍及産後ノ下利止マヌ寒戰スル者ニ効アリ若毒

内攻メ下利戰震スル者ハ真武湯加反鼻ヲ用ユヘシ

解諸湯求類鈴方治心脾經受風言諸寔滋舌強不轉涎唾溢

盛及淫邪搏陰神内昏鬱塞心脉閉滯暴不能言

、桂枝、防風、獨活、附子、羚羊、甘草、酸枣、天麻

右八味

此方ハ中風ノ言諸寔滋ヲ主トス蓋言諸寔滋ニ虚更ノ

分アリ実スル者ハ所謂寔滋心數ナリ續而湯滾症九ノ

類ヲ用ベシ甚者ハ吐利ヲ與ルヲ主トス虚者此方也若

内熱アリ者ハ本草彙言一方或ハ犀角一味ヲ服セシム



又神仙解毒丹一方  
結毒喉癰一方  
廣筆記

桔梗、甘草、龍胆、射干、遺糧、山豆根、右六味送

下牛黃青洲名喉癰湯腐爛及鼻中者加茅黃兼用鼯鼠凡

以方八華同二直二喉癰湯一名今咽喉結毒一主方一

二咽喉一毒一以方及桔梗解毒湯紫金丹五寶丹二方

二一其劇甚二至二八黨藥二非二八驗十二

桂著湯藥言治傷寒裏虛表實行發散藥利汗不出身熱煩燥

二脈定數

即桂枝湯方中加黃芪紫胡人參

以方八桂枝加黃芪湯一變方二外感後自汗不止時

身熱脈虛數十九者一治二以症二一等三ツル者

八送玉湯加鹽甲二宜二

雞鳴散時方歌拾治脚氣第一白藥不同男女皆可服如感風

濕氣注脚痛不可忍筋脈浮腫者並宜服之

、麻柳、橘皮、木瓜、吳茱萸、蘇葉、桔梗、生薑

右七味方本出朱氏集驗  
此方ノ辨ハ唐侍中一方ノ條下詳ニス

建理湯

、即建中湯理中湯合方

此方ハ方意相及メ効ヲ相同ス建中ハ胃中ヲ潤ス葉十  
リ理中ハ胃中ヲ燥ス藥ナリ若胃中潤澤ナク無氣行  
ス物急或腹痛スレハ胃中ノ水穀益化スルヲ能ハス遂  
ニ内遺メ下利ヲナス故ニ二方相合メ効ヲ奏スルナリ  
百々漢陰曰人ノ脾胃ト云者ハ人家ノ臺所ニアルハシ  
リ西京方書關疎ニテ許ヲ見ルヤウナ者也常ニ水ヲ流  
サハルヲ得サル處ナレハ成丈乾クヤウニ世詔ヲヤカ  
子ハハシリ許カ朽ル也人ノ脾胃モ水穀ヲ受ニム處ナ  
レハ丈成水氣ノメクルヤウニ乾クヤウニセ子ハタケ  
テ傷リ也ト此譬ニテ理中ノ主意ハ明了ニ解スル也  
元陰陽本朝經絡治傷寒壞証古上黑胎乾裂精神恍惚津液  
枯竭熱劇不可奈者



濕性盛十九症黃連解毒湯  
合方し用へし一稿  
東郭翁曰結毒入眼腫人陷缺者  
去用赤劑之他藥之以之

此方ハ本朝老匠ノ傳ニテ面白キ考ナリ傷寒數日ヲ經  
テ熱解セズ壞症ニナル者ハ鍋ニ物ノコケ着々ヤウナ  
者ナリ變理ニユケテ取ントスルハ鍋ヲ損スル也先水  
ヲ入テ濁テ置テ夫ヨリ火ニカケル氏ハ其コゲカ自然  
ト取レル也傷寒ニ六味地黄ヲ入レルハ先水ヲサスナ  
リ黃連白茯苓ヲ加ハ火ニカケル意ナリ妙麿ト云ハ  
シニ味地黄ノ熱疫ニ効ヤルヲハ救瘟神麿ニ云見ユ  
解毒劑也川療微瘡便毒下疳結毒癰疽筋痛諸瘰癧及  
疥癩瘡諸惡瘡腫淋

即ニ味地黄方中加黃連白茯苓兩蘇牛南曰本方去黃  
連加防風黃耆治麻疹後數日熱不退者奇効  
此方ハ本朝老匠ノ傳ニテ面白キ考ナリ傷寒數日ヲ經  
テ熱解セズ壞症ニナル者ハ鍋ニ物ノコケ着々ヤウナ  
者ナリ變理ニユケテ取ントスルハ鍋ヲ損スル也先水  
ヲ入テ濁テ置テ夫ヨリ火ニカケル氏ハ其コゲカ自然  
ト取レル也傷寒ニ六味地黄ヲ入レルハ先水ヲサスナ  
リ黃連白茯苓ヲ加ハ火ニカケル意ナリ妙麿ト云ハ  
シニ味地黄ノ熱疫ニ効ヤルヲハ救瘟神麿ニ云見ユ  
解毒劑也川療微瘡便毒下疳結毒癰疽筋痛諸瘰癧及  
疥癩瘡諸惡瘡腫淋  
遺種 川芎 大黃 茯苓 木通 忍冬 甘草  
右七味或加桂枝附子牽牛子治身體疼痛或加車前子滑  
石阿膠若毒淋或加葶藶車前子桔梗防風滑石治濕服  
此方ハ舊川氏江州ノ民間ヨリ傳タリト云搜風解毒湯  
トハ方意ヲ異ニシ運用尤廣トシ其他諸家ノ解毒劑數

ク

痛并風高下凡下齒痛者灸肩井即効  
細辛八齒痛灸肩井即効  
アリトシテ

一男子腹中癖囊アリ時暖水ヲ吐シ雷鳴切  
痛經年不止不效方ヲ與起瘕丸ヲ兼用ハ  
病漸愈又二婦年三十餘少腹塊アリ時  
々下ニ衝逆ニ顔色青慘身微腫常ニ  
腰脊前痛汗ヲ漏下八衆近ニテ瘕スト臣  
葉汁ハ二入ハ即吐余診メ曰病難治ニ  
非之葉力達ニナル故ナリ決方カ紅花ヲ

桂

方アレトモ効用決方ニシカ  
枝立物湯東洞名上衝咽喉刺痛或生瘡者東洞曰治牙齒  
疼痛者南涯曰治血毒迫上者其証牙齒疼痛兩頰腫痛或  
舌強痛

桂枝 茯苓 桂枝 黃芩 地黃 古立味一名桂枝結

根湯或加大黃治有熱不大便者或加石羔治伏熱者

以方ハ出處未詳ナル氏東洞ノ經臨ニテ牙齒疼痛或口

舌糜爛ノ症ニ効アリ決方ノ一等重干者ヲ保元榮胡清

肝散トシ清肝散ノ虛候ヲ帶ル者ヲ滋陰降火湯トス

荆防敗毒散。羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 川芎

桔梗 茯苓 荆枝 方風 連翹 忍冬 甘草

不部

茯苓 桂枝 甘草 大棗 湯傷寒 治臍下悸而卒急上衝者

茯苓 桂枝 甘草 大棗 右四味

以方ハ臍下ノ動悸ヲ主トス大棗ハ能臍下ノ動ヲ治ス

ルモノ也決方下ノ動悸上ニ盛ナル者ヲ桂枝加桂湯ト



患ハ葉味法治始四月中ニ納ルヲ得タリ乃  
連服數日ニ衝止ニ瘕氣去ル龍蟠丸ヲ  
兼用シ河水減シ塊亦大ニ安シ瘕  
一更ニ十餘日下動悸アリ臥臥通リ拘急ニ  
急シ時々心下ニ衝逆ニ奔則有及人幸不  
省四肢厥冷等吸絶スルカ如シ救急瘕  
瘕ナシ今診言々瘕ナリト云ニ桂甘湯ヲ  
與テ服之數旬病ナレバ減ハ但腹中常ニ  
拘急ニ半身足ニ痺ヲ拘急ニ因ニ當氣虛  
中湯ヲ兼用ス數月メ全治ス同前

治飲家眼目生翳翳昏暗疾痛上衝頭眩腹  
滿淚多者加木草有奇効當心動悸胸  
脇支滿下逆滿等症為目的兼用龍蟠散  
時以藥四下差等攻之者目症亦有効尾量  
一僧暗下動悸アリ時々心下ニ迫リ眩冒等  
倒メトシ頭中常ニ大石ヲ戴カ如ク上盛下虛  
健歩スルヲ得ヌ同中ノ症ナラズシテ効ナ  
シ者下ニ出ラ治ラズニ余其方ヲ與ヘ  
妙善散ヲ兼用ス服スルヲ數旬須臾ノ  
病眩然トメ愈ス瘕  
東郭子曰眩運レシ吐水者ナ  
レハ五苓散最可ナリト

ス桂枝加桂湯ノ時下ヲ去テ心下ニノミアルヲ茯苓甘  
草湯トス故以三方一類ニメ相依ル者也苓桂亦甘湯ハ  
又別ニ離ル者ナリ茯苓甘草湯ハ苓桂亦甘湯ニ似タ  
レ氏逆滿ヤ目眩ハナシ若有レハ苓桂亦甘湯トスル也  
以方エト奔豚ノ水氣ニ屬スル者ヲ治スルカ主ナレバ  
運用ノ辟飲ニ與ラ特効アリ委キハ時還讀我書ニ見エ  
茯苓桂枝亦甘草湯 治宗博上衝起則頭眩小便不利者  
茯苓 桂枝 甘草 右四味  
以方ハ支飲ヲ去ラ目的トス氣咽喉ニ上衝スルモ目眩  
スルモ手足振掉スルモ皆水飲ニ因ル也起則頭眩ト云  
カ大法ナレ氏臥メ居ラ眩暈スル者ニテ心下逆滿サ  
ハアレハ用ル也夫ニテ治セサル者ハ澤浮湯ナリ彼方  
ハタトモ始終眩ナクメモ冒眩ト云モノニテ顔カヒツ  
ハリナトスル候アル也又以方動悸ヲ的候トスレハ榮  
胡夢桂湯ニ紛レヤズシ然レバ以方ハ顔色明ニメ表ノ  
シマリアリ第一厥カ沉緊ニナケレハ効ナキ者ナリ又

水病遍身腫滿小便不利下痞微下利腹脹  
身體痛或弱或重或重或弱或重或弱或重  
一男兒十歲脊梁曲三德傳六脈脈象急  
起下下ハサル下己三三手余方此手九ラ  
作下與下兩月三三手金氣心三三手候見  
傷寒論曰少陰病身體痛手足寒  
骨節痛脈沈者

附子湯方ニ没食子ヲ加テ喘息ヲ治ス又水氣ヨリ来ル痿痺  
ニ効アリ矢張足フルヒ或ハ腰又ケントシ劇者ハ臥メ  
居ルト脊骨ノ邊ニヒクヒクト動キ或ハ一身中脉ノ處  
ヒクヒクトメ耳鳴逆上ノ候アル者也本論ノ所謂久而  
成痿ノ症何病ナリ反アラハ此方百發百中也  
附子瀉心湯方ニ上 治瀉心陽證而惡寒者  
即大黃ニ連浮心陽方中加附子  
此方ハ氣痞ノ惡寒ヲ目的トス桂枝加附子湯ノ惡風芍  
藥甘草附子湯ノ惡寒皆同意ナリ若心下痞鞭ノ惡寒ニ  
ル者ハ千金翼ノ半夏厚朴心加附子ヲ用ユベシ  
附子湯同上 治身體疼痛小便不利心下痞鞭或腹痛者  
附子、茯苓、人參、白朮、芍藥、右五味  
此方ハ真武湯ノ生姜ヲ人參ニ代ル者也彼ハ少陰ノ裏  
水ヲ治シ此ハ少陰ノ表寒ヲ主トス一味ノ變化妙ト云  
ハシ此方千金ニ類方多シ身體疼痛ノ劇易ニ隨テ撰用  
スハシ



霍亂症山浮后厥冷筋惕煩躁寒熱要問字應辨小便不利脉微細者可用此方腹后小便利者可救得矣又治慢驚風搐搦下利  
不在煩躁恍惚小便不利脉微數者應問  
東郭曰霍亂吐下心欲絕但胸中微  
有結氣之象中三焦之氣元  
氣多亡也又即應神効

嬰兒喘咳吐乳食虛里跳動小便不利腹  
與此異者方加牛黃有動脈

茯苓四逆湯方上 治四逆加人參湯證而悸者

、即四逆湯方中加茯苓人參

此方茯苓君藥トスルハ煩躁ヲ目的トス本草云茯苓  
主煩滿古義ト云ハシ四逆湯ハ症ニメ汗出煩躁止マサ  
ル者此方ニ非レハ救フヲ能ハス

茯苓杏仁甘草湯全用 治悸而胸中痞者

此方ハ短氣ヲ主トス故ニ胸膈ノミナラズ支飲喘鼻ハ  
類短氣甚ト者ニ用テ意外ニ効ヲ奏ス又打撲ニテ體痛  
メ步行スルハ氣急メ息ドシカル者ハ未瘀血ノ盡サル  
也下劑ニテ下ラサルニ此方ヲ用テ効アリ此方橘皮枳  
實生姜湯ト並列スル者ハ一ハ亭雨ヲ主トシ一ハ淡滲  
ヲ主トシ各宜處アルハナリ

附子無味湯方上 治腹中雷鳴切痛嘔吐更寒者

附子、半夏、甘草、大棗、茯苓 右五味一方加丁香  
編砂治胃反甚服藥而翻者又胃寒吃逆不止

嗜酸吞酸等證アリ  
 滋陰補虛心苦酸水或痰沫兼用南星九脂胸无  
 苦又治老人常苦痰飲心下惡滿飲食不消易  
 下利者又治小兒乳食不化吐下不止并白痢  
 心下痞滿或逆者俱加芩夏二月始効若腸  
 腹有瘕塊或大便難者兼用枳實九也  
 或人年久胃虛已三四月腹中雷鳴三二便  
 或下利或不利而月時腹心下痞痛時時泄瀉  
 一轉氣氣ノ如シ決方ヲ與テ大ニ効ヲ得ナリ

此方緩米ヲ用ル者ハ切痛ヲ主トスル也外臺腹痛ニ就  
 米一味ヲ用エ徵トスニ此方寒病ノ雷鳴切痛ノミナ  
 ラズ瀉飲ノ腹痛甚者ニ宜シ又外臺ニハ霍亂吐ニ用  
 之アリ

茯苓飲同上治心痞軟而悸不便不利胸滿而自吐宿水後胸間痞氣滿不舒

茯苓、人參、蒼朮、枳實、橘皮、生姜各三味

此方ハ後世所謂留飲ノ主藥ナリ人參湯ノ症ニナ胃中  
 澀飲アル者ニ宜シ南陽ハ此方ニ豆豉黃牡蠣ヲ加テ瀉  
 飲ノ主藥トスト用ユナリ

茯苓緩中湯肘後緩痞氣

即桂枝湯方中加黃芩茯苓枳實

辨見于緩中湯條

茯苓補心湯千金治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶立

心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出善忘恐走不定婦

人崩中面色赤

茯苓、桂枝、甘藷、大棗、紫石英、赤小豆、人參



此方ハ心氣不定ニラ種々妄想ヲ榮シ浮心湯ノ場合ニ  
似タレ反虚候多ク顔色青慘ナル者ニ宜シ又婦人亡血  
ハ後面色浮腫心氣夾カナラザル者ニ宜シ  
伏龍肝湯曰上治勞傷衝任脉崩中去血赤白相兼或如豆汁  
伏龍肝、生薑、地黃、甘草、艾葉、赤石脂、桂枝  
右七味  
以方ハ崩漏帶下等ハ症芍飯膠艾ノ類ヲ與ハ血ハ減シ  
タレ以赤白相兼或豆汁ノ如キ止マサルニ宜シ若瘀水  
計多ク下ル者ハ蘭室叙藏ノ升陽溫燥湯ニ宜シ  
茯苓、澤瀉、白朮、芍藥、甘草、乾薑、人參  
茯苓、半夏、黃芩、黃連、乾薑、人參  
右六味一方加吳茱萸牡蛎甘草治久腹痛吐水及食漸爲  
瀉囊然不減飲食則無驗  
此方ハ半夏浮心湯ノ方ニノ停飲多ク心下痞鞭ニル  
者ニ宜シ又瀉囊吐水ノ証嘈雜甚者ニ用テ効アリ

不換金正氣散局方治四時傷寒瘧疫時氣霍亂吐瀉  
蒼朮、厚朴、橘皮、甘草、半夏、藿香

右二味或加茯苓

方脈子曰山嵐瘴氣云云海山瘴氣云云皆不正氣

以方八嶺南方ニテ山嵐瘴氣ヲ去ルカ至意ナリ夫ヨリ  
轉メ水土ニ服ヤサル者或ハ壞腹ト云テ腹氣失常吐瀉

ナトスル者ニ用ユ原葛庵ハ方五十餘通ノ加味アリ  
テ萬病ニ用タレ氏ソレ程ニ効アリ者ニ非ズ併シ不換

金ト云ハ古人モ珍重シタル者ト見ユ

後

元丹ニ因治水腫喘息奔急水氣盈溢心腹堅脹

、附子、木香、茴香、蜀椒、獨活、厚朴、蒼朮、橘皮

、吳茱萸、桂枝、澤瀉、杜柳、肉豆蔻、右十三味

以方ハ湯水ヲ治スル藥ナリ氏心腹堅脹ト云カ目的ニ

テ水ノミナラス氣ノ凝結カ甚タ短氣急喘スル者ニ宜

ニ故ニ不問ニテハ三聖丸ノ証ニテ堅脹甚者方ニテ

送下ス

茯苓補心湯良方治婦人以血壯氣衰為本心生血肝藏血今



或人教子勤王ヲ唱、諸難苦ヲ歷、維新ノ後  
志ヲ達ス、ト其身、體黃瘦、爪甲支裂、心中煩  
悸、憂鬱ス、ト能ハズ、脈細數、夜夢、汗、ト  
治テ益甚、余診曰、此即氣血兩虛、古ノ所謂  
脾胃虛弱、ト因ニ此方ヲ與、八寶、歸脾湯  
ヲ用、數日、氣力復シ、血澤旺シ、爪甲血  
潤、生ハ、爲

花子神心作  
生血膏  
及利己身、而心  
煩、不、思、食、者、此、方、  
ハ、此、方、

血衰而氣盛、由心氣虛、執不能生血、此藥專補心元之虛、調  
如榮衛、滋養血脉、兼治去血過多、虛勞發熱、及吐血、咳嗽、痰  
喘

、當歸、川芎、芍藥、地黃、杜果、半夏、茯苓、桔梗  
、蘇葉、萊胡、橘皮、葛根、人參、木香、甘草、生

右十二味

此方ハ血虛症ナ、心氣力閉塞メ血ヲ運ス、ト能ハズ、血  
逆ニ致ス、此方ヲ治メ、故ニ八珍湯ト云、大補湯ハ氣血  
兩虛者ヲ治シ、此方ハ血虛シ、氣実ス、此方ヲ治メ、一婦人  
顔色青滲、手足ノ爪、悉ク、破メ、營ス、此方ヲ治メ、一婦人  
ナシ、療メ、効ナシ、此方ヲ服メ、全愈

附子理中湯、直指治虛損、久利、四肢厥冷

、即理中湯方中加附子

此方ハ理中丸ノ方後ニ、コル者ナリ、理中ハ專ラ中焦ヲ  
主トス、此故霍亂吐瀉ハ、症ニ、四肢厥冷、此方ハ四逆  
湯ヨリ、及、此方力建ニ、應ス、此也、後世ニ、ラハ中寒ニ用

或婦腹滿、患心下堅硬、小腹膨脹、急短、自當微腫、アリ、經由三月、三、桃仁、承氣、大、氣、腹、ヲ、與、之、自、若、メ、リ、先、生、シ、テ、四、ク、容、易、治、シ、難、シ、ト、ハ、消、場、ヲ、與、之、消、在、大、同、ヲ、用、入、腹、ニ、七、日、シ、テ、効、アリ、連、服、月、餘、ニ、シ、テ、全、愈、也、

蓋、脹、疾、之、病、ハ、者、ハ、氣、消、惡、昔、刻、マ、リ、ト、モ、

ユレ、中、寒、ハ、桂、枝、加、附、子、湯、四、逆、湯、ヲ、優、ト、ス、  
 茯苓、琥珀、場、寶、鑑、治、臍、腹、腫、滿、脚、沈、重、不、得、安、卧、小、便、不、利、  
 即、五、苓、散、方、中、加、琥、珀、滑、石、甘、草、  
 此、方、ハ、五、苓、散、ニ、一、散、ヲ、合、メ、琥、珀、ヲ、加、ル、者、ニ、テ、五、苓、  
 ハ、元、小、便、不、利、渴、ヲ、主、ト、ス、ル、處、ハ、一、散、ノ、甘、淡、ノ、者、ヲ、  
 加、メ、琥、珀、ノ、カ、ヲ、添、テ、利、水、ノ、効、ヲ、立、ル、ナ、リ、此、方、ヲ、水、  
 ニ、用、ル、ハ、同、氣、相、求、ノ、理、ニ、テ、水、ノ、味、ニ、類、シ、タ、ル、味、ノ、淡、  
 白、ナ、ル、者、ヲ、用、テ、滲、透、セ、シ、タ、ル、也、  
 分、消、湯、同、者、治、中、滿、成、鼓、脹、兼、治、臍、腹、虛、寒、腫、滿、飽、悶、  
 、芒、朮、扶、苓、橘、皮、厚、朴、枳、實、猪、苓、澤、瀉、茅、草、  
 大、腹、編、砂、木、香、燈、心、草、生、姜、七、十、三、味、  
 此、方、ハ、利、水、中、之、疎、氣、ヲ、兼、テ、鼓、張、ノ、初、起、ニ、効、ヲ、リ、東、郭、  
 ハ、水、腫、心、下、痞、軟、小、便、短、ナ、大、便、秘、シ、其、腫、勢、アリ、テ、指、ヲ、  
 浸、セ、入、脉、沉、更、ナル、者、ニ、用、ユ、一、説、ニ、此、方、ハ、五、苓、散、ヲ、主、ト、  
 入、五、苓、散、ト、ハ、喉、氣、吞、酸、惡、食、飽、悶、等、ノ、症、ヲ、云、云、諸、水、腫、  
 ニ、テ、五、苓、後、ニ、飽、悶、ノ、意、アル、モ、ニ、用、テ、大、効、ヲ、ト、ル、



多シト云

浮萍湯曰上治諸風癰疥癩瘡

浮萍、當歸、川芎、荊芥、麻黃、甘草、芍藥、七味

以方ハ癰疥ノ發表ニ宜シ但シ大抵ハ葛根加荊芥將軍

ニテ治スレバ水氣アリテ發シ兼ル者以方ヲ用ユヘシ

古人天刑病ニ與レバ未タ効ヲ見ス

後元陽虧世傷寒矣頭痛寒身微熱面赤微渴目赤精光

口出臭偏語脈數矣力以汗下太過下元虛弱以矣根虛火

妄上名曰戴陽証宜以湯

附子、人參、甘草、五味子、麥門、黃連、知母、芍

藥、乾姜、右九味

以方ハ傷寒陽陽錯雜ノ者ニ用ユ四逆湯ニ生脉散ヲ合

シ黃連知母芍藥ヲ加タル趣意ハ既ニ陰位ニ陷リ裏ハ

虛寒ニナリテ居レバ表邪ハ熱甚ク譫語渴ナド有テ陽

症ニ似タレバ病者元氣弱ク脈ノ惡シキ者ハ以方ニ宜

フ

扶脾生脉散入門治見血後脾胃虛弱氣喘精神短少衄血吐血不止

人參、當歸、芍藥、黃耆、五味子、麥門、芩、甘草

草 治八味血不止者加白芍藥 治血不止者加白芍藥

冰方八吐血熱血不止虛羸少氣或八盜汗飲食進マサル

者ヲ治ス通云内傷熱傷肺胃喘嗽吐血衄血者生脉散

加黃耆甘草黃芩白芍芍藥ハ方ノ下ヲ云ナリ先輩

ハ方証ニ阿膠ヲ加テ經脈之レ氏余ハ白芍ヲ加テ屬吐

血ノ危篤ヲ救ヘリ

正神陽南陽理婦人血暈發熱或振寒小便不利上衝頭眩思

心或嘔或吐產後諸証婦人百病運用多端又云瘀血結痛

桃人輩類用益劇者有不可攻者其持重堅守之日可任用

血熱入膀胱者是正的

即五苓散加水香黃連乾姜方中去乾姜名香連五苓散

此方俗間經方ナレ氏面白キ組合ナリ五苓散ニ大香

連九ヲ言メ乾姜ヲ加ル者ハ血方不和ヨリ水氣ヲ釀シ



風引湯除熱癰瘤 大黃 乾姜 龍骨 桂枝 甘草 牡蠣 芍藥 寒水石 滑石 赤脂石 白脂石 葶石 石羔 石十二味

厚朴湯 治煩嘔腹脹 附子 厚朴 芍藥 桂枝 枳實 生姜 甘草

厚朴 生薑 甘草 半夏 人參 傷寒 治胸腹滿而嘔者

治霍亂吐瀉後腹猶滿痛有嘔氣者 腹滿非所謂實滿也

若小兒瀉頭水腫及瀉囊赤腫而小使短者 有奇効 厚朴

其在上胃中二淫熱ヲ生也 頭眩下利種種ノ變症ヲ成ス者 其標ニ眩惑ヤ二故方ヲ持重スルハ意外ニ効ヲ奏ス

古部

厚朴生薑甘草半夏人參湯傷寒治胸腹滿而嘔者  
厚朴、生薑、甘草、半夏、人參、右五味  
此方ハ中氣虛メ腹滿スル者ヲ治ス故ニ古人太陰ノ主  
方トシ厚朴七物ヤ厚朴三物ノ跡ニシ用エルヲアリ又  
平胃散ノ虛症ニ與テ能効アリ之方ニ等重キヲ香朴湯トス  
五苓散科同上 治消渴小便不利或渴飲飲水入則吐者

猪苓、澤瀉、茯苓、桂枝、蒼朮、右五味加車前子薑  
治瀉囊赤腫脹痛者加附子高陸治腫滿  
此方ハ傷寒渴而小便不利力面正ナシ氏水逆ノ嘔吐ニ  
用ヒ又瀉水ノ頭眩ニ用其用廣シ後世ニシテ加味ノ

有物當產後湯不著桂薑湯ニシテ方ナシト云  
桂薑湯方桂薑各人參走門之甘草  
乾姜大棗王瓜根離散用右水以酒四升煮  
取一合分

霍亂吐下不止心腹劇痛欲死者先用備急  
用或藥未起經投以方則安吐下止則藥入  
下者已得快吐下則苦楚脫然除其効至速  
不可不知履豐

一男子年四十一日卒然吐瀉五言元氣  
起上腹二面疼痛如絞投ニテ如打熱元氣  
一如大吐瀉吐瀉水目不得開足腹厥冷  
如冰甚片氣絕不知人事一日三度死又三  
楚不可忍脈細數身熱又無胎阻腹內  
膈中動悸應之便如常以方加死番ヲ  
與一ニ日ノ氣絶止吐瀉吐水厥冷頭上  
如大平按但動悸以不止桂枝加竜蚘ヲ  
服サニテ主愈ハ療治奈法  
如前章前日產後日斗リ大吐瀉ノ數  
日不止を胸下ツキニテ二角ハ一匙ニテ  
ニ度事ノ多三分ヲ用効ニ治ニタリ

吳茱萸湯

日上

治臨而腹滿心下痞澀者

一合分

吳茱萸、人參、生姜、大棗、右四味漬酒家加夏連用上煎下寒証

以方ハ濁飲ヲ下降ルルヲ主トス故ニ涎沫ヲ吐スルヲ  
治シ頭痛ヲ治シ食穀欲吐ヲ治シ煩躁吐逆ヲ治ス肘后

ニシハ吐唾嘈雜ヲ治シ後世ニシハ噦逆ヲ治ス凡危篤  
ノ症濁飲ノ上溢ヲ審ニメ以方ヲ處スルハ其効舉ヲ

數ハカタシ吳茱萸ハ烏頭ヲ加テ病ニ用エ其症ハ陰囊ヲ  
リ上テ致メ刺痛メサシユニ吐ナト氏アリ何レ上ニ迫

ルカ目的ナリ又久腹痛水穀ヲ吐スル者以方ニ沉香ヲ  
加テ効アリ又霍亂後轉筋ニ加水氏大ニ効アリ

候氏黑散料金匱外臺治風癰瘰癧昭曰脚空虛則邪陽留於



或八偏枯者患此一二其症比之諸  
諸証稍寬之似然一日果熱之氣三頭用  
刺灸之如面色潮紅脈孔旺飲之八九能  
久口涎沫之流不至外溢此其重者與一  
頭痛眩暈甚余診之請治之曰人中風  
ノ再發一ト方ヲ用テ服スル數貼熱頭痛  
痛止遂止尚前方ヲ連服シテ請賦和  
哥ラ床シタリト云

東郭氏曰此湯に射干麻黃湯等劇者  
用之方功アリ然ラズ喉々カク不止ハ多  
ハ腫スル者此湯奇ナリモ腫スラナ  
シ生痰者益々此湯ヲ用ニシ

喘息急者半夏為末和生薑汁如糊服之甚効

東郭氏曰此湯に射干麻黃湯等劇者

用之方功アリ然ラズ喉々カク不止ハ多

工

填滿空際使邪氣不能容  
菊花、蒼朮、細辛、茯苓、牡蛎、桔梗、防風、人參  
、礬石、黃芩、當歸、乾姜、川芎、桂枝  
、十四味或去礬石  
此方ハ多味繁雜ナレ氏中風ノ頭痛眩暈甚キ者ニ効アリ  
往時司農川路左衛門尉偏枯ヲ患ヒ癱瘓稍差ハ後  
頭痛甚ク晝夜呻吟不能眠服醫中ヲ求又余此方ヲ與  
即効ヲ得タリ又先輩辻本氏屢以此方ヲ用ニテ見タリ  
厚朴麻黃湯曰上  
厚朴、麻黃、石膏、杏仁、半夏、乾姜、細辛、小麥  
、五味子、右九味  
此方ハ小青龍加石膏湯ニ似タル藥ナレ氏冷氣ノ力ヲ  
傷トス故ニ喘息ハ氣ニ用テ効アリ溢飲ヲ主トスルハ  
小青龍加石膏湯ヲ宜トス又射干麻黃湯至ニ又用然レ氏  
此方ハ熱強ク脈浮ナル者ニ宜シ彼方ハ熱ナキヲ異ナ  
リトス又高貴安使ハ人膏浸ニ過テ腹滿嘔吐ヲナス者此

九二





女才亦解毒也生稟薄弱ニシテ毒  
 谷達ニ解之遂ニ内攻シ腹滿心下苦  
 肉衝ハセリトシ遍身浮腫大ハ便不利  
 肺微細四肢厥冷ニ他医治ス能ハズ  
 陽氣不復ノ症トシテ千金五香湯加  
 薑ヲ其方ハ下苦去四肢温ク復ス  
 治ニ東洋孫卿陽ヲ照ラ遂ニ全愈  
 前臣産後水腫治方ヲ療毒内攻腫  
 シ治セシ方ヲ移ス

東野子母方ハ下苦去四肢温ク復ス  
 治ニ東洋孫卿陽ヲ照ラ遂ニ全愈  
 前臣産後水腫治方ヲ療毒内攻腫  
 シ治セシ方ヲ移ス

此方ハ解毒ノ良方ナリ凡瘡毒内攻衝心ノ者此方ニ非  
 レハ救フ能ハズ又瘡疹ノ内攻ニ與テ宜シ本邦往古ノ  
 医書ニハ此方ニ多ク加減メ胎毒ノ主劑トスル也又小  
 兒初生ニ用エ此症ハ色ナト青白ニナリ其外何トナク  
 瀉症ヲ顯シ心下ニ迫ル氣味ノ者ニ宜シ此一段重ク四  
 逆湯トス然レ成初生附子ヲ用ル場ニ至レハ多難治ナ  
 リ

黑散曰上治小兒驚風中挾時行温病或非驚熱時而時行者

麻黃、杏仁、大黃 右三味

此方ハ麻黃湯ノ變方ニメ小兒暴熱ヲ發シ氣急喘鳴ス

ル者ヲ治ス此方ハ症ニメ一等重ク吐腹膨脹スル者ハ

本草彙言治小兒風痰方ヲ用ヘシ

五蒸湯外聖鮮立蒸熱

、茯苓、葛根、知母、黃芩、石膏、竹葉、地黃、獐牙

、甘草、人參

右十味按入内有麦門冬治男婦諸虛煩熱蒸熱自汗等症

此方ハ竹葉石膏湯ノ變方ニメ骨蒸熱者虛脱也カル者  
ヲ治ス此方ト蘇沈良方ノ麦煎散ハ骨蒸初起ノ主劑ト  
ニ但此方ハ入門ノ所謂煩熱蒸痿自汗ヲ主トシ麦煎散  
ハ方後所謂骨蒸黃瘦口臭盜汗ヲ主トスル也  
五續散蘇沈治内外感寒和一切氣通血絡

・薏苡、茯苓、橘皮、白朮、甘草、麻黃、當歸、厚朴、  
川芎、芍藥、桔梗、半夏、桂枝、枳實、乾姜

合十五味去麻黃名和氣飲

此方ハ軒岐救正論ニ氣血飲良疾ヲ五續ト云ルヲアリ

即此意ニテ名クト見ユ故ニ風寒ヲ驅散シ發表スルノ

外ニ内ヲ溫メ血ヲ和スルノ意アルハ風寒濕ノ氣ニ感

シ表症モアリ内ニハ從夫ノ病續アリテ胸腹疼痛スル

者尤効アリ先哲此方ヲ用ル日ハ腰冷痛腰膝痠急上

熱下冷小腹痛ノ四症ナリ其他諸病ニ効アルヲ宋以來

俗人モ知ル藥ニシテ示輕蔑スハカラス

牛車腎氣丸料衛生治諸虛腰重脚腫ハ使ハレ

一僧年七十餘淋瀝數日愈エスハ便白濁  
其病腰ニ引ケ苦楚言フハカニ入諸藥寸効ナシ余此方ヲ與ヒ通淋散ヲ兼用シ其病漸愈



牛車以爲 膠病 小便不通  
下注 浮腫 或尿 小便 腹  
色方 或 不仁 苦 九年

牛車 步 連 湯 定  
即 下 腹 痛 不 差  
浮 家 傳 深 性  
可 下 腹 痛

此 爲 元 周 曰 便 毒 初 起 用 此 方 謂 在 神  
効 又 曰 臨 魚 口 便 毒 如 神

即 腎 氣 丸 方 中 加 牛 膝 車 前 子 一 名 加 味 腎 氣 固  
此 方 八 八 味 丸 之 症 二 小 腰 重 脚 腫 或 痿 弱 不 行 者 治 之  
一 男 子 年 三 十 餘 年 之 脚 氣 之 患 七 腰 重 脚 軟 步 不 能 行  
二 冬 月 之 稍 差 兒 二 似 々 氏 春 夏 之 際 二 至 八 復 發 之  
ル 丁 故 之 如 之 余 獨 之 飲 冬 之 春 未 二 至 八 方 方  
服 之 シ メ ラ 全 愈  
五 虎 湯 回 春 治 傷 寒 喘 急 又 治 虛 喘 急 先 用 此 湯 表 散 後 用 小  
青 龍 湯 加 杏仁  
即 麻 杏 甘 石 湯 方 中 加 桑 白 本 有 細 茶 今 不 必 用  
此 方 八 麻 杏 甘 石 湯 之 變 方 二 喘 急 之 治 之 小 兒 二 最 効  
フ リ 但 馬 脾 風 八 一 種 之 急 喘 二 此 方 之 症 二 非 不 別 二  
考 究 本 書 三  
牛 膝 膏 連 湯 曰 上 治 鎖 熱 在 上 面 腫 多 從 耳 根 上 起 俗 曰 大 頭 瘟  
・ 黃 芩 ・ 黃 連 ・ 桔 梗 ・ 石 羔 ・ 大 黃 ・ 荆 芥 ・ 防 風 ・ 羌 活  
・ 連 翹 ・ 牛 蒡 甘 草 右 十 一 味 本 有 玄 參  
此 方 八 時 毒 大 頭 瘟 之 主 方 十 七 凡 之 續 熱 上 二 在 之 諸

栗園先生新修治鼓脹一万余下白產  
忘破血更水氣二瑞珀湯ナリ鼓  
脹ナリ治鼓脹一万余下白產

瑞珀湯 療產後小腫方  
瑞珀 枳實 澤漆 杜松  
本 在之 及鼻 不七味

本方各症 症受之 亦宜  
天亦奇ナリ 但痛ノ劇ニキ程定

惡瘡ヲ發シ愈難キ者ニ用テ效アリ時毒頭瘡ノ類其初  
ハ葛根加桔石ニテ發汗ニシテ發汗後腫痛不解者ハ小  
柴胡湯加桔梗石燕ニ宜シ其次ヲ大柴胡湯加桔梗石  
燕トシ其次ヲ柴方トス若早ク柴方ヲ與ニバ甚夕工  
合惡キ者也

琥

琥珀湯 治產後水腫及諸血毒腫  
琥珀、商陸、及鼻、猪苓、丁香

右五味或代丁香以桂枝

以方ハ血分ノ水氣ヲ治ス故ニ產後ノ水氣及諸血毒腫

ニ効アリ若以方ヲ與テ腫氣減ヤサレ者ハ車後集血

分腫ノ一方ヲ與フヘシ又賢慶集ノ調經散ヲ兼用スル

ニ佳ナリ又產後水腫ニ桂枝丸方車前子ヲ用之

立 物大黃湯東洞治指腫而腐爛熱痛者所謂療疽指痛也或

痔脫肛者用以湯洗之効

大黃、桂枝、地黃、川芎、甘草、芍藥、

以方ニ出處未詳東洞ノ經驗ニテ療疽代指ニ効アリ或



ハ蒸藥ト云病脱肛ヲ治  
虎翼飲產師治心下逼而吐者

即ハ半夏湯方中加茯苓橘皮伏龍肝

以方ハハ半夏加茯苓湯ニ橘皮伏龍肝ヲ加ル者ニモ惡

阻ノ主藥ト云但惡阻ノ甚ニ至テハ湯劑及テ敷スル者

ナリ單烏梅丸ヲ存今ニ下スハニ虛候者ハ半夏乾姜

人參丸ニ宜シ以方ハ及テ雜病ノ吐逆不止者ニ運用メ

効アリ

黑豆湯家方治微瘡腹輕粉口中腐爛齒斷出血不止者

黑豆、桔梗、紅花、大黃、甘草、古立味

以方ハ輕粉或ハ甘草ノ毒ニ中リ口中腐爛牙根露出飲

食咽ニ入ルハ下能ハス疼痛甚者者ヲ治ス大抵ハ含嗽

煎ニテ治スル氏其劇毒ノ者ニ至テハ以方ヲ内服セサ

レハ驗ナシ

一男子年午餘脚腫痛不可忍日夜呻吟  
諸名効方全方與之病頓  
退方更覽

服藥膨脹熱痛癰胞腫脹及爛脚風痺痛楚  
後人多者兼用應靈散時以烟肉散或茶  
又名府府內攻身洪腫氣喘喘口渴  
二便不通此里動如惡毒者更加名動不勝  
「期子年五十五餘脚腫痛不可忍日夜呻吟  
諸名効方全方與之病頓退方更覽」  
「方」之病頓退方更覽

小兒久咳嗽二旬其多奇功アリ  
其方小兒青如二等劇用二功アリ  
其方小兒青如二等劇用二功アリ

紅麻疹及痘疹之咳

越婢湯金匱治一身悉腫喘而渴自汗出惡風者

麻黃、石膏、生姜、大棗、甘草、右五味或加附子

其方ハ脾氣ヲ榮越スト云カ本義ニテ同シ麻黃劑ナレ

氏麻黃湯大青龍湯トハ趣ヲ異ニシ大熱汗出ト云カ

目的也故ニ脚脹皮水等ニ用テ傷寒溢飲ニハ用ヒス又

論中ノ麻黃杏仁甘草石膏湯ニ於テ一類ノ者ナリ

越婢加朮湯口上諸瘡肉反黑合經驢氣治越婢湯症之而使不利者

即越婢湯方中加蒼朮或隨証更加茯苓附子

其方裏水トアリ越婢湯方後ニ風水加朮四兩トアリ

風水ノ誤ト知ルニ朮ヲ加ルモノハ濕邪ニ麻黃加水

湯ヲ與フト同年段ナリ千金ニ附子ヲ加テ脚弱ヲ治ス

凡ハ風濕ノ邪ノ為ニ脚弱スル者ニテ即今ノ脚氣痿弱

越婢加半夏湯日上治越婢湯症而吐逆者

即越婢湯方中加半夏

其方ハ肺脹ヲ主トス其症類メ上氣喘アリテ氣急ニ甚



或常奇疾アリ治ラ先生求其始志  
振ス救食日減シ終ニ穀ヲ納ルニ能  
ハズ但紫海苔ヲ人良ノ日ニ兩枚他苦  
シム所ヲ以テ神仙骨トシ方ヲ授  
驗ナシ先生腹ヲ診スニ左脇下癰塊アリ  
其大ハ肩背ニ徹シラ痛々大便一月僅ニ  
一行小便日一行月事常ノ如シ余漸ニ  
癰塊ノ為ニ所為トシ以テ方ヲ授フ終ニ一  
人タルヲ得ル  
或女年十七歳ノ時寒肩背拘急ニ定  
辛痛腹裏拘急胸膈悶亂進マズ弱  
瘦甚シ先生診メ曰是所謂癰癧為勞者  
ナリト方ヲ授テ脊脊ニ灸シ癰急消  
弛ニ腹裏大ニ和シ但氣力衰テ身軀  
ニスルハ拘急ニ理知テ肝散ヲ投メ痛止

工  
支飲ニ似タリ然レ氏支飲ノ喘ハ初胸痛或ハ手足厥冷  
氣急ニ側臥スルノ不能肺脹ノ上氣ハ熱勢ヲヨク辛  
ニ癸メ目眩スルカ如ク狀アリ然レ氏側臥ニカタキニ  
非ス半夏ト石羔ト伍スル片ハ破飲鎮墜ノ効アリ小青  
龍加石厚朴麻黃湯ト同ニ一アリ又心下ニ水氣アリ或  
脇下痛ニ缺盆ニ引者ハ小青龍加石羔ニ宜キナリ  
延年半夏湯外臺主腹内左肋痞硬急氣滿不能食胸背痛  
、半夏、紫胡、蠶甲、桔梗、吳茱萸、枳實、檳榔、人  
參、生姜、右九味、枳實、紫、羊、人、吳、枳、檳、  
枳方ハ痞癰ノ主方トス其中東郭ノ説ノ通り吳茱萸ハ  
左部ニ在者ニ最効アリ又脇肋ノ下ヨリメ肩背ニツ  
リ牽急スル者ニ宜シ若痞癰ニテ胸背ヨリ腹中ニ及  
テ拘急スル者ハ外臺紫胡蠶甲湯ヲ宜トス又黃芩ニ用  
ルニ平胃散ト上下ノ別アリ枳方ハ病上ニ位メ胸滿氣  
急スルヲ目的トス平胃散ハ病膈下ニアリテ氣急ノ症  
ナシ

益氣聰明湯試効治飲食不節勞役形體胸胃不足內障耳鳴

或多身目昏暗以藥令目展大

、黃耆、人參、甘草、蔓荊子、升麻、葛根、芍藥、黃

蘗、芍藥

以方八老丸十ト心思勞動メ目暗耳鳴スル者ニ効アリ

真ノ者有十トノ内障ニハ更ニ効ナシ

益元湯六書治傷寒微熱煩悶面赤脈數裏振上熱下冷

、即事也復元湯方中去芍藥加艾葉

以方ハ復元湯ト同シトニ陰陽錯雜ノ治方ナリ本邦

ノ医ハ既ニ柴胡四逆杯ト云者ヲ用エ上盛下虛ニ

ハ既清湯外熱裏熱ニハ復元湯止熱下冷ニハ增損四順

湯ト云様ニ規則ヲ正クメ用エバシ

營實湯 本朝經脈滌宿水

、營實、大黃、甘草 右三味

柴方ハ疎滌ノ効至テ提ナリ実証ノ水氣腹滿ニハ即効

アリ又病ヨリ来ル水氣ニ宜シ舊友神戶儒員澤熊山嘗



牙齒痛齒齦腫痛齦枯口臭等其人  
 多平日大便乾閉而衝逆宜攻方

天部

調胃承氣湯傷寒

大黃甘草芒硝各三味

以方ハ承氣中ノ輕劑也故ニ胃ニ屬スト云胃氣ヲ和ニ  
 ト云少々與アト云大々承氣ノ如ク腹滿燥屎ヲ主トセ  
 之唯熱ノ胃ニ屬メ内壅スル者ヲ治ス雜病ニ用ルモ皆  
 以意ナリ

テ病塊アリ夏秋ハ間水氣ヲ腰シ腹裏腫大兩脚洗腫腹  
 滿如鼓諸治水利劑ナリ切テ以テ方ヲ服シ三貼ニメ微シ  
 五貼ニ至金ク愈蓋利水ノ西郁李仁中上ニ係リテ批衣  
 三月後ニ當実ハ中位ニ在テ牽牛子ニ比スルハ最峻ナ  
 リト云又其尤峻ナ者ヲ切通ナシ其甘遂ヲ重ク巴豆  
 ナスル也且下利後大渴ヲ禁メ宜ク千金ノ綠豆湯ヲ服  
 セシメ其渴ヲ消クニ可ク

東洞曰失精家而小便不利膝下有動或更  
治老人腰冷小便頻數或遺溺小腹有動  
者又老當痿弱膝下有動或兼小便白濁  
者嚴禁入房服此方不過一月必有動

者主之

吳或新道者主之

天雄散新金匱治失精家膝下有動上衝惡寒小便不利者

天雄、白朮、桂枝、龍骨 各四味

以方八桂枝加龍骨牡蛎湯ノ症ニハ瀉寒ニ屬スル者ヲ

治ス一人常ニ瀉寒冷シ苦ニ時ニ精汁自出ル者此方

ト先藥トニ長服又愈

葶藶大棗浮肺湯同上治浮腫喘逆喘鳴迫塞胸滿短急者

葶藶、大棗 各二味

以方ハ肺癰ノ初起及支飲ヲ治ス葶藶苦寒肺中ノ氣閉

ヲ泄ス故ニ喘メ不得臥者及不得息者ニ用ス大棗ヲ伍

スル者ハ十聖湯免英丸ト同意也葶藶ハ苦味ノ者ヲ用

ス

調中湯醫屢治產後怯腹痛作陣或如錐刀所刺洞浮腸鳴

良姜、當歸、桂枝、芍藥、附子、川芎、甘草 各七味

以方ハ產後ノ下利ヲ治ス蓋產後ノ下利ニ二道アリ其

一ハ心下ニ水結アリ雷鳴下利ニハ中赤爛ハ飲食進

ス不進字金鑑ノ所謂口糜浮十甘草浮心湯ニ宜ニ其



又產後下利不止寒戰者建  
中湯方アリ

一、腹中虛寒飲食不化、下利、食後忽腹痛刺力如  
久、大暴泄、スル者、此方ノ主ナリ、若腰以下有水氣者ハ  
真武湯加良姜ニ宜シ、又一種腸胃間ニ熱アリ、水浮止  
ニナル者ハ改陽氏ノ按ニ本キテ四苓散加車前子大ヲ  
用スヘシ

釣藤散 本方乃治肝厥頭暈

釣藤、獨活、手夏、麥門、茯苓、人參、菊花、防風

石羔、甘草、生薑 右十一味

此方ハ經ニ所謂痼疾ハ人氣逆甚シク頭痛眩暈シ或ハ

肩背痠急、眼目赤、心氣鬱塞者ヲ治ス、此症ニ龜井南溟

以溫膽湯加石羔ヲ用ス、氏以此方優トス

調榮湯者林軒治金瘡傷損脫血者、東園先生曰治婦人帶下

腰腹絞痛者

人參、芍藥、川芎、芍藥、地黃、茯苓、牛皮消、川

骨、白朮、甘草 七十味

此方ハ八珍湯ニ牛皮消、川骨ヲ加ル者ニ至金創傷損脫

ラ

一婦年四十許小腹一塊ヲ生シ數年解セズ時々  
 衝逆ノ動悸頻行如流余其方ヲ傳ヘ兼  
 消石之方ヲ服セシ數十日ニシテ衝逆止ミ動  
 悸發セズ小腹塊亦隨テ羊ヲ成ス時ニ經水大  
 ニ来リ周身ハ汗流滿面赤熱夜ヲ脱シ扇ヲ  
 揮入乃當飯ニ黃湯ヲ與フ數日ニメ大汗漸ク  
 減シ經水亦隨テ常ニ復ス焉

一婦人年三十病疾ヲ患ヘリ三月肩毛脫落  
 シ鼻頭腫大ニ一身腫ラ赤斑雲ノ如ク手足  
 麻痺三月經不通余乃抵當丸ヲ作テ飲  
 セル七日ニ三錢ヲ服スル一三十日血下  
 ルテ數日後一日日ニ三錢ヲ服スル

血ノ者ニ効アリ牛皮消川骨ノ二味ヲ本邦古来ノ經脈  
 ニテ打撲傷損ニ用テ和血止痛ノ藥アリ南總九十九里  
 一老婦アリ帶下ノ奇方ヲ施シ牛皮消一味ノ末ナリ余  
 ハ決意シ體メ共方ヲ運用スルナリ  
 定悸飲標定治奇脉  
 即壹粒木甘湯方中加吳茱萸牡蛎李根皮  
 共方ハ外臺ノ牡蛎芍药湯ニ本キテ製セ也奇脉ノ三  
 十ニテ諸動悸ノ症衝逆ノ勢子公者ハ共方ヲ斟酌メ用  
 コシ

呈呈海一方經經海治癰毒筋骨疼痛  
 遺種、白鮮皮、金銀花、荊芥、薏苡、木通、薄荷  
 當飯、防風、七九味  
 抵當湯 傷寒論 水蛭 蟅蟲 大黃 桃仁 杏仁

安中散局方治遠年日近胸疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留滯



東郭翁曰病後大抵失中散三陰  
 十其外症三因之香六附石或附  
 石其本陽下也月之皮松燥  
 之腹痛強十三廿年密湯三日  
 量華一貼不病一合

荻野台州曰疫後健忘者宜安神益志湯

放內傷積不消脹滿攻刺腹脇及婦人血氣刺痛  
 定胡索、良姜、縮砂、茴香、桂枝、牡蛎、甘草七味  
 以方世上二八湯囊ノ主藥トスル氏吐水甚キ者ハ効  
 十三痛甚者ヲ主トス及胃ニ用工九ニ天腹痛ヲ目的ト  
 六下之又婦人血氣刺痛ハ海囊ヨリ及テ効中  
 阿膠散直訣治小兒肺虛氣粗喘促  
 阿膠、馬兜鈴、牛蒡、杏仁、甘草、綿糸  
 右六味一名補肺散  
 以方ハ勞嗽ニテ諸藥効ナク声啞咽痛ハ咽喉不利スル  
 者ニ宜ニ麦門冬湯ト伯仲ニ大潤肺ノ効ハ勝リトス  
 安神益志湯者世治傷寒虛煩心驚微熱四肢無力體倦者又  
 治六七日別無刑剋証候昏沉不知人事ハ脈俱靜者  
 柴胡、人參、麦門、知母、竹茹、五味子、茯苓、芍  
 藥、地黃、黃連、遠志、甘草、七十二味  
 以方ハ傷寒ノ壞症ニメニ經正而ノ諸藥効ナク又溫疫  
 論杯ノ方天應ヤハ勞疫ニ天非ハ白合ニ天非ハ餘燕花

再ト大餅セシニ脈俱靜ニノ精神振ハサル者ニ驗アリ  
安神養血湯溫疫論治勞後熱甚虛甚

地黃、芍藥、炙甘草、黃芩、梔子、橘皮、枳實、遠志、酸棗

龍眼肉七九味

此方ハ勞後ハ虛熱ヲ解ス大抵ハ小柴胡湯姜門冬湯ノ

類ニシテ此ハ虚熱去リ甘ル者ハ此方ヲ用ユベシ

安肝湯要麻昌益簡此小兒腹膨脹青筋出肌膚甲錯或喜噎

有蟲候者

使居子、檳榔、大腹、蓮肉、楊梅、蜀椒、苦參、附

子、木香、硫黃、七九味

此方ハ小兒腹滿青筋ノ症瀉陽錯雜虛寒混清シテ世医

脾疳杯ノ方ヲ施シ死セバ愈ニ如何ト云シカタキ者以

方ヲ用テ意外ニ効ヲ奏ス心得テ試メバ



病癱瘓肩髃骨間腕如屈五指者不治又  
握掌者不治肩者不治腕而不握者治

即大菜胡湯方中加芒硝

菜胡龍骨牡蛎湯曰上崇菜胡湯症而胸腹有動心悶

半夏、大棗、柴胡、生薑、人參、龍骨、鉅丹、牡蛎

桂枝、茯苓、大黃

石十一味或去大黃鉛丹加芍藥釣藤羚羊甘草

以方ハ肝膽ノ鬱熱ヲ鎮墜スルノ主薬トス故ニ傷寒ノ胸滿煩驚ノミナラズ凡ソ驚病大人ノ顙病ニ用ユ又中

風ノ一種ニ熱癰瘡ト稱スル者アリ其方ヨク應スルナ  
リ一通リ病症ニ煩驚ナク四肢掣從心志不安者ハ方

婦人受故情寒此熱頭痛腸運下支結噎吐患  
心支體酸軟或產後痺痛等患對人或類之症仲  
者俗謂之血道宜方或兼服此心湯是也

柴桂湯

後ノ如裁ヲ用ニシ又鉄砂ヲ加テ婦人ノ發狂ヲ治ス  
此方傷寒ニテハ左ニテハ雜病ニ至テハ柴胡姜桂  
湯ト紛レヤスニ伺レハ動悸ヲ至トスルハナリ蓋姜桂  
ハ虛候ニ取リ此方ハ實候ニ取テ施スニシ

即小柴胡湯桂枝湯合方此方加由香同寒症

此方ハ世に透風藥ノ套方トスル氏左ニテアテ結胸ノ類  
症ニハ心下支結ヲ目的トスル藥ナリ但表症ノ餘感了  
ル故ニ桂枝ヲ用ル也至道ニハ寒病腹痛ニ用テアリ即  
今所謂痛氣グルヒト者ナリ又腸癰生ヤレドハ腹部ニ  
面ニ拘急ニ肋下ニ強ク牽シメ其熱收傷寒ニ似テ非ナ  
ル者此方ニ宜シ又世に此方ヲ用ル場合ハ傷寒蘊寧  
ノ柴葛解肌湯當レリトス即小柴胡湯ニ葛根芍藥ヲ加  
ル者也又此方ニ大黃ヲ加テ婦人心中支結メ經閉スル  
者ニ用ニ與道逸法眼ノ經驗ナリ

柴桂姜湯





脫血過多心神恍惚腦暈不寐煩熱驚悸  
見字勝者宜其方合宜為最  
東洞先生治三病人皆不醒如死狀及五  
六日者用此方速有効可謂圓機活法矣  
說藥微

水氣ト持病ノ積聚ト合メ心下一數ル者アリ此方亦ニ  
茯苓ヲ加テ宜シ又此方ハ症ニメ左脇下ヨリ甘シコシ  
緩メカクヤ者或ハ瀉飲ハ症ニ吳茱萸茯苓ヲ加テ用ユ  
又婦人積聚水飲ヲ兼時ニ衝逆肩背脹急スル者ニ驅アリ  
柴胡去半夏加桂薑湯全通小柴胡症ノ渴ハ不喝者

即小柴胡湯方中去半夏加桂薑根

此方ハ癰痰痰渴ヲ治スル代傷寒論ノ加減法ニ據ルハ

本方ハ症ニメ渴スル者ニ廣ク用ユメ又勞瘵ニ此方

ヲ用ル者ハ清涼滋潤ヲ主トスル也又此方ニ荆防連翹

ヲ加テ去加柴胡湯ト名ク小兒諸瘧及痘疹餘毒ニ應用

スルナリ

酸棗仁湯曰ニ治煩躁不得眠者

酸棗仁、甘草、知母、茯苓、川芎 若五味子金魚川

芎有人參桂枝生薑石燕治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠

此方ハ心氣ヲ和潤メ安眠セシムルハ第ナリ同ニ不得

眠ニ三策アリ若心下肝膽ハ部方ニ當ナリ停飲アリ之



治產後血熱、頭眩、目赤、口乾、咽乾、心煩、寒者、又治血虛、夏月、手足心煩、熱、難、地、夜間、尤甚、不能眠者、又治諸血後、身熱、煩、熱、倦、急、牛、掌、足、下、熱、更、甚、唇、舌、乾、燥、者、是、也、  
 一、婦、產、後、煩、熱、之、症、頭、痛、似、此、如、飲、食、進、之、不、日、在、虛、羸、人、之、身、旁、勞、ト、シ、解、之、者、余、與、之、以、方、之、以、服、之、四、五、日、煩、熱、大、減、頭、痛、失、之、ル、カ、如、シ、時、延、醫、再、下、リ、腰、痛、折、ハ、カ、如、シ、其、胡、湯、合、四、物、湯、ヲ、與、一、度、用、霜、ヲ、兼、用、シ、之、至、ク、女、シ、稿、  
 產、後、及、其、他、血、熱、之、症、皮、大、丸、ヲ、製、而、生、人、多、者、神、效、乾、地、黃、湯、三、物、黃、芩、湯、加、減、通、散、蜀、膝、湯、柴、胡、湯、

三、物、黃、芩、湯、同、上、治、產、後、四、肢、苦、煩、熱、者

力、為、二、動、悸、ノ、脈、ヲ、得、サ、ル、ハ、溫、膽、湯、ノ、症、ナ、リ、若、胃、中、虛、  
 三、客、氣、腸、ニ、動、メ、脈、正、ヲ、得、サ、ル、者、ハ、甘、草、浮、心、湯、ノ、症、ナ、  
 一、若、血、氣、虛、燥、心、火、元、リ、テ、眠、ヲ、得、サ、ル、者、ハ、方、ノ、主、ナ、  
 一、尚、生、ノ、歸、脾、湯、ハ、方、ニ、胎、胎、之、ル、也、又、今、金、酸、寒、人、湯、  
 石、姜、ヲ、伍、ス、ル、者、ハ、方、ノ、症、ニ、ナ、餘、熱、ア、ル、者、ニ、用、工、バ、  
 三、物、黃、芩、湯、同、上、  
 黃、芩、苦、參、地、黃、  
 三、味、今、金、用、生、地、黃、名、苦、參、湯、療、天、行、熱、病、五、六、日、以、上、  
 以、方、ハ、薦、勞、ノ、ミ、ニ、限、ラ、ズ、婦、人、血、症、ハ、頭、痛、ニ、効、ナ、リ、  
 又、乾、血、勞、ニ、天、用、工、何、レ、モ、頭、痛、煩、熱、力、目、的、ナ、リ、其、症、俗、  
 二、痛、勞、ト、稱、メ、女、子、十、七、八、ノ、時、多、患、フ、必、以、方、ヲ、用、工、ハ、  
 一、一、花、匠、ノ、傳、ニ、年、掌、煩、熱、者、級、ア、ル、者、ヲ、瘀、血、ノ、候、ト、ス、  
 乾、血、勞、以、候、有、テ、他、証、候、ナ、キ、者、ヲ、以、方、ノ、的、治、ト、ス、示、一、  
 徵、ニ、備、フ、ハ、シ、凡、テ、婦、人、血、熱、解、セ、テ、諸、藥、應、セ、ザ、ル、者、ヲ、  
 治、ス、舊、友、展、樓、堂、ハ、長、女、產、後、血、熱、不、解、年、在、頭、痛、甚、ク、始、

本草綱目卷之四 藥部 經方

葛勞狀ヲ具ス余方ヲ處メ漸々愈ヲ得タリ爾後其症發動スル中ハ自ラ調劑メ服之ト云

柴胡飲子日上

柴胡、白朮、枳實、橘皮、生薑、桔梗、枳實、甘草

右八味

以方ハ四通散ノ變方ニシ時ハ肌熱ヲ發シ或瘧狀ノ如

クニ三日苦悶スル者ヲ治ス又脚氣初起傷寒ニ似テ發

熱スル者三刻アリ煎法ハ宋人ノ改正ト見エ從テハ力

ヲ云

柴胡湯今在治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡、芍藥、黃芩、枳實、乾薑、大黃、甘草

草、右八味

以方ハ產後惡露下ラスメ往來寒熱スル者ヲ治ス故ニ

桂苓丸折衝飲ノ類ヲ與ヘ瘀血去ラズ寒熱ヲ發スル者

ヲ治ス若惡露盡テ寒熱不止者ハ小柴胡加枳實湯ニ宜

シ



或人先生治之其証歷節痛劇シク煥熱  
忘語飲食不進久不使必悉シ医錯治効  
ナシ先生千金犀角湯用之遂ラ用ニ三日シ  
テ可驗ヲ寓シリト云

脚氣嘔吐症水氣少ナク若ハ小  
枘湯ヲ用ニ

犀角湯曰上治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角、羚羊、羚羊、羌活、黃芩、枳實、升麻、射干、大黃

香豉、右九味

此方ハ歷節ノ熱毒甚ク一身ニ入リ四肢節々痛腫ノ越

婢湯ヲ續命湯ノ症ニ一一段癩ヲナシタル者ナリ病源

便論ニ熱毒ノ痛風ヲ掣テ陽結ト云即以此症也而皆抹香

屋妻面脚腫痛日聯ヲ煥熱ヲ其痛忍テハカラス

徹夜腫江ス余此方ヲ與テ熱漸減忘一月ニハ痛全安シ

嘗聞華岡青洲ハ痛風熱甚ク為附ノ劑投シ難者ニ屢用

テ高麗芍藥スト云

犀角旋覆花湯曰上治脚氣腫滿或行起澁弱小便必澁喘息

氣衝喉食吐不下

犀角、旋覆花、橘皮、茯苓、生姜、蘇葉、香豉、大

棗、右八味

此方ハ脚氣ノ水氣上胃腹ニ盛ニハ吐氣ヲ發シ或ハ氣  
急喘息スル者ヲ治ス蓋此方ト沉香降氣散胃湯トハ脚

ナ

百三

氣上部ニ盛ニメ、衝攻セシト欲スル者ヲ治スル既至  
腎胃ハ氣急促迫ヲ主トシ、此方ハ水氣吐逆ヲ主トスル  
也

滲濕湯曰、上治脚氣、腰以下冷痺、腫拘、小便難、栗園先生曰、治

微毒、累年不解、又感脚氣者、得効

茯苓、乾姜、蒼朮、甘草、年膝、附子、葶藶

或代

右七味、或加吳茱萸

此方ハ脚氣下部ニ屬ラシメ、腰以下冷痺シ、或ハ兩脚微

腫シ、痿弱ヤントスル者ヲ治ス、大抵ハ桂枝加朮附湯

ニテ治ス、凡虚候毒氣ヲ集ル者ハ此方ニ宜シ

犀角麻黃湯曰、上治風毒脚氣、栗園先生曰、此方能治脚氣腫

脈、數小便赤澀、毒氣死血分聚熱者

犀角、麻黃、黃芩、生薑、石膏、甘草、杏仁、桂枝

、防風、獨活、防己、川芎、蒼朮、羚羊、芍藥

右十五味

此方ハ風毒脚氣ノ主劑ナリ、風毒脚氣ノ候ハ千金及聖

栗園先生脚氣寒熱ヲウケ腫滿其  
心下苦悶短氣呼吸短息衝心  
微汗者、七味手夏湯、用スル  
七味手夏湯方  
桂枝、芍藥、麻黃、生薑、石膏、杏仁、桂枝  
吳茱萸、附子、茯苓、甘草、年膝、附子、葶藶  
右七味、前症ニシテ寒熱ナキハ

以解熱ノ如キ方ヲ用スル



犀角散 治 熱 實 三 屬  
直 指 追 凡 毒 制 散 治 脚 氣  
熱 實 証  
羌 活 枳 枳 附 凡 毒 白 皮  
郁 李 仁 上 莖 黑 豆 石 七 叶

患ニ悉ク見ハタリ温氣外到ヲ挾テ發熱腫痛入ル者以  
方ニ非ヒハ效ナシ若クは症誤治ニ内攻スル者大陷胃湯  
ニ非ヒハ救フヲ能ハス東郭ハ脚氣痿痺ノ症千金附子  
湯ナトヲ用ルニ胸中一物アリカ如胸肋膨脹メ却テ快  
カラザル者越婢湯ニ木瓜枳櫚ヲ加テ用ヒ又其甚キ者  
三黃湯千金治中風手足拘急面節疼痛煩熱心乱惡寒經日  
不欲飲食

麻黃 獨活 細辛 黃芩 黃芩

右五味心熱如大黃腹滿加枳實

柴胡 柴胡 枳實 芍藥 蒼朮 蠶甲

柴胡 枳實 芍藥 蒼朮 蠶甲 枳櫚 甘草 石七味

以方ハ集驗一方トアリテ方名ナシ治症錄田碩庵以名

ヲ冒メ喘息ハ痰癖ヨリ来ル者ニ屢效ヲ得タリ其方ハ

四逆散ニ蠶甲枳櫚木ヲ加ル者ニメ痰癖ハ腹痛ヲ治ス

ルカ至ナリ楊氏ノ解勞散ハ以方ノ一考輕キ者ナリ二

吐血衄血吐血等症  
 文庫秘傳  
 効下ハカニ思  
 八八

方共勞立ノ胸脇ニ力、リ寒熱往來ノ咳嗽アリ者ニ用  
 方大小柴胡ヨリハ又ニ効アリ此方又瘧母ヲ治ス是ニ  
 三治セサル者ハ柴胡加芒硝湯ナリ  
 柴胡厚朴湯日上脘心腹脹滿

柴胡、厚朴、茯苓、梔子、蘇葉、檀榔、生姜、七味  
 以方ハ柴胡湯ノ位ニ在リ脹滿スル者ヲ治ス若実スル  
 者ハ大柴胡加蟅甲湯ヲ用エシ若虚氣ノ脹滿ナレハ厚

朴生姜甘草半夏人參湯ニ宜シ  
 犀角地黄湯今金瘡傷寒及温病應發汗而不發之内蔵有蓄  
 血者及鼻衄吐血不盡瘀血面黄大便黑者共主消化瘀血

犀角、地黃、芍藥、牡丹、右四味  
 以方ハ内瘀血有テ吐血衄血スル者ヲ治ス傷寒ノ三ナ  
 ラス諸病ニ運用スバシ芍藥地黃ノ位スル者ハ四物ノ

意ニテ血ヲ和スル爲也此方ノ症ニハ不大便ノ者ハ方  
 後ノ加味ヲ用エハシ又兎科方要ニ黃連解毒湯ヲ合テ  
 用走馬牙疳齒衄湯ニ効アリ若畜血ニ因テ吐血衄血甚



者桃核承氣湯ニ非レハ効ナシ此方ハ後ニ等ニ處スバ

シ

柴胡散聖惠熱病後虛勞煩熱四肢痛痠小便赤黃不欲食

柴胡・枳實・黃連・黃芩・芍藥・甘草・知母・枳

實・甘草・芍藥・枳實・黃連・黃芩・芍藥・甘草・知母・枳

此方ハ太柴胡湯ノ變局ニナセノ所謂風勞ナル者ニ用

二胃蒸ノ初起ニハ効アリ虛スル者ハ秦艽扶羸湯ニ宜

三

三脫湯傷家秘寶治三焦氣逆解大便秘滯下胸脇滿脹

大腹・蘇葉・獨活・沉香・木瓜・川芎・蒼朮・木香

甘草・檳榔・橘皮・石十一味

此方ハ氣ノ壅滯ヲ疎利スル力主意ニテ畢竟腹氣ノ壅

滯スルヨリ色々ノ症ヲ生シ或ハ大便秘結小便不利或

ハ腹ハリ或ハ腰疼ニ或ハ背疼ニ生シ或ハ面腫手

足腫シ或腹中痞塊ヲ生シ種種ノ患ヲナスヲ治ス急ク

ハ局方三和散ノ主治ヲ讀ミ知ルハシ穀方規矩云筋

廿

百廿

或人外感風寒熱解之咳喘盜汗出煩燥狀真  
 二傷氣脈細數之至之方以投之此方ヲスル  
 散ヲ兼用ス意外効ヲ奏ス或人年十外感後寒熱  
 久シ解之咳喘白沫ヲ吐シ氣弱高熱脈數盜  
 汗出ツ余其方ヲ變更連ヲ與ヘハ味生事丹  
 ヲ兼用ス數日ニ病全愈ト稱

急スル者ハ氣喘也此方ニ宜シ示肺脹内ニ砂指ノ如キ  
 毛ノアリ之ヲ按メ異々トメ轉動スル者此方ヲ用ル要  
 訣也ト示一徵トナスハシ又此症ニハ虛寒ニ屬スル者  
 ハ補腎湯ニ宜シ

柴胡、蟹甲、湯重治傷寒潮熱不解或時作寒如瘧狀

柴胡、蟹甲、茯苓、黃芩、知母、桑白、甘草

七味或加胡黃連

此方ハ少陽ノ壞症ニハ潮熱或ハ瘧狀ノ如キ熱ヲ奏シ

連綿解セサル者ニ宜シ世匠ハ小柴胡加蟹甲ヲ用レハ

此方ヲ是トス若熱氣固着スル者ハ樓寢ニ從テ胡黃連

ヲ加ベシ

柴胡四物湯保命治日久虛勞微有寒熱

即小柴胡湯四物湯合方一名三氣湯

此方ハ小柴胡湯ノ症ニハ血虛ヲ帶ル者ニ宜シ保命集

ニハ虛勞寒熱ヲ主トスレハ廣ク治用スベシ此方ハ小柴

胡加地黃湯ニ似スレハ血燥ヲ兼ル者ニ驗アリ



三子養親湯 治傷風 咳嗽 氣喘 胸滿 嘔吐 泄瀉 霍亂 吐瀉 肚痛 嘔吐 泄瀉 霍亂 吐瀉 肚痛 嘔吐 泄瀉 霍亂 吐瀉 肚痛

三子養親湯皆効治凡人年老形衰苦疾氣喘咳嗽胸滿  
 蘇子白芥子蘿蔔子 右三味有熱者宜小治胸滿  
 此方八老衰或八虛方八人痰喘胃滿八浮腫八心者二効  
 アリ一老婦痰喘ヨリ追々上部水氣ヲ聚ミ氣急促迫  
 此者此方ニ琥珀末一味ヲ點服ノ即驗アリ

茅荳湯得効治傷風傷暑瘧

即小茅胡湯五苓散合方本有麦門地骨皮今去之

此方八小茅胡湯ノ症ニ煩渴下利スル者ヲ治ス暑疫

二八別効アリ

左至龍料丹後治肝藏火寒左脇作痛

黃連 吳茱萸 右二味

此方ハ丹溪ノ工夫ニ左脇痛ヲ主トス或ハ症ニ依リ

沉香降氣湯ニ合ニ或ハ參連湯ニ合メ用ユベシ

犀角湯 通絡治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠腫

犀角 茵陳 茯苓 地黃 麦門 枳子 竹葉 生薑

右八味

廿

白三

此方ハ傷寒大勢解スル後心胞絡ニ餘熱蓄在ノ心煩驚悸ナドアリ小便赤濁或ハ微吐嗽スル者ヲ治ス其他雜病ニ運用スルニ焦寛雜詔ニ治驗アリ塾讀ニハ三黃石羔湯ニ書治湯毒發斑主治詳テ雜病翼方、即黃連解毒湯方中加石膏麻黃香豉或以知母代香豉、此方ハ湯毒發斑ヲ治スルカ至ナル氏麻疹熱毒甚ク發シ兼ル者ニ宜シ又丹毒ニ用ユシ  
柴胡枳椇湯蘊要治小結胸脉厥微口苦心下硬痛或胸中滿硬或脇下滿硬或發熱或日晡潮熱或往來寒熱耳聾目眩、即小柴胡湯方中去人參大棗加枳實栝樓枳實仁、此方ハ結胸ノ類症ニハ胸脇痛ニ咳嗽短氣寒熱アル者ヲ治ス此類ニ三方アリ胸中ヨリ心下ニ至ルヲ結痛スル者ヲ柴陷湯トス胸中滿大痛或ハ肺癰ヲ膿サントスル者ヲ此方トス又兩脇ヲ刺痛ノ咳嗽甚ク者ヲ柴枳半夏湯トス世區ハ瓜蒌枳實湯ヲ擬用スル以テ三方ヲ辨別スルニ如ハナシ



紫葛解肌湯同上治脉弦長少陽湯明合病而熱者

・即小紫胡湯方中加葛根芍藥桑寄生曰家方紫葛解肌湯証而汗出煩渴脉弦長者宜此湯

辨前ノ紫胡桂枝湯ノ條ニ見ユ又家方紫葛解肌湯ノ症

ニメ汗出煩渴セズ脉弦長ナル者ニ解通當スルナリ

紫胡解肌湯上傳若少陽合明合病脇痛吐逆自利脉弦長而

況実表證ニリ

・即小紫胡湯並連解毒湯合方

此方ハ傷寒ノミナラズ凡テ胸中ニ蘊熱アリテ咽喉

瘡腫糜爛ヲ生シ或ハ目赤頭瘡或ハ諸瘡内攻吐熱煩悶

スル者ヲ治ス古人ノ言通り諸瘡瘍ハ肝膽經ヲ子ロフ

テ紫胡ヲ用ルカ定席ナリ其内熱毒甚キ者ハ黃連解毒

ヲ合スヘシ黃連能濕熱ヲ解スルハ也

紫胡疎肝湯經旨治左脇痛爲肝經受邪

・即四逆散方中加蒺藜川芎青皮臣通有梔子煨姜名紫胡

疎肝散治脇痛血莖於上

本草綱目卷之五  
木部  
三  
黃  
山  
藥  
生  
三  
黃  
山  
藥  
生  
三  
黃  
山  
藥  
生

此方ハ四逆散加味ニハ脇痛ノミニ限ラズ四逆散ノ症  
ニハ肝氣胸脇ニ鬱塞シ痛ヲ覺ス或ハ衝逆シラ頭痛肩  
背屈急スル者ヲ老ニ逕通ノ方ハ瘀血マリラ痛ヲ爲ス  
者ニ宜シ

柴胡疏肝散者世治肝經怒火風熱傳脾唇腫裂或兩唇

、柴胡、黃芩、地黃、黃連、芍藥、牡丹、旋子、川芎

、升麻、甘草、右十味按明臣雜著治產後頭痛亦效

此方ハ口舌唇ノ病ニ効アリ柴胡黃芩ハ肝膽ノ子ラケ

トシ升麻黃連ハ陽明胃經ノ熱ヲサマシ地黃芍藥牡丹

皮ハ牙齦ヨリ唇吻ノ肉ノ血熱ヲ清解シ瘀血ヲ消散シ

ト云後世割普請ノ方ナラハ畢竟スル處清熱和血ノ劑

ニメ上部ニ在効アル者ト知ルベシ

柴胡養榮湯溫疫論治表有餘熱血燥

、柴胡、黃芩、梔子、甘草、芍藥、當歸、芍藥、地黃、紅母

、天花粉、生薑、大棗、右十一味

此方ハ後ノ清燥湯ト伯仲ニメ下後胃中ノ津液乏クナ



リテ熱未タ除カ不動ニエハ再ニ胃ニ臨ニトス  
勢アル者カ清燦湯ナリ下後血液枯燦ノ餘熱ニカ爲ニ  
去ル能ハサル者カ下方ナリ傷寒大勢解後往々以場合  
アリ下後ニ拘ハルハカラヌ

柴胡清燦湯同上後兩腹緩割

、柴胡、黃芩、枳實、甘草、知母、天花粉、生薑、大  
棗、右八味

犀角湯張漢退病鎮心神

、犀角、茯苓、麥門、人參、甘草、黃芩、地黃、芍藥

、下方ハ小兒驚病ニ用ル藥ナレハ大人肝虛内熱ノ症或

熱病後心神不安者ニ効アリ匡綱ノ犀角湯ノ症ヨリハ

熱氣一等輕キ者ト知ルハシ

犀角大黃湯 治剛症壯熱頭痛筋脉不能舒展

、犀角、大黃、川芎、石膏、牛黃、竹葉、白二味

、下方ハ剛症壯熱ヲ治スル藥ナレハ中風初起熱甚ク全  
暈續命湯ヲ與テ應ヤサル者下方ニテ一下ニル片ハ病

三味湯本朝經 鹽老傷寒金匡事說約云傷食腹痛吞酸不吐不

浮揮霍撩亂急以三味搗湯取吐之浮後煎湯可也

●藿香、益智、木香、右三味搗服一名神祖袖葉又益智飲

上益智飲一條二見工

三靈湯曰上治蟲積嘔吐者提耳謐云治大人小兒蛇蟲癰積

泄浮嘔吐腹痛及禁口痢霍亂上吐下泄凡諸病脈弱不食

胸滿氣逆嘔吐惡心危急者

蕩草、紅茛、檳榔、七三味或合小羊黃、橘或沈香降氣湯。

以方八虻蟲ノ吐ヲ主トスル藁十ニ氏諸吐ニ權用

大下三婦人血症ハ嘔吐ニ尤効アリ又往年柳倉城主柁

予周防炭脚氣衝心嘔吐甚久諸藥口ニ納ルヲ能ハス余

次方ヲ與テ氣始テ止ニ衝逆隨テ服ル後他症ヲ發メ

源  
二  
不起  
惜  
り  
バ  
シ

三黃知母湯 同上 治齒痛

●即三黃湯方中加知母石膏甘草一方加薄荷治衄血甚妙



本草綱目卷之九  
雜考  
本草綱目卷之九  
雜考

無花以根代之竹田錄預於本方去知母加紅花甘草名尚  
足飲治舌瘡腐爛及一切齒痛  
此方ハ上部熱甚齒痛或齒衄之者治之若齒齦或ハ  
斷痺牙疳ノ類ニテ痛甚者桃核承氣湯ニ非シハ効ナシ  
蓋此方ト葛亨連湯ニ紅花石羔ヲ加テ口瘡ヲ治スルト  
ハ古方者流ノ工夫ニ出テ面白キ經驗ナリ又此方ノ知  
母ヲ去来砂ヲ加テ心氣不足種々ノ痛症ヲ奏スル者ヲ  
治ス又世ニ用ル三黃加芒硝湯ハ古今錄驗ニ方名ナリ  
骨熱身ニ瘡多ク瘰癧湯腫ル者ヲ療スト云但シ四味  
蜜丸ナリ

茅陷湯日工

即ハ茅胡湯ハ陷胸湯合方上焦熱盛痰咳者加介第  
此方ハ匡方口訣第八條ニ云通リ誤下ノ後邪氣虛ニ乘  
シテ心下ニ聚リ其邪ノ心下ニ聚ルニツケテ胸中ノ熱  
邪カイヨイヨ心下ノ水ト併結スル者ヲ治ス此症一尋  
重キカ大陷胸湯ナリ氏此方ニテ大抵防ケル也又馬脾

感冒右耳聾二用

風、初起ニ糸絛ヲ加、用其他疾咳、胸痛ニ運用ス、

柴芍六君子湯、同上治四逆散証而兼胃虛者

、即六君子湯方中加柴胡芍藥

、此方ハ四君子ノ口訣ニ在通リ脾氣虛加芍藥ト云意ニ

テ脾氣病ハ腹筋拘急ノ痛ニ又胸脇ハ引付ル形アル故

ニ柴芍ト仕スル也畢竟ハ四逆散ノ症ニハ脾胃一層虛

候アリ後世所謂肝実脾虛ト云處ニ用スベシ

柴蘇飲、同上治傷寒後耳聾

、即小柴胡湯舍蘇散合方

、此方ハ小柴胡ノ証ニハ鬱滯ヲ兼ル者ニ用ス耳聾ヲ治

スルニテ方陽ノ餘邪鬱滯シテ解セザルカ故ナリ其他邪

氣表裏ノ間ニ鬱滯スル者ニ亦用スベシ

刪繁淨府湯、難治咽家熱、心腹脹痛者

、柴胡、黃芩、半夏、茯苓、山查子、薤白、澤浮、甘

草、右八味或加蘇子、夏



人虽鐵樹(良)是忽患之者也醫論  
如田氏批葉ヲ摺リ水又トロリトミテ飲フハ服  
乾虫ヲ下ス者ナリト云フ

此方ハ托植彰常ノ傷ニテ簡便ニ用安シ若癰腫甚ク  
腹滿塊アル者ハ矢張亦方ヲ與フヘシ此方ノ用ニ熱ハ夜間ニ

三味鷓鴣菜湯撰要方凶下蛔蟲  
鷓鴣菜、大黃、甘草 右三味養毒院方云甘草加蒲黃

苦棟皮為四味治小兒毒頭瘡蟲癢腹痛者

此方ハ驅虫ノ主劑ナリ鷓鴣菜ノ方經セマシ氏此方ト

ニ味鷓鴣菜湯ニラ大抵事足シリト云若鷓鴣菜ノ不應

者ハ鶴蟲ヲ與フベシ寸白虫ニハ二方共効ナシ梅肉丸

ヲ用ニシ

紫梗半夏湯是學入門治發熱咳嗽胸滿而脇刺痛者以邪熱

挾痰攻注也

紫胡、桔梗、半夏、黃芩、枳實、青皮、枳實仁、杏

仁、甘草、大棗、生姜 右十一味

此方ハ蘊要ノ紫胡枳桔湯ニ青皮杏人ヲ加ル者ナリ枳

桔湯ノ症ニ咳嗽甚者ニ用エ

紫胡三白湯家方

二事紫葛解肌湯紫芍芍甘  
正信葛石蜜薑百味

男子或夜卒然咽唯絞窒息スルヲ得ル手足  
微冷白汗出頃刻甚シ急ニ定ニテ予ヲ刺シ  
診セシム曰急喉痺ナリ勿ニ却ムハカクニ枯梗  
白散ヲ制長シ白湯ニシトキ嚥入ス須臾ニシテ吐瀉ヲ發シ息氣方安因ニ此方ヲ與テ全愈稿

即小紫胡湯方中加白朮茯苓芍藥  
此方ハ紫胡三白湯ノ症ニメ熱熱一等甚キ者ヲ治ス又

暑痢吐瀉腹痛不止者ヲ治ス

紫葛解肌湯口ニ冷大湯少湯合病頭痛鼻乾口渴不眠四肢

煩疼脈洪數者

紫胡葛根甘草黃芩芍藥麻黃桂枝半夏

石焦生薑七十一味此方家君濟庵翁所製此之故六

書紫葛解肌湯尤効

此方ハ全家ノ新定ニメ麻黃葛根ニ湯ノ症未分解セバ

既ニ少湯ニ進ニ吐瀉甚ク四肢煩疼スル者ニ宜シ局方

神湯ニ書ノ紫葛解肌湯ヨリハ其効優ナリトス

紫胡杏仁湯

大紫胡湯方中加大紫大黃加橘皮五味子杏仁

幾部

桔梗湯傷寒

桔梗甘草杏仁一味加生薑大棗名排膿湯加薤白散治





百日咳三又五至七聲が鼻から用エ  
法田家小兒百口録に方が録に身用  
小兒乳及百日嗽方加半夏極有神道  
腹症事用第九南宮丸又三四方回治咳逆呃  
嘔胃中塵吟每一歲至八九聲相連收氣不  
回至於驚風人屋中坐  
一賈人七十餘歲吃逆ラ連ルヲ三子日ロコウ  
飲モ通ス諸匠治スルヲ治セルト十七八  
日東洞先生往診ス三咽喉ノ肉脱シテ吃  
ニノ声ニ出ルヲ不々唯腹中ニ聲アリタル  
カリナリ乃決方一貼重サ十二錢ニ作テ  
與ヘラルニ劑シテ効ヲ奏ス方便也  
栗園先生決テ了香職道ニ用ミナリ

法正家小史

小兒喂乳及百日數次方加半夏極有效隨

腹症兼用紫雪膏又三因方曰治噎逆

紫胃中虛冷每一歲至八九聲相連收氣又

一頁人二十餘歲乞差

一、賈人子貢處四遠，是之謂子貢。口三

日東同先生主多不三烟候均荒示乞

今ノ書已ニ出ル一尺ニ唯集中ニ載ル

カリナリ乃決方一貼重サナニ錢ニ付テ

與へラレニ割ニシテ効ヲ奏ス 古方候覽

栗園先生改加丁香噉送用

1

一病人腫滿三ノ小候不利心下堅滿之東

洞先生乃以方二三黃卷ヲ兼用ヤシメ

ヲ全類ヲ得之シ在方

橘皮 枳實 生薑 各三味

メ一ハ辛用ヲ用ヒ一ハ淡滲ヲ用ユ匠者機ニ臨テ宜ヲ

酌ニアリ壺ニ冒瘴ノミナラス萬病皆然

治胎中瘕噎逆者

橘皮、竹茹、大棗、生薑、甘草、人參、白朮、

此方以橋皮ノ下氣ヲ主トシ竹茹ノ潤降ヲ兼ヌ故ニ氣

弟 職ヲ榮スル者ノ主トス又甘草ヲ多入カ手段ナリ若

少量ナニハ効ナシ傷寒痢病ナトノ脱陽ノ穢スル者ニ

ハ効ナシ難病ノ歳ナレハ月存ノ者ト雖モ効アリ若蜀

飲上並  
引載  
入者  
易  
在  
井  
夏  
字  
易  
合  
一  
三  
久  
秀  
二  
完

吳萊黃腸ノ

天恩美君用草服入

大易同之 名曰下

卷之二十一

右二味并漢烏丸老痞積消食降胃

方心下堅塊アリテ水飲ヲ嚥ス者ヲ三トス帝ノ種ノ



壯強頭顱胎動冲心腹痛引腰肢或覺胎不安  
縮收或下血不止者可用此方胎不煩者即更若  
胎煩者即產又治腸痛下血綿綿不止身腫痛  
黃起則胎重又受方少腹刺痛者若胸中  
煩悸心氣痛甚大便燥結者亦用黃連解之  
湯悸心陽及陽

有為婦人每第脫胎者有方三四月方以方  
持重之始說之至八月子育八九者ナリト云フ  
尾重曰有每產不有者宜決方

外臺秘要三乾水黃 田 乾姜 二由 二味  
末ハナニ酒ニシテ服シ妊妊胎漏ニ入又地黃  
一由ニ示用一三服ニニスシテ其ニ

若飲食湯後心胸猶不爽快或噎氣吞酸者  
又治痰飲氣心下或胸邊有塊者每飲食作

類ニ非エノ之ヲ按セハ輒セトノ声アルモ也若挫  
難者甘遂羊夏湯ヲ交用エバニ回春ノ分消湯實脾飲ハ  
皆以方ニ示方也再漢ハ以方ヲ九トメ痞積ヲ治シ食ヲ  
消之即健脾去濕利水ノ効アレハナリ

芎歸膠艾湯 日上海漏下腹中痛及吐血下血者東洞翁曰治諸無症者不別男女

芎歸 阿膠 甘草 艾葉 當歸 芍藥 地黃 七七味

以方ハ止血ノ主藥トニ故ニ漏下胞阻ニ用ルノミナラ

人千金外臺ニハ妊娠失作傷產及打撲傷損諸失血ニ用

二千金至ノ芎歸湯局方ノ四物湯皆以方ヲ祖トスレ氏阿

膠ノ滋血芥葉ノ調經加之ニ甘草ノ和中ヲ以テメ其効

妙トニ是以先輩ハ四物湯ハ救災而不靈ト云ナリ又痔

瘻及一切下血以方ヲ與テ血止ノ後血氣大虛ニ面色青

慘如土心下悸ニ或耳鳴者ニ因加味四君子湯ニ宜シ蓋

以方ハ血ヲ主トシ彼ハ氣ヲ主トス彼以各其宜ナ處ヲ

凡ナリ

橘皮大黃亦硝湯 日上海有宿滯不化吐復不出速下除之

白十二

產或吐或瀉或嘔或噤大便難者合桂枝加芍藥湯可佳

有持氏云此方乃臨產催生之方多々用之止  
臨產經日不出名難產或湯加雲  
母餅有功用雲母一味亦功東野云  
多桂枝先生六月信痛之桃能承氣湯  
加附子方用之

惠義寧固曰此方銀治肺癰  
萌者雖證候未具口有腥臭者  
尤効敗將而或代其方

橘皮、大黃、朴硝、右三味  
此方ハ魚毒ヲ解スルノ主劑トシ橘皮ノ魚毒ヲ解スル  
下後世方書未々著シサレ氏今橘皮一味ヲ黑燒ニシ骨  
硬ニ用ル内ハ即効アリ古方ノ鱗胸中ニ在リ治スル宜  
也ト之有持桂里曰此方ハ鱗ノ毒ヲ解スルノミナラ  
ズ諸獸魚肉ノ毒ヲ治スハシ  
飯湯子産治者血多因致眩冒困悶者胎前產後危急狼狽  
出先導証  
川芎、芍藥、右二味合甘草乾姜湯治兒枕痛及月信痛  
此方ハ單味ニシ血ノ効捷ナリトス甘草乾姜湯ヲ合  
メ用レハ兒枕痛血氣刺痛ニ即効アリ其他血分ノ症ニ  
治用スベシ後世ノ補血湯ハ此方ノ一等虛ニル處ニ用  
出十味  
桂枝湯外薑療肺癰經時不差  
桂枝、木香、大黃、甘草、敗醬、薤白、桑白、芍藥  
右八味



婦人暑病者一不解毒氣而  
 脉微細手足微冷此陰虛也  
 少許之藥ハミ至五粒下之  
 二三日元氣稍復ハ人良少  
 一日黑血下之過多ハ二粒  
 抵之精神恍惚此危篤之至  
 蓋上湯ハ此二倍下之無三  
 后十補湯ニ用此稿

此方ハ肺癰ノ症葦莖湯栝樓湯等ヲ與テ臭膿減マズ日  
 ヲ経テ血氣衰弱スル者ヲ治ス又婦人帶下ニテ肺癰狀  
 ヲ見ス者ニ運用スベシ

既清湯易簡治下利發熱者  
 即竹葉石膏湯方中去石膏加肉子潮源集小柴胡湯方中

去半夏加竹葉麥門閉子色既清湯

救苦ハ傷寒上熱下冷ノ症ヲ主トス外臺文仲ノ方ニ竹

葉石膏湯ヲ竹葉湯ト名ケ天行表裏煩不可攻者ヲ療ス

トアリ此症虛寒ノ候アルハ此方ニ非レハ効ナシ既清

水清ノ旨能合照メ用エベシ

葦莖國料楊氏治風熱癰盛頭昏目赤大便難艱

川芎、大黃 右二味或合葛根湯或苓桂朮甘湯

此方ハ楊氏家藏方ノ主治ヲ至的トス但風熱壅盛ノ肩

背強急スル者ハ葛根湯ニ合シ心下支飲アリテ頭昏目

赤スル者ハ苓桂朮甘湯ニ合スレハ別メ効アリ又頭瘡

耳鳴等ニ兼用スベシ

男子家計ニ勞思ニ時ニ腸胃頭中大寒  
ニ在ニ鳴動ニ記法導建忘ニラ  
ルニ小腹兩脚カク中腹動悸アリ飲食  
不進不覺腹中熱下冷ニ此方ヲ方  
與、涼ニ味ハ黄芩、銀絲、煨ヲ以テニ數回ニ  
全治ニ

外台龍仁月湯加味歸脾湯止ニ湯  
榮臺化傷陽此方ヲ并別ニ用ニ

...

...

...

歸脾湯治思慮過制勞傷心神脾健忘怔忡

方級、白朮、茯苓、黃芪、龍眼肉、酸棗、遠志、人

參、木香、甘草、古十味加柴胡、施子、名加味、故脾湯

以方ハ明臣難者ニ據テ遠志、當歸ヲ加、用テ健忘ノ外

思慮過度ノ心脾二藏ヲ傷リ血ヲ攝スルノナラズ或ハ

吐血衄血或ハ下血等ノ症ヲ治スルナリ此方ニ柴胡、山

梔子ヲ加ハタルハ内科摘要ノ方ナリ前症ニ虛損ヲ換

或ハ肝火ヲ帶ル者ニ用ニ大凡補劑ヲ用ニ氏ハ小便通

利ナキ者多シ此方ニ補劑ニノ且利水ノ品ヲ伍セサ

レ氏方中ノ木香氣ヲ下シ胸ヲ開ク故ヨク小便ヲ通

利セシム主治ニ大便不調ヲ云ハ能ハ小便ヲ利スルヲ以

大便自止ノ理ナリ

歸脾湯治風症昏迷吐沫抽搐脊膺直產後症通用

方級、前外、右ニ味酒水煎

此方直指ニ風症トアレ氏產後ノ症病ニ格別効アリ全

門ニラハ豆淋酒ニニ煎煮ス



或人年十六咽下小塊ナリ時々痛シ幾  
 年愈エス遂或ハ喉ナシ成氣腫トシ先  
 生診曰其塊柔軟ニシテ筋脉ニ固着ナ  
 形ナク又齒齦ニ通シテ頑固腫ニ脹マ  
 勢ナシ恐ラクハ痰液ノ湊會ニ出ル俗ニ  
 所謂痰核是ナリ乃二陳湯加皂角刺  
 ナルハ五倍子朴硝大黃天南星四味研末  
 醋ニ調シ核上ニ貼ス數旬ニシテ核全消

枳縮二陳湯曰春治遊在心脇上攻走腰背吐噦大痛

枳實、縮砂、半夏、橘皮、茯苓、莎草、厚朴、茴香

木香、甘草、延胡索、乾姜 七十味丹法二陳

湯加枳實縮砂名枳縮二陳湯云順氣寬中消痰飲

以方ハ淡飲ニニ胃背走痛スル者ヲ治ス先輩ノ傳ニ

ニテ背痛スル者ハ今金匱陽ヲ用疾ヨリ来ル者ハ以

方ヲ用ト云

橘皮半夏湯通治感冒解後咳獨不止者

紫胡、蘇子、橘皮、半夏、茯苓、芍藥、桑白、杏仁

桔梗、生薑 七十味

以方ハ桂麻ニテ痰汗後表証ハ解スルハ咳獨リ不止者

ヲ治ス若心下ニ水氣アリテ表不解者ハ小青龍ナリ又

小青龍ヲ與テ心下水氣ハ去ルハ咳嗽止マニ微熱アリ

者以方ニ宜シ

杏酪湯朝鮮傳清俗供客必用云暑月最佳今借治咳嗽

杏仁、麥門、冰糖 五十味

或人脚氣后兩脚廢弱起ツラ得ハ数月露  
効ナリ瘰癧ハ如シ先生シタメ曰血氣枯燥筋脉  
榮ヲ失シ加之濕毒少シク流着ス宜ク其  
毒ヲ發揮シ以テ血氣瀦スヘシト其方ヲ與  
ヘ代毒丸ヲ兼用數旬ニシテ復常橋  
加味四物湯条ヲ參考セヨ

此方ハ本飲料ナレ氏肺痿勞嗽其他咳嗽甚者ニ兼用メ

龜板湯本朝經脈治瘰癧

、龜板、芍藥、川芎、當歸、地黃、石決明

右六味一名瘰癧湯

此方ハ瘰癧血分鬱滯メ振ハザル者ニ用產後ハ瘰癧ニ

別メ効アリ又微毒ノ瘰癧ニ附子ノ効ナキ者ニ用テ宜

強神湯口上冷中風口眼喎斜半身不遂喜欠流涎者

、紅花、姜黃、枳椇葉、甘草、右四味或有桑寄生此方

四逆散附子浮心陽桂枝加朮苓附湯隨証合用世稱搖州

辰野中風藥

此方ハ和州俗傳ニテ中風ノ妙藥トス其類方四五アリ

此方ヲ最トス証ニ依テ四逆散附子浮心陽桂枝加朮苓

附湯ニ合シ用テ其効更ニ捷ナリ

逆挽湯云逐逐一二日微熱泄浮數十行而後帶血裏急後重

、即桂枝人參湯方中加枳實茯苓



東郭子曰此方只咽喉結毒ニナ  
ラズ梅毒ニテ各症癰或各瘰  
癧ニ用ニ下

此方ハ桂枝人參湯ニ枳實茯苓ヲ加ル者ニテ其牛膝ハ  
逆流挽舟ト云譬ニテ下ヘヨリキル力ヲノナキ者ハ一  
應上一スツト引アケラハツミラ付レハ其拍子ニ下ダ  
ル理ニテ虚寒下利ニテ後重スル者ハ桂枝人參湯ニテ  
一旦表ヘ引戻シ其間ニ枳實茯苓ニテ下シ流ストキハ  
後重ユルムト云意ナリ凡後重ノ証ニ四逆散アリ白頭  
翁湯アリ大承氣湯アリ訶梨勒散アリ桃核湯アリ此湯  
アリ其後重スル所以ヲ辨別メ施治スベシ  
桔梗解毒湯方輿治微毒在咽喉声啞者微瘰約言云先師遺  
方療結毒上攻咽喉腐爛親驗方云中山法眼云享家傳  
遺糧、川芎、大黃、桔梗、黃耆、芍藥、甘草  
右七味本方中去黃耆芍藥加石羔不通之咽喉解毒湯  
此方ハ咽喉結毒ノ主方ナレ凡テ上唇ハ結毒ニ用ニ  
宜シ咽喉結毒此方ニテ效ナキ者ハ喉癰湯五寶丹ヲ用  
ニ下シ酷毒ノ者ハ魚鱗ニ非レハ効ナシ  
著啟建中湯青洲老諸病後虛脫盜汗出者

ナ

此方乃建中湯之變方也  
 建中湯之變方也

即當級建中湯方中加黃芪或隨証加及梟

此方ハ有洲ノ創意ニテ瘡瘍ニ用ユル氏虛勞ノ盜汗自

汗症ニ用テ宜シ外臺黃芪湯前胡建中湯樂令建中湯ノ

類ハ總テ此方ニ胎胎スル也

薏 云湯南陽瘡癰瘰癧依癰上部腫毒瘡疔或疹後癰小瘡臭熱

似瘡狀者以方能浮將火散結氣通滯血

連薏、玄參、獨活、木通、升麻、甘草、槐子、薰陸

右八味一云此方山脇云沖本于外臺瘰癧門而所製

此方乃味山虛汗ノ外臺延身玄參湯ニ本キテ組立ツト云

瘰癧及上部ノ腫物ニ寒熱瘰癧狀ニ似タル者ニ用ユルハ

能將火ヲ散シ氣血ヲ通スルナリ此方ノ一專然キ者ニ

逍遙散瘰癧ノ加減トス

杏仁五味子湯最方

杏仁、五味子、茯苓、甘草、右四味

此方ハ茯苓杏仁甘草湯ノ症ニハ咳嗽甚者ヲ治ス高年

及虛羸ノ人厚藥ニ堪カク者此方ニテ意外ニ効ヲ奏ス



奇良附湯青州名徽毒一切痼疾身體羸瘦虛弱不可與峻劑

者

遺種 人參、附子、桔梗、桂枝、乾姜、當歸、黃耆

甘草 石九味

一方ハ徽毒ノ壞症ニナリ陰分ニ陷リ虛羸奈何トモス  
一カラサル者ニ用ユ本邦先哲徽毒ノ虛症ヲ治スルニ  
六度煎七度煎十ト云方アル氏方ヲ最優トシ故ニ  
諸病虛候ヲ具ハ具鐵近クハカラサル者ニ與テ間ニ効  
アリ

割生括柳湯

貝母、當歸、瓜仁、枳實、桑白、薑、芍藥、茯苓、防己、甘草、白芍、  
知母、  
經加五味、芍藥、地骨皮、知母、

女部

綿裏飲 本朝名醫老手腰腹弦急不能動搖

綿裏仁、甘草 右二味不大便者加大黃

以方ハ本邦ノ俗傳ナレ氏腰痛ニ即効アリ腰痛大抵ニ  
當歸建中湯南石散ニテ治スレ氏平ニ腰腹弦急ノ動搖

治腹中寒急而痛者見夜啼不上腹中寒急甚者亦有奇効

明眼一方  
此方治風眼微瘡約言治諸風熱眼目微氣衝上者

即荳蔻木甘湯方中加車前子細辛黃連

此方八風眼一三十九大逆氣上衝眼中血熱或八區生  
スル者ヲ治ス今眼科用スル處ノ某或湯排雲湯皆以類  
方ナリ

明眼一方

防風、菊花、車前子、滑石、桔梗

右五味或放敗毒劑治天行或加放解毒劑治濕眼

此方八藝州土生氏ノ家傳ニテ諸方ニ加味ノ用ス其中  
外障腫眼ノ類ニハ別ノ効アリ

之部

芍藥甘草湯傷寒治拘急迫者

芍藥、甘草 右二味



治相毒沈滯胃弱急難屈伸或胃弱痰  
 痛寒冷瘧疾者兼用之宜氣丸或十幹  
 氣丸或十方加大黃急為藥甘草附子大  
 黃治寒心腹中拘急寒甚腰脚骨痛  
 畢九鞭胆二便不通者有奇効尾溫  
 一男子年五十卒倒台墮之醒後身體  
 僵直年足運動入ルヲタハス老セザル  
 十六日許余其腹ヲ按セ拘急シテ痛ハ  
 乃放方ヲ與ハ五升劑ニシテ諸症已ニ除  
 ク又十寒湯ヲ以テコレヲ攻ハ下利數ヲ行  
 ニメ全愈云々候見

以方ハ脚痛急ヲ治スルカ至ナシ氏諸家腹痛及脚氣兩  
 足或膝頭痛屈伸ニハカラサル者其他諸急痛ニ運用  
 又釣藤於羊ヲ加テ驚病ノ頭急ヲ治ス又松心ヲ加テ淋  
 痛甚ク晝夜頻注スル者ヲ治ス又微毒諸藥ヲ服メ瀉少  
 骨節仍痛攻下スハカラサル者松心ヲ加テ効アリ或希  
 脛骨ヲ加ルニ佳ト云

芍藥甘草附子湯曰上 治前症而兼寒者

即芍藥甘草湯方中加附子

以方ハ發行後ノ寒要ヲ治スルノミナラス芍藥甘草湯  
 ノ症ニハ濕位ニ屬スル者ヲ治ス又附子ヲ芍藥頭ニ代  
 テ妙ニ虫蝨ノ痛ヲ治ス又病或ハ痛風鶴膝風等ニ治用  
 ハ痛風ヨリ鶴膝風々々ニナリ綿ニ足ヲ包ト云經冷ル  
 ニ効アリ凡下部ノ冷馬ヲ勝ニカハルハ芍藥亦甘ナリ  
 專テ脚ニカハルハ以方ナリ又濕毒ノ後足大ニ冷ル者  
 ニ天用ニ若餘毒アルモノハ伯州散ヲ兼用スバシ  
 生薑厚心湯曰上 治嘔而心下痞軟腹中雷鳴嘔噎食臭下利者

此方外臺之麥黃湯也。病癰飲停痰不消在  
胸膈上液在胸膈痛若手眼睛身體年足十  
指甲盡黃又心下氣喘胸膈制痛及  
月月牛脚主痛者又痛風又龍主牛足  
微腫者與甘草湯一湯兼用其方有指痛  
之功為九用也。佳月  
此方外臺之麥黃湯也。病癰飲停痰不消在  
胸膈上液在胸膈痛若手眼睛身體年足十  
指甲盡黃又心下氣喘胸膈制痛及  
月月牛脚主痛者又痛風又龍主牛足  
微腫者與甘草湯一湯兼用其方有指痛  
之功為九用也。佳月

即華夏心場方中加生薑

此方ハ後世順氣和中ヲ用ル場ハ即効アリ又香砂二君  
子香砂平胃ナト與ラ疾ハ勢ナリテ應マサレモ  
用テ善順アリ又虛勞或脚勞等ノ心下痞メ下利スル者  
ヲ治ス古方皆乾姜アルハ生薑ヲ用ヒテ唯此方ノミ  
生薑干姜共ニ用其厚意味フバシ總テ半夏生薑甘草三  
厚心ノ証ハ水氣心中ニ迫リ心下鞭滿メ痞スル者清腸  
腹ハ迫リナリ但心下ノ甚シク胸中ハ上逆ニテ吐  
酸氣シ或ハ水氣下行ノ腹中雷鳴下利スル者是胃中ノ  
虛不知ヨリナス故ニ中ニハ下利清穀ト同シヤウニ見  
ユレ氏全ク穀不化ノ症ナリ

十聖湯同ニ治病在胸腹刺手痛者

芫花 甘遂 天戟 大棗 石四味

此方ハ懸飲内痛ヲ主ス懸飲ト云モノハ外邪内陷メ  
胃中ノ水ヲ胸ハ引挙ラ胃ニ水氣ヲタクハハナリ又  
外表ノ方ハ張出ス氣味アリ行出熱頭痛等ノ証ヲ



或人時之肩背急痛脇下刺カ如ク呼吸  
迫動搖を了一筋之區皆然トシラセ  
ラシテハ愈先生縣下歟トシラ 其方ハ  
大知ヲ得タリ 稿

曾燕勞嗽種肩喘急多痰不寐自汗盜  
汗痰中血線寒熱交 而煩紅赤巨星  
動甚惡心瀆之欲吐者宜此方若下利者  
去麻子仁加乾姜水煮為佐 是也

炙甘草湯 口上

甘草、生薑、桂枝、人參、地黃、阿膠、麥門、麻仁

大棗、乾地黄

此方ハ心動悸ヲ目的トス凡心臓ノ血不足スルハ氣  
管動搖メ悸ヲナシ而心臓ノ血動血脉ハ達スルヲ能ハ  
ス時トメ間歇ニ故ニ脈結代スル也此方能心臓ノ血ヲ

導ル者ニアレト云裏ノ水氣主トナリテ表ハ容ナリ故  
ニ胸下痛乾嘔短氣或ハ噎煩水氣浮腫上氣喘急大小便  
不通ヲ目的トメ此方ハ與テハ又又缺盆ニ引テ目的ト  
メ用エ脈ハ況ニシテ弦或緊ナリ又此方烈キ處ハカリ  
ニ用ルヤウニ覺シ氏シカラス類家ノ水飲ニ因ル者捨  
置ハ勞嗽ニ變スタトヒ引痛ノ症ナク氏水飲ノ候見付  
タレハ直ニ此方ヲ用エバシ前田長庵ノ經驗ニ一人手  
ハカリ腫テ餘所ハサツハリト腫シス元氣飽食氏如故  
者此方ヲ用テ水浮ヲ得タレハ速ニ愈タリト面白キ段

產後下利腸鳴腹痛小便不利支體酸軟或  
 麻痺有氣短寒熱咳嗽不止漸成勞嗽  
 者此為難治宜以方  
 一女子九歲下利久止不入飲食減少面黃  
 手足微腫脾經細合上莖下下乾燥之見  
 御前利下止之方  
 人參湯與之漸愈  
 淺田家國先生方加良姜之能之用  
 此湯新功之東郭氏曰此方之能重之  
 四葉散有奇功

為養之脈路ヲ潤流ハ是ハ動悸ヲ治スルノミナラズ人  
 血脈凝滯ノ氣急便迫ル者ニ動アリ是余數年  
 ノ經驗ナリ又肺痿ノ少氣メ胸動甚シキ者ニ用テ一時  
 効アリ龍野ノ秋山玄瑞ハ此方ニ桔梗ヲ加テ肺痿ノ主  
 方トシ蓋重置ニ據ル也又局方ノ人參養榮湯ト治テ目  
 メ此方ハ外邪ニ因テ津液枯槁ニ腹部動氣アル者ヲ主  
 トシ養榮湯ハ外邪ノ有無ニ拘ラズ氣血衰弱動氣肉下  
 ニ在者ヲ主トス蓋後世ノ人參養榮湯ハ滋陰降火湯ハ  
 此方ヨリ出タル故ニ方ノ場合ハ大抵此方ニテ宜シ但  
 結悸ノ症ハ二方ニテハ治セ又ナリ  
 真武湯日上治字悸身動振欲擗地腹痛小便不利或嘔或下利者  
 木・茯苓 芍藥 附子 生姜 東南陽下利甚則以乾姜代芍藥  
 右五味或加赤石脂治錐鳴浮及病浮或加半夏人參治胃  
 虛下利或加吳茱萸桑白治痰飲上迫  
 此方ハ内有水氣ト云カ目敏ニテ他ノ附劑ト遣フテ水  
 飲ノ為ニ心下降シ身潤動スルヲ振ニトメ地ニタラレ



治痢疾累日下利不止胸脇苦滿心下痞塞  
 腹中結實而痛裏急後重者凡量  
 一安昏未嘗胃六七推之上安起三其此腹  
 杯ノ如ク胸脇亦高張之氣分亦鬱塞シ  
 幸ニ逆強ハハ肝ハ腹裏拘急之背ヲ  
 強ヲ覺エ余ヲ加鈞ヲ麻等羊角ヲ與テ大  
 胸脇ハ用メ旬日ヲ経テ胸腹實快  
 氣色大ニ旺シ金匱前方ヲ連進シテ脊骨凹  
 後ニ身體故ノ如シ病

四逆散 同上

ントモ或ハ麻痺不仁手足引ツルヲ覺エ或ハ水腫小  
 便不利其腫虛濡ニナカナク或ハ腹以下腫アリテ臂肩  
 胸背羸瘦其脉微細或ハ浮虛ニメ大ニ心下痞肉ヲ飲食  
 美ナラザル者或ハ四肢沉重疼痛下利スル者ニ用テ効  
 アリ方名ハ千金及翼ニ從テ云武ニ作ルベシ

柴胡、芍藥、枳實、甘草、七四味或加吳茱萸、茯苓、治

抵飲癖者或加茵陳、香豉、治心痛或加鈞藤、黃連、殺羊老病

癖先哲加著黃湯治心家挾鬱毒瀉火者加吳茱萸、牡蛎、名

曼清湯治癖囊或加茯苓、甘或合強神湯

以方ハ大柴胡ノ變方ニメテ陰ノ熱厥ヲ治スルノミナ

ラエ陽寒ニ病ヲ兼ルヲ甚ク識語煩躁シ噦逆ヲ資スル

等ノ証ニ特驗アリ其腹形專ラ心下及兩脇下ニ腐ク聚

リ其凝リ胸中ニモ及恒ニテ拘急ハワヨケルハ熱更ハ

少ナ故大黃黃芩ヲ用ヒズ唯心下兩肋ヲ緩メ如クルヲ

至トスル也東郭氏多年效方ヲ疫症及雜病ニ用テ種

醫家元戎云茵陳四逆湯アリ  
四逆湯ニ加茵陳ナリ東郭子昌以  
方ノ之ヲ無黃疸其位ニ陰  
及手足寒冷者ナリト

産后血脱ノ症單者前哲方有  
産后血虚症單絶脈絶食寸咽下  
灸治無効不可如何者若屬于微動  
或腹中微振者此方ナリ通關散  
或生見赤白帶中ニハナシ尤  
通關散ハ針灸ノ及ハ所ナリ  
通關散方主葛絲・牙皂  
於產后二時為水用

ト謂ベシ  
四逆湯日ニ治四肢厥逆。身体疼痛。下利清穀。或小便清利者。

甘草、乾姜、附子、  
三味

此方ハ陰症正面ノ治方ニテ四肢厥逆。下利清穀。苦力目  
的ナリ。其他假熱ノ証ニ此方ヲ冷服セシムル午後アリ  
矢張加猪膽汁ノ意ニ近シ又附子ニ人尿ヲ佐スル陰  
物ノ處ヲ假テ其真寒ノ陰邪ト一知セシムル也。又此方  
ニ烏梅蜀椒ヲ加テ溫中湯ト名テ蛇厥ヲ治ス  
四逆加人參湯日ニ治前症而心下痞蕪者

、即四逆湯方中加人參

此方ハ亡血之津液ヲ目的トシ後世ニテハ參附ト一ツ  
カミニ云トモ仲景陰虛ニハ附子ヲ主トシ陽虛ニハ人  
參ヲ主トシ後世ニテ云ハ參ハ脾胃ニ入テ脾元ノ氣ヲ  
溫養シ附ハ下元ニ入テ命門火ノ源ヲ壯ニスルトノ相  
違アリテ格別ノモノト心得ベシ

其他諸牙暴厥方同緊急者先用此方 二葉共三舶水ヲ用ニベシ



升麻湯甲場金匱

升麻、芍藥、蜀椒、甘草、蟬甲、雄黃、右三味

此方ハ陽毒ノ發斑錦文ノ如キヲ治ス陰陽毒ノ説明ヲ

ナラサレ反疫毒斑疹ノ異症ニ用テ効アリ大傷馬銜一

光臣ノ傳ニ囚獄中ニ一種ノ病アリ俗ニ牢役病ト稱ス

尋常溫疫ノ治法顯ナリ此方ヲ用ルハ特効アリト云

又宇安佐野氏ハ董氏逐級ノ説ニ本キテ喉痺ノ急症ヲ

陰陽毒ノ種類トシ此方ヲ用テ治テ得ル甚多ト云符

試ルベシ

十味芍藥湯今集治冷氣脇下往來衝胸脇痛引脇背肉者

芍藥、桂枝、茯苓、枳實、大黃、吳茱萸、芍藥

人參、甘草、乾姜、右十味芍藥湯甘姜根煎吳茱萸

此方ハ張文仲事仲芍藥大黃湯ニ枳實茯苓ヲ加ルノ

ナリ前方ノ症ニナ上部ニ迫リ胸脇ヨリ脇背ハ引テ痛

者ニ効アリ俗ニ云病積衝病ナド、云症不大使ノ者ニ

宜ニ又後世用ニル處ノ平肝氣飲ナトノ証ニ効アリ

或ハ腹痛脇痛癰癤ヲ生シ時々拘攣ニ或  
時ニ腰腹ニ牽引或ハ脇下ニ迫ル數日不愈  
余決方加附子云大黃連進數旬塊解消  
尽シテ全愈稿

芍藥湯  
 芍藥 黃芩 附子 湯 二 姜  
 如中八味 申至痛力下股  
 痛功アうし

生地黃湯 同上 治小兒寒熱進退喘咳腹痛

地黃、桂枝 右二味 今加大黃特提

此方ハ小兒ノ腹痛ニ奇効アリ小兒ノ痛ニ胎毒攻下ノ

剖ヲ與ラ愈サレ者必試シベシ凡小兒ノ腹痛ト云フ者

診スルニハ時ヲ期ノ頻ニ啼呼メ又張スル者是ヲ腹痛

ノ候トスル也

蜀漆湯 同上 治產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯

熱時時輒甚又如微癰

蜀漆、桂枝、甘草、黃芩、黃芪、知母、芍藥、地黃

右八味

此方ハ芍藥ノ主藥トス大抵ハ小柴胡加地黃湯ニ芍藥

芍藥ニテ治スル氏虛熱盜汗身酸疼等ノ症ニ至テハ此

方ト加減逍遙散ニ非レハ效ナシ

紫蘇子湯 同上 治脚氣上氣

蘇子、厚朴、半夏、紫胡、甘草、當歸、橘皮、桂枝

右八味或加杏仁桑白治咳逆上氣



東郭曰宗氣年喘喘指為  
 人少氣口痰之重受性實人三  
 麻目不難之即肺者  
 宗氣年喘喘指為  
 人少氣口痰之重受性實人三  
 麻目不難之即肺者

以方ハ脚氣上氣ヲ治スル方ナレド今ノ脚氣ニハ效  
 クナシ上氣ハ今ハ喘息ノ下ニテ虛氣元リテ喘鳴スル  
 者ニ效アリ故ニ後世ニテ足冷喘急ヲ目的トシテ用テ又  
 耳鳴鼻衄齒搖口中腐敗血水腫喘滿等ノ症足冷ノ候  
 ハハ必ス効アリ易簡方ニ下元虛冷并身氣虛之人元  
 有上壅之建補藥不得者用之立効トアリ故意脚氣ニ用  
 ルニ天又雜病ニ用ルニセヨキ口訣ト知ルベシ又此方  
 ニ天南星川芎細辛桂枝茯苓等ヲ加テ大澤氣陽ト名テ疾  
 咳甚ク或ハ水氣アル者ヲ治ス症ニ臨テ試メバシ  
 浮心陽同上治脚氣下痢熱唇乾口燥逆引飲  
 即手夏浮心陽方中去大棗加橘皮枳實根  
 以方ハ半夏浮心陽ノ症ニハ唇乾口燥逆引飲ト云カ  
 目腫ナリ又下利ノ中ニ噦逆ヲ發ス心者ヲ用テ効アリ  
 浮脾場千金翼脾藏氣實胸中滿不能食又主冷氣在脾藏走  
 在四肢手足厥腫亦逐水氣栗園先生曰以方治茯苓飲証  
 而有滯熱者

栗園先生書時症之浮腫湯ヲ用ハ  
 目的ハ即浮腫内足浮腫ヲ常ニ血  
 色ノ少ナキ者ニシテ鉄砂ノ應セザル者  
 常龍骨牡蛎ヲ加ラ用ス

夜苓、厚朴、桂枝、生姜、半夏、人參、黃芩、甘草  
 右ハ味開齊加骨牡蛎湯也  
 此方ハ積氣留飲ニシ胃中滿シ不食ヲ治ス蓋中脘結聚  
 入此力目的トハ其外証ハ動氣衝逆ナリ外臺ニハ腕子  
 ナ加ラ遊氣湯ト名ク又今重ノ方左ニ逐四肢之腫トナ  
 リ是又中脘凝結ナリ水氣ナリ又常ニ厚味肉食ノ  
 人肩一凝リ頭痛逆上メ耳鳴或ハ聾スル者ニ効アリ以  
 テ必中脘ニ云分アリ矢ヨリ氣宇鬱塞頭痛等ヲ治ス世  
 上ニ痼ヤ積ナド、痼スル者ニ此症最多シ一開齊ハ竟  
 骨牡蛎ヲ加ラ黃芩ニ用エ今脾勞瘵黃ノ症動悸甚ク鉄  
 砂ノ應セザル者此方能効ナリ又上逆烈ナ者石莖ヲ加  
 是又開齊ノ經驗也  
 七  
 氣湯外臺療寒熱氣憂氣勞氣然氣或飲食爲膈氣或勞氣  
 内傷五不調氣衰少力

桂枝、黃芩、枳實、人參、芍藥、地黃、半夏、枳實  
 玉柴黃、枳皮、干姜、甘草 右十二味



苓湯年大拘某激之思唯東郭  
治喘方下并甘滿上能治之  
ハナラズ宋周先生云云

洗肝湯 枳實方治即氏方治凡毒上攻  
果作書目腫痛難開隱影昏睛羞  
明或生翳膜

梔子 防風 薄荷 羌活

大黃 黃連 甘草 芍藥

右江水三合煮取一合半或加葱白或

芒硝

發方神勞氣內傷五九飲食胃腸二胆格シ或ハ寒熱ア  
リテ氣衰少力者ヲ治ス千金續氣門ニハ桂枝桔梗十ク  
枳實根蜀椒アリ証ニ依テ用ユバシ

神 秘湯 日上療久咳喘生臥不得轉喉裏呀声氣絕

麻黃 蘇葉 橘皮 桑叶 杏仁

右五味或加厚朴甘草剛繁加生薑石羔名獨使湯

此方ハ外臺備急療久致奔喘坐臥不得臥長喉裏呀声氣

絕方又名神秘湯トアルカ厚方ニテ王碩易簡方楊仁濟

直指方東垣醫學啓明ニモ同名ノ方アリテニ三味ツ

ノ加減アルハ此方カ右捷効アリ吾門厚朴ヲ加ル者ハ

易簡一名清氣湯ヲ意ニ本ツク也

謝道人大黃湯 日上療兩眼痛葯菲録云療眼目腫赤痒痛或

睛腫生翳翳

大黃 黃芩 芍藥 甘草 細辛 右五味今加茯苓滑

石車前子特効又去滑石加不通名八味大黃湯單至方後附書

此方ハ天行赤眼或ハ睛腫翳翳ヲ生シ焮痛スル者ヲ治

牙即聖濟四順湯也

或女節歷風ヲ患ニ數月不愈每節赤腫迷ノ如ク日夜疼痛肺泣ニ加之ニ腹中ニ塊アリシ經水不調ニ至風舒經ノ諸藥ヲ投テ痛益劇シ今診シテ曰表症ナシ表行スヘカラズ熱アリニ至腹中ニ示烏頭附子ノ宜シキ所ニテ又其人經水不調ニシテ四肢疼痛ス病血分ニナリテ治血疎氣ニ宜シト以テ方加厚朴香附子甘草紅花獨活酒炙六日大ニ減シ示腹消ニ唯塊依然タリ硝石大因テ兼用シテ四體常ニ復ニ健

四

二數日不愈者ハ方後ノ加減効驗アリ  
二物湯曰上療卒得果咳以乳以逆者夜不得息  
二即栝樓湯方中加葶苈麥門  
二以方ハ小兒果ニ咳嗽ヲ疾シ声啞不得息者ヲ主トス故  
二二頻嗽ノ劇症或哮喘ノ急症ニ用テ効アリ又大人一時  
二二咳嗽声啞スル者ニ宜シ肺痿ノ声啞ニハ嗽十三  
二二物湯局方調益榮衛滋養氣血治衝任虛損日水不調  
二二即芎歸湯方中加芍藥地黃或加厚朴芩獨活防風紅花  
二二甘草治痛風諸藥與効者  
二二此方ハ局方ノ主治ニ至藥品ヲ考勘スルニ血道ヲ滑カ  
二二ニスルハ牛膝ナリ夫故血虛ハ勿論瘀血ニ塊ノ類膈腹  
二二ニ滯積ヲ種々ノ重ヲ爲者ニ用シハ譬ハハ戶障子ノ開  
二二ニ至キシ者ニ上下ノ清ハ油ヲ又ル如ク治血メ通利  
二二ヲ爲ル也一概ニ血虛ヲ補者トスルハ非也東郭ノ説ニ  
二二注脈動悸ヲ發シ水方ノ定ニアタリテ動築最ニ劇シキ  
二二者ハ肝虛ノ症ニ疑ヒナシ肝虛スルハ腎ニ俱ニ虛ニ



東野翁曰此丸下利之症  
 不可不試也

痔疾血崩血脫其他下血証瘧色淡白  
 目赤下利用此方月八次効を得ル  
 シト云フ 津田云  
 此方加黃芪山藥各二三君子湯補虛  
 壯氣調中益食 備止家宜

男女二限ラズ必効處ノ動築劇シクナレ者ナリ是即此  
 方用ニ改ニ効ヲ得ヌト云以方ノ要訣ト云  
 味白朮散直駛治脾胃久虛吐泄浮乳食不進  
 人參、茯苓、白朮、藿香、葛根、木香、甘草 右七味  
 此方ノ趣意ハ四君子湯ニテ脾胃ノ虛ヲ補ヘ藿香木香  
 ニテ脾氣ハ脹リヲ醒シ葛根ニテ陽明ノ熱ヲ清解シ湯  
 ヲ止メ下利ヲトハムト云午段ナリ故ニ小兒吐泄羸瘦  
 虛熱元リテ煩渴シ動モ入ハハ驚病ヲ起サント欲スル  
 者ヲ治ス葛根ヲ陽明ノ藥トスル下古意ニ非ズ吾門ニ  
 云ハ唯葛根ヲ連湯ノ虛候ニ涉ル者此方ヲ與テ的効アリ  
 四君子湯弱ヲ治梁衛氣虛藏府怯弱心腹脹滿全不思食腸  
 鳴泄浮吐噦逆  
 即理中湯方中云于姜加茯苓  
 此方ハ氣虛ヲ主トス故ニ一切脾胃ノ元氣虛ノ諸症ヲ  
 見ス者此方ニ加減斟酌メ療ムベシ益氣虛ト雖參附ト

胃中ノ陽氣分布シカタク飲食コレニ因テ進マズ胃口  
日々ニ塞リ胃腸虛病痰嗽吞酸ナトヲ奔スルナリ此方  
及ニ君子湯皆飲食進ミカタク氣力篤キヲ以テ主症トス  
故ニ脉腹ニ示コレニ準メカラ篤クハ葉胡浮心湯ナト  
ハ脉腹トハ胃壞ノ達アルモノナリ

參苓白朮散<sup>方</sup> 治脾胃虛弱飲食不進多用少力吐泄浮

白朮<sup>五</sup> 蓮肉 桔梗 縮砂 薏苡 人參 茯苓 白

朮 甘草 薯蕷 七十味

此方ハ脾胃ノ弱中人食事進マズ泄瀉シ易キ者ヲ治ス

故ニ半井家ニテハ平素脾胃ノ至テ虛弱ナル人動モ

ハハ腹ノ下ルト云モノニ常用ニスト云土佐道壽ハ脾

胃虛弱ノ後ニテヲ寒熱惡寒ノ症アルヲ神中益氣湯トシ

唯勞倦ノ飲食進マザルヲ此方トス又此方ノ症ニメ下

利一等重キ者回春ノ參苓白朮散トスルナリ

十全大補湯曰上治男子婦人諸虛不足五勞七傷一切病後



氣不如舊

即千金黃蘗茯苓

此方局方ノ主治ニコレハ氣血虛ニト云カハ物湯ノ目  
的ニテ要ト云カ黃芪肉桂ノ目的也又下元氣衰ト云モ  
肉桂ノ目的ナリ又薛立齋ノ主治ニコレハ黃芪ヲ用ル  
ハ人參ニカヲ合セテ自行盜汗ヲ止メ表氣ヲ固メルノ  
意也肉桂ヲ用ルハ參苓ニカヲ合セテ遺精白濁或ハ  
便滑泄小便短少或ハ頻數ナルヲ治ス又九味ノ藥ヲ引  
導ス夫レノ病處ニ達スルノ意ナリ何レモ此意ヲ合點  
ス諸病ニ運用スバシ

四順湯聖濟治肺癰吐膿主心煩熱壅悶咳嗽  
貝母、桔梗、紫苑、甘草、右四味或咳嗽甚加杏仁  
此方ハ肺癰咳嗽ニ効アリ主治ノ如ク立心煩熱壅悶  
心者ハ葶藶湯ヲ合フメ用エハ此方ハ肺癰ノミナラ  
ズ咳嗽声啞ノ者ニ用テ効アリ外臺ノ四物湯ハ伯仲ノ  
方ナリ

一婦產後血熱甚ク血上乾燥赤爛飲之良スル  
 能ク之痰喘逆盛血ヲ吐シ脉虚數危殆極  
 ル余共方ヲ與ヘ血喘即止固テ人參當歸  
 散ヲ與ヘ諸証決知シ挽回ヲ得ル橋  
 東郭曰產後喘息ノ如クゼン一急迫者  
 六諸方中亭生ニナリ

梁國先生此方加附子療毒內攻  
 之陰症用

參蘇飲難辨治產後面黑乃惡血及肺癆喘欲火

人參、蘇木 右二味一名山查湯

此方ハ血喘ヲ主トス又產後瘀血衝心ノ者ニ七用ニ証

ニ依テ即効アル藥ナリ

十味劉散葉氏治臂痛連筋及骨舉動艱難

附子、茯苓、當歸、川芎、芍藥、防風、白朮、黃芩

桂枝、地黃 右十味

此方ハ血虛臂痛甚者日治之又足痛日ヲ經テ脛肉脱ニ

行步艱難ノ者ニ効アリ

赤小豆湯同治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或

渴小便不利

赤小豆、當歸、商陸、澤輝、連芫、芍藥、防己、茯苓、澤漆、桑白 右十味熱甚者加犀角

此方ハ諸瘡瘍ヨリ變メ水腫ヲ成者ヲ治ス老人小兒血

氣薄弱瘡毒揮發スル能ハス内癰メ水氣ニ變スル者ニ

宜ニ若血氣壯實毒氣內攻メ衝心セント欲スル者ハ先



衛生家言生薑名須氣場然暖逆神  
 隨亦淺矣  
 吃逆之治法三丁附理中湯吃逆三  
 振皮作氣湯三喜笑湯羊浮心湯  
 抑第湯

凡脈絕在左絕者多取右者生候也左  
 アリ右絶者必死候也經脈之應心ハ  
 凶候也東郭  
 四春生脈散加自朮為四味

痛急圖ヲ與ハ快下ノ後東洋毒ハ豆湯ヲ用ヘシ其方ト  
 東洋ノ方トハ虛寒ノ辨アリ

橘蒂湯口上治暖逆  
 丁香、橘蒂、生薑 右三味一方加人參易簡加羊貝  
 其方ハ後世噦逆ノ主方トス蓋橘皮竹茹湯トハ寒熱ノ  
 別アリ症ニ隨テ擇用スベシ一老臣以方ニ本キ俗間所  
 在ノ橘ノ渋汁ナル者ヲ濃煎メ用即効ヲ得タリト云  
 指逆七氣湯直指逆七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝  
 作疾

即得世大七氣湯  
 轉大七氣ノ條ニ見

生脈散 補氣生精氣培養真元補心潤肺  
 麥門、人參、五味子 右三味按外臺深師療傷寒下後  
 除熱止渴立味麥門冬湯去甘草玄合真武王連理諸湯  
 以方世ニ千金方ヨリ出ルト称スレ氏確テラス張潔古  
 李東垣ヨリ專ヲ用始シナリ其旨ハ寒ハ血ヲ凝ニ暑ハ

子宮癰疽

氣ヲ傷ルト云ヲ暑ト云者ハ至ラヨク人ノ元氣ヲソコ  
 ナラセト也尤老人虛人ナドノ暑ニツカルト甚シク  
 六脈力ナク甚ニ至テハ絳代入ルモノアリ故方ニテ元  
 氣ヲ引立脈ヲ生入ルト云意也但シ暑中ニハ限ラズ一  
 切元氣弱キ脈ノ病人ニハ延王ヤ真武ニ訣方ヲ合メ用

身重如山陰冷如水

黃芩、橘皮、防風、良姜、郁李仁、甘草、萊胡、干姜、白朮、右九味

此方ハ白帶下ノ主劑トシ身重如山陰冷如水ト云カ月  
 的ナリ白帶下ハ婦人ノ内尤難治トシ臭氣甚キ者ハ別  
 メ不治ナリ此方ハ牧戸ヨリ俗ニ水ビト云如キ冷水  
 ヲ漏下シ腰痛スル者ニ効アリ產科立野龍貞ハ白蔘花

ラ白雞冠花ニ代ルカ驗アリト云試キバシ  
秦瓦鑿甲湯寶璽昭風穿骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣度



此方等處歷世中者皆奉花柳氣  
湯上之但彼欲救之者其味下者

醫家必讀、清骨散治骨蒸熱

秦花、生薑、甘草、胡荽連

因僊溫汗、秦花、知母、芍藥、蟹甲、羌活、地骨皮、青蒿、烏

梅、生薑、右九味、此方ハ風勞ノ主藥ト入虛弱ノ人風カヌリコチテ

ラリト勞熱ニナリタルヲ治ス一時清熱ノ効アリ然レ

氏日ヲ經テ骨蒸ノ後ヲ具ニ肌肉消瘦唇紅頰赤ノ者ニ

至テハ此方ノ治スル處ニ非ズ此方、羌胡、姜桂加蟹ノ塊

合ノテ一段熱ツヨク姜桂ノ熱藥ハ厚リソナテ處ニ用

ユバシ、即四物湯方中加羌活防風龍胆防己

此方目風寒ニ侵サシ血熱沸瀆ノ痛甚キ者ヲ治ス或風

眼ノ症蓋因十二ニテ快下ノ後血脉未復用クテ能ハサ

心者、此湯要治婦人一切諸氣或上凌心胸或攻脇肋○

正氣天香湯纂要治婦人一切諸氣或上凌心胸或攻脇肋○

、芍藥、陳皮、烏藥、蘇葉、乾姜、甘草、右二味  
此方ハ氣劑ノ總目ナリ諸氣為痛ト云ラ以テ目的トス  
其地眩暈嘔吐寒熱ノ類何レモ氣ハ鬱滯ヨリ来ルモノ  
ハ一症ヲ見サハ即用ユバシ蓋此方專ラ氣ノ鬱滯ヲ利  
スレハ血分ノ中分ニモ能應スイカントナレハ血不能  
獨行必依氣流行ムト云テ血分ノ不和ハ氣ニ本クカ必  
照ノ理ナリソレ故氣滯ヨリ經行不利スル者ニ用テ効  
アリ經行不利ヲ經ラ血分ニ拘テ療治スルハ拙策トス  
氣滯ノミナリニ病癖寧急ノ類スヘテ其腹候ヲ審ニシ  
其源証ヲ治スレハ自然ト經事来ル也  
春澤湯高効治伏暑發熱煩渴引飲小便不利肋周又采匡方  
選要云兼治傷寒瀉湯不分疑似之間最宜服之又云渴甚  
去桂加五味黃連各二錢  
即止苓散方中加柴胡人參麥門  
珠方ハ能ク伏暑ノ熱邪ヲ解ス此症柴苓湯ニ似タレ氏  
柴苓ハ往來寒熱ヲ主トス此方ハ清熱瀉胃ヲ主トス混



温疫ナドノ類ニ白疹ヲ生スル者ハ必ス火スルヲス  
 遠也其形アセイホニ似テ白ク然レハ膿ナシ胸  
 部ニ最多シ雜病ニテ生ズルハ比温疫ノ如キ  
 急ナリ也  
 炒姜ハ干姜ヲ炒ラスミノ如クシタル也  
 解熱薬ニ用エナリ其熱ヲ握標ハ附  
 子石姜ノ如キアスニ今連用ニシ冰之  
 大升湯散ニアタリ傷ニ用ニ故ニ升  
 陽散大湯ニ加用ニハ年ギハ好ク解熱  
 エルナリ本草家云

スベカラズ又濕癰白虎湯ノ症ニ似テ熱氣ハ稍輕クノ  
 濕邪ノ方重キ者ニ用坎症者夏ノ交ヨリ梅雨比ニマ、  
 マリ心得テ經驗スベシ  
 升陽散火湯ニ書治又午冒胸尋衣摸床謔語昏沉不醒坎肝  
 熱兼放踵元氣虛不能自主持名曰環空証小便利者可治  
 如不利者難治

此方ハ溫疫虛症循衣摸牀識語昏沉不省人事者吳氏ノ  
 人參養榮湯ト互ニ用テ効アリ就中此方ノ主ル處ハ痲  
 症ノ如シト煩悶強ク或ハ兩脇攣痛シ或ハ下利スル者  
 ニ宜シ又此方ノ症ニメ因重シ熱ツヨキ者ハ浮心導赤  
 散ニ宜シ一休大用氣湯ヲ循衣摸牀ハ胃實アリスル  
 ナリ又肝經一卵熱ノカブレ甚シク元氣主持スル  
 筋ハ弛緩者有故ニ洵節庵力以方ヲ制セヨ也升陽散大  
 ト云ハ辨脈法ニ陽氣下陷入陰中則發熱ト云義ニ本テ

此方乃東垣升陽散火之同義也  
其方之妙在二方之比也  
肝火之清涼之解熱之方也  
若以症之方一層熱之方  
片力之思之上心之衝逆之方  
處之肝火之方力之識言  
忘證愈盛之方者  
厚用生草之方  
効力又其上之方  
候下之方者  
附子之方  
加其方  
右等加味診察詳十之方  
レハ用之難之其具合斟酌之方  
一ナリ

滋血潤腸湯  
治血枯及死血在腸飲食不下大便結燥  
當飲芍藥、地黃、熟地、桃仁、枳實、大黃、蘆汁  
古八味

此方乃腸中之瘀血ニ屬スル者ニ用シ氏總ニ瘀血ノ胸  
腹ニ在者ニ運用スベシ

下氣消聚散  
口上惡盛脹因積聚相攻或疼或脹

芍草、青皮、莪朮、三棱、枳實、木香、縮砂、厚朴

橘皮、甘草、右十味

此方乃消渴ノ伯仲ノ藥ナリ但盛脹ノ疼痛アル者ニ



或老婦身寸寸餘腹中塊癥アリ胸氣ニ感シ  
 う腹滿水氣ヲ食シ小便ヲ利達熱煩渴ニ医  
 利水疎氣ノ劑ヲ與ヘ寸効ナシ余診シテ曰邪氣

ハ塊方効アリトス  
 正心湯通經七情五志久逆心風忘言忘笑不知所苦  
 当歸、茯苓、代黃、羚羊、甘草、酸棗、遠志、人參

右八味  
 此方ハ婦人陽湯ノ症ニナ心風甚ク忘言忘笑不止血氣独  
 燥スル者ヲ治ス又小兒肝虛内熱情神燥カナラザル者  
 ニ用ス

止痛附子湯似旨治諸病氣  
 蒼朮、茯苓、黃蘗、青皮、益智、桃仁、延胡索、茵  
 香、附子、甘草 右十味

此方ハ瘀血ニ属スル病ニテ痰癰攻注スル者ヲ治ス即  
 八味病氣割ト表裏ノ方ナリ八味ノ症ニノ陰位ニ属ス  
 少者ニ用ス又通經導滯湯ノ症ニノ陰位ニマレ者ニ用

淨府散臣鑑治小兒腹中癰塊發熱口乾小便赤  
 羌胡、茯苓、猪苓、澤浮、山查子、三棱、莪朮、黃

塊瘕ノ証着シ這般ノ證シ發スルナリ先痛挑消  
塊ノ聚ヲ散スルシ中府散ヲ作ラ服サシム其後  
小便快利シ翌日ヨリ熱解シ飲食進ムヲ  
得大患不日ニ愈極

此方ヨリ生カ毒ノ水通シ力多キハ  
ルノ意アルモ若シ尿水通シ力多キハ  
手ニ試ミテ殊効ヲ得ルヲ多

今、白朮、半夏、人參、甘草、  
右十三味、枳實、加鹽、甲、枳、榔、名、消、痞、湯、治、疔、癰、

並連

此方ハ藥性湯ノ變方ニメ、痰、水、三、癭、胡、黃、連、ヲ、加、ル、者、ハ  
峻、ニ、胃、中、心、下、ヲ、推、シ、開、中、胃、口、兩、脇、ノ、間、ニ、停、滯、ス、ル、處  
ノ、水、飲、ヲ、消、導、ス、ル、片、ハ、癰、塊、ヲ、融、和、ス、ル、也、後、世、ニ、ハ  
痰、核、ヲ、消、塊、ノ、品、ト、ス、レ、ハ、消、塊、軟、堅、ノ、効、ハ、癰、甲、ニ、如、ス  
但、破、氣、ノ、能、アリ、ト、知、ス、レ、ハ、シ、又、此、方、ヲ、小、兒、ノ、專、治、ト、ス  
レ、ハ、大、人、ニ、用、テ、効、アリ、余、越、前、藩、川、崎、氏、老、母、寒、熱、腹、滿  
甚、中、者、ヲ、治、シ、又、平、岡、宗、山、室、暑、疫、ノ、熱、固、有、ノ、塊、癰、ニ、熱  
着、メ、數、日、解、セ、サ、ル、者、ヲ、治、ス、立、方、ノ、意、ヲ、會、得、マ、ハ、何、ソ  
大、人、小、兒、ヲ、擇、ハ、ン、ヤ、東、郭、氏、ハ、此、方、ノ、症、ニ、メ、胃、氣、弱、閉  
一、層、甚、干、者、ニ、麥、芽、木、香、ヲ、加、テ、効、アリ、ト、云、試、シ、ベ、シ  
神、効、散、曰、春、治、痘、出、毒、氣、太、盛、血、紅、一、片、不、分、地、界、如、蚊、蚤、腫  
或、諸、失、血、或、吐、浮、七、日、以、前、証、可、服、解、毒

黃芩、人參、芍藥、地黃、牛蒡、萊菔、紅花、紫花  
甘草、七九味



新編 婦科 卷之五

一婦年三十許產後急二兩月首三物ヲ解スル  
丁能ハム家人驚キ治ラ服科ヲ請ノ服  
至内障不治トス解シ去ル余言曰產前  
疥癩ヲ患ク産後ニ至リ則テ發マシ加シ  
其人血分虚耗ニシテハ血虚毒壅ノ為ス

此方ハ瘡癰氣虚毒壅ノ主劑トス膿將乾ル丁能ハム瘡  
尖内陷スル也毒壅トハ血紅一片地界ヲ分タス或ハ暗  
黒ヲ帶テ痒塌ノ勢アルヲ云歟方ヲ以解毒表托スベシ  
每深者一及畧ヲ加

參耆鹿茸湯日二服瘡色淡白疤不尖根臭紅暈者氣虚而血  
縮者也不成膿

人參、黃芪、鹿茸、當歸、甘草、生薑  
左ニ味或加反鼻

此方ハ虚瘡ニテ其色灰白根ニ紅暈ナク膿膿ヲ膿エ  
能ハサル者ヲ治ス又瘡ノミナラス諸瘡瘍氣虚メ血縮

ル者ニ効アリ一婦人乳癰數年不愈膿水淋漓長肉之  
丁能ハム頑肉突起其狀乳岩自潰ノ者ニ似タリ方ヲ

與ルテ數日ニテ全愈  
腎氣明月湯日上治勞神腎虚血少眼痛昏暗

、當歸、川芎、熟地黃、生地黃、芍藥、桂枝、人參  
、炮子、蓮蓬、白芷、菊花、蔓荊子、甘草、桑

處下ラント其方ヲ與ニ結每蒙至再ヲ兼用ス  
服之數日而眼明ヲ生ニ漸ニ平復ス

右十四味今去熟地黃

此方ハ内痔服ノ主方トス内痔ニ氣虛血虛ノ分アリ血  
虛ノ者ヲ此方トス氣虛ノ者ヲ益氣聰明湯トス其一等  
重キ者ヲ匡王湯加防風蔓荊子白豆蔻トス此方ノ一等  
重キ者ヲ十全大補湯加訖舍白豆蔻肉子トス内痔ニ硬  
弱乳汁弱ノ二証アリ又黒内痔漏象ニ屬スル者アリ宜  
ク專門ニ就テ辨明スバシ

浮

心導赤散者也傷寒心下不痛腹中不滿大便如常身無寒  
熱漸變神昏不語或夢中獨語一二句日赤神焦將水與之  
則熱不與則不思形如醉人區者不識便呼爲火証若針灸  
誤人多矣殊不知熱邪傳入少陰心經也因火土而逼肺所  
以神昏故名越經証

旋子、黃芩、芍藥、知母、黃連、滑石、人參、犀角

、茯苓、甘草、地黃 右十一味傷寒六書名導赤各半湯

此方ハ浮心湯黃連解毒湯ノ變方ニノ解毒湯アリハ一

等熱勢甚ク精神昏亂ニレ氏承氣湯ノ如ク胃中ニ邪毒



リリテ榮スル熱ニハ非ニ後世ノ所謂心包絡肝膽經私  
ニ沸鬱メ煩悶スル症ヲ治ス又升陽散火湯ト其症相似  
然レハ散火湯ニ葉胡楊ヲ加ニテ動モスルハ陰分ニ陷  
ントスルノ機アリ故ニ附子ヲ加ントアリ其方ハ其機  
ナク唯カラタ中ニ偏蔓シタル熱甚ク精神之カ為ニ昏  
潰スル者ニ用ニ總テ虛症ノ時疫困睡スル症ニ其方ノ  
行處アリ吳氏人參養榮湯陶氏升陽散火湯ノ症ニ此ハ  
心ハ熱強キ者也又竹茹溫膽湯ノ症ト紛レ易ケルハ彼  
ハ心驚悸惚煩熱不眠ヲ主トシ其方ハ神昏不語或夢中  
獨語敢如醉人ト云目的ナリ方後ノ如ク生芩ナリ照入  
ニル中ハ特効アリ

滋陰降火湯同上治虛火上升喉痛竹喎内生瘡

、當歸、川芎、黃蘗、知母、天花粉、芍藥、地黃、桔

梗、甘草、右九味入竹瀝溫服

此方ハ虛火上炎メ喉瘡ヲ生スル者ヲ治ス肺痿ノ未証  
漢火喉癰ト稱スル者一旦ハ効アルハ全治スルナラハ

子氣者兩足浮腫也（姓娠浮腫）春  
 紫蘇 陳皮 香附 烏藥  
 木香 甘草 天仙藤 生姜  
 右煎服加蒼朮尤良

肺腫者身重身熱手足心熱  
 此方以骨皮、桑葉、杏仁、身熱者上二

又各病二八決方ト甘露飲ヲ服セシムルヨリ別ニ第  
 八十三

紫蘇和氣飲 治生生書子懸者心胃脹痛也兼治胎氣不和心  
 腹滿疼痛及胎前諸疾

香飯、川芎、芍藥、莎草、蘇葉、橘皮、大腹、甘草

右八味產經與莎草有人參名草蘇飲

此方八味產氣滿飲食消化之能ハ之或ハ胎氣不和

十九者ヲ治之方意ハ半夏厚朴湯ノ症ニ和血ヲ兼タル

者ト心得ハシ

秦艽扶羸湯入内治肺腫二經虛熱及肺痿骨蒸已成勞嗽或

寒或熱聲啞不出體虛自汗四肢怠惰

、秦艽、鱉甲、人參、芍藥、半夏、甘草、柴胡、地骨

皮、葶苈、烏梅、大棗、生姜

右十二味按此方本出聖濟治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒熱

聲啞不出體虛自汗四肢怠惰

此方ハ肺痿骨蒸ノ主劑トス前ノ秦艽龜甲湯ニ比ス



或人治ラ先生ニ求往ラ診ルニ傷寒八九日  
一医錯名壞症ヲシ脉ニ未息大便敗魚因  
ノ如キ者ヲ下シ小便赤澀舌上苔ナノ煩渴  
不眠飲食ハハ就ハ四肢厥瀉漸情言フカ  
ラ其症實ニ似ラ實ニ非ハ虚ニ似ラ虚ニ非ハ  
其脉ニ據ラ與ラニ決方ヲ以テ余日ニシラ  
全効ヲ奏ス揚

ハ稍虚候ヲ見エ者ニ宜シ但シ成ハ骨蒸此熱肌肉消瘦  
ハ咳嗽ナキ者ニ用エ決方ハ熱強ク咳エハ症ニ用エ又  
外臺解五蒸湯ノ症ニ似テ羸瘦甚キ者ニ與フハシ  
參胡芍藥湯口上治傷寒十餘日外餘熱未解脉息未緩大便  
不快小便黄赤或渴或煩不得安睡不思飲食以邪氣未淨  
正氣未復當量其虚实調之  
、柴胡、芍藥、枳實、黄芩、生姜、知母、人參、地黄  
、麦門、甘草、七十味  
決方ハ大柴胡湯ニ半夏大黄ヲ去リ知母人參生芍麦門  
甘草ヲ加ヘタル者ニテ其症天大略大柴胡ニ似タレ氏  
其脉腹大莽胡ホドノ実ニタル處十ク又胸中ニ飲ラ畜  
フル様子モナク唯熱在胃トメ數日ヲ經津液枯燥メ解  
ルル一能ハサル者ニ用エ末邪ノ説ニ總テカヤウノ處  
ニ生芍ヲ主割トメ用エルハ実症ノ解熱ニ石羔ヲ用ル  
ト同故ニラ多ク用テ効驗多シ今決方ノ中ニ知母生芍  
ト組タルハ則実症ニ知母石羔ト組タルト同趣意ナリ

參胡三白湯蓋要治傷寒過經不解脈虛數人弱發熱或潮熱

口乾舌燥

參胡、人參、芍藥、白朮、茯苓

右五味煩熱不得眠者加牡蠣麥門

以方八通南衛生方ノ愚魯湯ニ三白散ヲ合シタル者十

リ以症ハ小柴胡湯ヲ用エハキ標ニ見エシ凡薑芍半夏

枳ト組合テハ一際スルトノ勢アリ是ハ脈虛數或ハ下

利枳アリテ動エスハ臣王力真武ノ証ニ陷ストナ牙

タ少陽ノ位ヲ出サシ者ニ用エ

四順清淨飲正字若湯澆火燒熱極通毒入裏或外被涼水所

及火毒内攻致生煩燥内熱口乾大便秘實者

連薤、芍藥、羌活、防風、當歸、蛇子、甘草、大黃

右八味

以方ハ湯火傷ノ内攻ノ寒熱アリテ煩躁便秘スル者ニ

用エ大抵ハ桂枝加竜蛇及救逆陽ニ宜シケレ凡寒熱

ノ症ハ以方適當トム



七腎散  
主治  
陽痿遺精  
後疾  
痛淋瀝  
不已  
或精神減  
食飲無  
味  
面色痿黃  
自汗盜汗  
腰膝不安  
茯苓  
山茱萸  
薯蕷  
牡丹  
地黄  
人參  
黃芪

七味  
安方  
八味  
地黄丸  
澤母  
去り  
人參  
黃芪  
著ラ  
加ル  
者ニ  
賜  
癰腫  
後ノ  
滋補  
ノミ  
ナラ  
ズ  
諸瘡瘍  
ニ  
運用  
スベシ  
場  
合ニ  
ヨリ  
テ  
ハ  
十金  
大補  
ヨリ  
効アリ  
余又  
傷寒  
差後  
下元  
虛弱  
ノ者  
ニ  
與テ  
服ス  
得ナリ  
四  
陰煎  
景岳  
以保  
肺清  
金ノ  
劑治  
虛虛  
勞損  
相火  
熾盛  
津枯  
煩  
渴  
咳嗽  
吐血  
多熱  
等証  
栗林  
先生  
曰  
此方  
實手  
滋陰  
大陽  
之  
上  
也  
地黄  
麥門  
芍藥  
百合  
沙參  
甘草  
茯苓

七腎散  
主治  
陽痿遺精  
後疾  
痛淋瀝  
不已  
或精神減  
食飲無  
味  
面色痿黃  
自汗盜汗  
腰膝不安  
茯苓  
山茱萸  
薯蕷  
牡丹  
地黄  
人參  
黃芪  
七味  
安方  
八味  
地黄丸  
澤母  
去り  
人參  
黃芪  
著ラ  
加ル  
者ニ  
賜  
癰腫  
後ノ  
滋補  
ノミ  
ナラ  
ズ  
諸瘡瘍  
ニ  
運用  
スベシ  
場  
合ニ  
ヨリ  
テ  
ハ  
十金  
大補  
ヨリ  
効アリ  
余又  
傷寒  
差後  
下元  
虛弱  
ノ者  
ニ  
與テ  
服ス  
得ナリ  
四  
陰煎  
景岳  
以保  
肺清  
金ノ  
劑治  
虛虛  
勞損  
相火  
熾盛  
津枯  
煩  
渴  
咳嗽  
吐血  
多熱  
等証  
栗林  
先生  
曰  
此方  
實手  
滋陰  
大陽  
之  
上  
也  
地黄  
麥門  
芍藥  
百合  
沙參  
甘草  
茯苓  
右七味  
痰多  
氣盛  
加貝  
母何  
膠天  
花粉  
決瀉  
不  
等  
無  
人  
新  
方  
ナ  
リ  
陰虛  
火動  
ノ症  
ニ  
ハ  
滋陰  
降火  
湯  
ヨリ  
効  
アリ  
降火  
湯  
ハ  
理  
密  
ハ  
ツ  
メ  
氏  
寒  
涼  
ニ  
過  
リ  
保  
肺  
清  
金  
ノ  
力  
及  
テ  
方  
ナ  
リ  
又  
此  
症  
ニ  
ハ  
虛弱  
浮熱  
汗出  
者  
ヲ  
ニ

治者同用雞肝丸為上策  
產後下利 心差散加車前子用  
六症了)

腸結病 四日或十日間大便燥  
結 然此丸取門塞迫甚服其  
漢洋兩藥經年之功 丁年息英  
李中子未可論煉之 腹工稿一

加毫骨湯ト又白薇ハ虚熱ヲ治スル効優トス故ニ將  
子ニ伍五五膏ニ伍五膏也  
七 成湯溫疫論治病愈後脉遲細而弱每至黎明或夜半後便

作泄浮者  
人參、附子、茯苓、五味子、甘草、破胡紙、右三味

此方ハ吳氏專ラ五更浮ニ用エル氏總メ老人脾腎ハ虚  
弱ハ下利足腫微腫ヲ入者ニ効アリ五更浮ハ多分

病ニ屬スル者ニ言テ抵真武湯ニ言テ治スルナリ  
四 苓散曰ク治煩渴思飲酌量與之若引過多自覺水停心下

名停飲説約ク四苓散用華薈水治霍日至妙  
即然苓散味去桂枝

此方ハ能霍月ウ治ス又腸胃ノ間水氣アリテ時熱下利  
之者ニ車前子ヲ加テ効アリ

四 腹飲 通治血熱便秘脉裏者  
當改ニ芍藥、大黃、甘草、右四味此方出局方名清涼

飲子或加地黃治腸胃燥熱血下者



陳

濕補氣湯 老兩腿麻木沉重無力多行喜笑口中涎下身

童如山謔声不出者

橘皮、薑蓐、柴胡、蒼朮、五味子、當歸、藁本、升

麻 薑 附 母 甘 草 七 十 一 味

然方  
腿風俗  
所謂醉  
上癮之  
者乃主  
藥上之  
色

禁ヲ嚴ニシテ方ヲ與ヘテハ稍保全スベシ若クハ症ニナ

濕熱甚者ハ會解ノ清濕湯ト二二方ノ至治孰讀スベシ

橄梅浮心湯本朝經臨

國朝文獻

即半夏好心湯方中加烏梅蜀椒

次方以蛇蟲入吐心下則痛乃愈又常以心下寒飲

心善者治之

易撮要方 函治續氣烏疳

人參、黃連、薑黃、右三味以方本出于丹溪實要附

吐衄血咳血心下痞難言目的之用惟氣  
才換聖堂也故之文之六不與

此方乃治一切氣逆胸膈不快  
之聖藥也

順氣湯治一切氣逆胸膈不快  
參用子葉蘇葉 蘇砂 甘草  
草一葉子 七為水 每服一匙入瑞滿湯  
煎服 衛生堂

蘇氏回春方名下痢噤口不食者脾胃熱甚也其名參連者始  
華氏回春方加參葉更故從極聖也

此方八元丹滯滯禁口痢下入門一見一タレトモ今運用  
諸氣疾直視煩悶二用テ即効アリ又吐血心下痞難

者二用テ音暖ヲ奏ス故二一雨清ノ象ニテハ卒病ノ要  
藥トシ之藥籠中一日モ不可無者ナリ此方ニテエカ又時

熱多湯ナリ熱胆人家不可不備ナリハ沈按方筆談ニ  
見エ

痰熱易格直治卒倒不知人事胸心悶窒大煩滿者  
人參二五連、熱胆、七三味先煮二味後入胆煇盡為度

順氣劑也吾人以順氣為治瘴第一義順氣者承氣也蓋取  
逆仲景承氣湯意也苟能識得此方臨機應變以治用之則

處劑治病可運放掌上矣  
茯苓、中夏、枳實、厚朴、甘草、生薑 七三味

此方八元丹滯滯禁口痢下入門一見一タレトモ今運用  
諸氣疾直視煩悶二用テ即効アリ又吐血心下痞難

者二用テ音暖ヲ奏ス故二一雨清ノ象ニテハ卒病ノ要  
藥トシ之藥籠中一日モ不可無者ナリ此方ニテエカ又時



瘧疾は必ヨリ必惡寒スルナリ兆トムシ東郭  
 設禁弱截瘧試驗方効如神  
 常山 檳榔 甘草 黑豆 神左

ハ嘔吐惡心ヲ十ニ或疾涎壅盛氣急或ハ癰腫疔毒ノ症  
 切要ニ是皆一氣ノ所為故及テ淡味ノ劑ヲ用シハ蓄飲  
 之ヲ得テズハ惡寒早ク緩リ即柔ヨリ剛ヲ制スルノ手  
 故ナリ今病者ニ臨テ苦味ニテ推入ヘテ症モナ  
 ク又芍藥甘草膠饅ノ甘味ニテ緩リベキ症ニモマテス  
 冷氣胸中ニ迫リテ鬱悶多慮スルニ用テ効アリ半夏厚  
 朴湯溫胆湯モ同類ノ方ナレ氏各主証アリテ少シクエ  
 テ處テ異ニスル也

護手湯同上吐家用之

即半夏乾姜人參丸方中去干姜加甘草

次方大半夏湯ノ趣向ニテ面向キ方也余ハ此處ニ專ラ

半夏乾姜人參丸方用之

常山湯同上截瘧劑

常山 知母 檳榔 七三味露宿服之

此方ハ蜀漆散ト同ク瘧ノ截藥ナリ常山ノ方數種アリ

氏此方最効アリ

乳岩初起  
核如紅乳位中  
小紫明如青皮  
結毒根外面腫起  
帶紅乳片小紫  
胡桔石  
十敗石  
將膿潰  
後此裏消毒  
類何天青皮散  
兼用之



栗園先生曰、萬疔瘡、用此菊花  
大黃ヲ加スベシト尚沈香ハ解毒ノ條  
ヲ閱スベシ

紅田東郭曰、菊花ハ疔毒ニ大効アリト  
云フ

淺田樗園師ハ此方ニ斷隔スナカテ  
續毒ニ用エリ

留東鄭氏ハ良布ヲ  
湯ニ浸メ疵口ヲムシ又今食用セザレ  
甚奇効アリトシテ

赤小豆湯、東洋治諸瘡、內攻腫、及毒、內攻氣、急、息、迫、  
赤小豆、高陸、麻黃、桂枝、及鼻、連薹、生薑、大  
黃、石、八、味、  
此方ハ山東洋リ麻黃連軀赤小豆湯ト同生ノ赤小豆湯  
ヲ斟酌メ組立シ方也諸瘡、內攻腫ヲ治スニ捷ナリ斯人  
及鼻ヲ善使用ス故ニ此方及琥珀湯再造散ニ伍メ最効  
アリ至示其響ニ敵ニ真武ニ及鼻ヲ加テ諸瘡、內攻、虛、腫  
ニ變シタル者ニ効ヲ得タリ  
十味敗毒湯、青洲治癰疽及諸瘡、腫初起、增寒、忙、熱、疼痛、  
羌活、獨活、桂枝、川芎、甘草、荆芥、防風、櫻皮、  
茯苓、生薑、右十味、今以撲椒、代櫻皮、  
此方ハ青洲ノ菊房敗毒散ヲ取捨シタル者ニテ荆敗ヲ  
リハ其力優ナリトス  
赤石脂湯、口上治痔、疾、藏、毒、及、直、脫、肛、  
即補中益氣湯方ヲ加赤石脂  
此方ハ脫肛及藏毒下血ニ効アリ後世羌活升麻ヲ升提

或人腰腹拘急痛甚シク兩脚急起起  
 小解ハス晝夜呻吟金匱云甘黃辛附湯  
 ヲ與ヘニ三日ヲ経テ痛全安シ蓋然症寒  
 病ハ屬ス  
 黄日黃辛附湯

生産後續テ胸脇煩悶心下動アリ劇ハ則身  
 振々搖ヲス先生診シテ南陽鐵砂湯ヲ  
 與テ全愈ト稱  
 不血ヲ患テ遠達黄胖也ヲシ血高ハサル者ニ尤  
 ノ方ヲ用テテ功ヲ奏ス知東郭  
 公主底里墨大鉄砂中 茯苓シヤ三上  
 三味稠ニラセシ後遠一多或ニ多ク隨症  
 ノ方ニ對シテ用テ日テ下血止セト

スル者トメ用エト其寒ハ柴胡ハ肝經濕熱ヲ解スル  
 故下部ノ瘡ニ効アリ升麻ハ犀角ノ代用ニスル位ニテ  
 清肅止血ノ効アリ此方モ東垣ノ理窟ニ拘泥セズ升麻  
 赤石脂ニテ下部ヲ清肅シ当飯後著白朮ニテ中氣ヲ扶  
 助スレハ自然ニ下部ヲ清ク者ト心得バシ

芍 甘黃辛附湯南陽治腹中及手足重急偏痛者

即芍藥甘草湯大黃附子湯合方

此方ハ芍藥甘草湯ニ大黃附子湯ヲ合シタル者ニテ南

涯ノ趣意ハ寧急ニ痛痛ヲ兼タル者ニ廣ク用エルナリ

近來ノ制方ナルハ古方ニ乃ラズ効驗アリ

鐵砂湯南陽理虛降短氣振暈虛煩或黃胖此方運用多端專

以鎮逆為主也

鐵砂、牡蛎、茯苓、桂枝、人參、蒼朮、甘草

七味續名方選為凡名鐵砂丸

此方ハ桂枝木甘草湯ニ鐵砂牡蛎人參ヲ加ヘタル者ニテ  
 黃胖或奔豚ハ症動悸甚シク振暈短氣ノ著ク治ス又下



血後動悸ニ用エ其方ト聯珠煎トハ症相近クメ鐵砂  
ハ胸動ヲ主トシ地黃ハ水分ノ動ヲ主トスル也  
舒筋溫胆湯蘭軒治痿壁栗園先生曰此諸痛癢癢痛效  
藥胡、芍藥、桂枝、茯苓、半夏、當歸、竹葉、羚羊  
木、釣藤、甘草、吳茱萸、右十二味  
此方ハ萬安方ニ據ルト雖出處未タ詳ナラズ近クハ伊  
澤蘭軒ノ經驗ニテ痿痺ヲ治スト云余ハ四逆散溫胆湯  
ノ變方トシ病症ニテ四肢拘攣腹裏拘急シテ心志不寧  
柳肝散トシヨリ其病一等重キ者ニ用テ効アリ  
葦根牡蠣湯微瀉新書治楊梅瘡毒痼疾沉痾臭名頑瘡及痔  
瘡瘰癧証

血後動悸ニ用エ其方ト聯珠煎トハ症相近クメ鐵砂  
ハ胸動ヲ主トシ地黃ハ水分ノ動ヲ主トスル也  
舒筋溫胆湯蘭軒治痿壁栗園先生曰此諸痛癢癢痛效  
藥胡、芍藥、桂枝、茯苓、半夏、當歸、竹葉、羚羊  
木、釣藤、甘草、吳茱萸、右十二味  
此方ハ萬安方ニ據ルト雖出處未タ詳ナラズ近クハ伊  
澤蘭軒ノ經驗ニテ痿痺ヲ治スト云余ハ四逆散溫胆湯  
ノ變方トシ病症ニテ四肢拘攣腹裏拘急シテ心志不寧  
柳肝散トシヨリ其病一等重キ者ニ用テ効アリ  
葦根牡蠣湯微瀉新書治楊梅瘡毒痼疾沉痾臭名頑瘡及痔  
瘡瘰癧証  
當歸、芍藥、川芎、大黃、升麻、牡蠣、黃耆、甘草  
更冬、萊根、右十味  
此方ハ水戸西山公ノ藏方ニテ楊梅瘡其他臭名ノ瘡  
ニ効アリ工藤球卿ハ痔瘡瘰癧ニ宜シ又氣岩脚癰腸癰  
ヲ治スト云卷キ下ハ西山公ノ秘録ニ見タリ

葶芎清肺湯 正原治肺熱鼻內癰肉初如核十日後漸大閉塞  
孔竅氣不宣通

葶芎、黃芩、梔子、麥門、石羔、知母、石膏、升麻

此藥集在九味

此方ハ腦漏鼻淵鼻中道内或鼻不聞香臭等ノ症凡テ熱

毒ニ傷ヌル者ニ用テ効アリ腦漏鼻淵ハ大抵葛根湯加

川芎大黃或ハ頭風神方ニ代毒丸ヲ兼用メ治スルハ熱

毒アリ疼痛甚キ者ハ此方ニ非シハ治スルヲ能ハス

収嗽湯傳嬰須知治ハ兒頃嗽兼咽者

炙門、貝母、枳榔、百部根、甘草、右五味

此方ハ頃嗽ハ此ヲ兼ル者ヲ治ス試ムハ先人濟庵翁

ハ此症ニ鴈鴒菜思冬甘草三味ヲ用テ効ヲ取シテアリ

又古人理中安蛇湯ヲ頃嗽ニ用ルヲ有治療ハ廣ク考定

不

新續命湯有持桂里治小兒發搐壯熱與汗煩躁者

麻黃、石膏、芍藥、桂枝、羚羊、葛根、甘草、右七味



東醫集方 小兒驚風 驚風之因 引揚  
引用ハナリ 功アルモノナリ

或人腹痛 患時を察ムハ口清水シセシ  
右腹在脉ニ當テ動悸甚クシテ腹ヤ痛  
リ急ニ便ヲ為シ快通ヤ入食ヲ得ハ痛  
益甚シ急ニ續服トシ或ハ病トシ之ヲ治シ  
テ動ナシ余謂フ積ヲノ疾 朝吐クハキニ非  
ス先其沉痾ヲ鼓動シテ腹蛇ヲ驅ルハ  
シト決方ニ起發大ニ車用シテ其痛行ニ  
減シ後三年其病全愈テ疾ヤハ痛

蒿薇湯 治口瘡

此方ハ小兒一時吐熱甚ク發熱スル者ヲ治ス外感ノ発  
熱ハ痙病ト同シ丁ニ蒿薇根湯ニテ大抵宜シケル氏大  
湯煩躁スル者ハ此方ヲ宜トス又大人中風ノ熱症ニモ  
與フバシ

蒿薇根、桂枝、甘草 七ニ味言テ千金治口瘡蒿薇湯

黃蘗升麻 地黃蒿薇根然不如以湯連提

此方ハ大病ハ人口瘡口瘡ニ或ハ口中糜爛シテ藥食共

ニ成スル者ニ用テ即効アリ一時ノ權宜ニ備フバシ

七味 鷓鴣菜湯 同上治吐腹痛屬蛇者

黃連、桂枝、半夏、大黃、鷓鴣菜、甘草、乾姜

七ニ味 吐症ハ蛇虫ニテ吐腹痛スル者ヲ治ス椒梅浮心ト類

方ナレバ彼ハ安蛇ヲ主トシ此ハ殺蠅ヲ主トスル也

浮白散 東垣

桑白皮、地骨皮、茯苓、人參、橘皮、五味子、甘草

一男子年五丁忽發狂言罵詈訕一親戚  
ヲ避ク高ニ登リテ歌ニ衣ヲ棄テ走り廻リ  
燥熱シテ煩渴引飲ム余方方與之  
鼠膏一錢之豆八分胡椒タカ石三  
九ニ錢ニ與テコレヲ攻シ蛇ヲ出ス  
數外ニシテ疾頓ニ退キ二十日ニシテ全  
愈○一女子四歲腹滿甚クシテ下利日ニ  
數十行口渴シテ冷水ヲ飲ム好ミ悉ニ  
瓜果生冷ノ物ヲ食メ肉黃瘦シテ愈ザ  
ル一男子年余乃方及第丸ヲ與フル  
一丸五十劑ニシテ諸証全愈幸甚

若滿牙疼屬舌乾而渴者服日熱痛如灼  
赤脈怒張或頭痛肩後骨痛煩渴者如虛  
良藥用應驗數時以茶飲之又名狂症服  
中加大聲安眠放歌高聲笑聲踰垣狂走

、梗米、青皮、右九味  
七味降氣湯治一切水腫  
芍藥、茯苓、不通、半夏、薄荷、桑白皮、白檀、七味

此部

白虎湯傷寒 治大渴引飲煩燥者

知母、石膏、甘草、粳米、右四味  
此方ハ邪熱肌肉ハ向ニ散漫メ大熱大渴ヲ發シ脈洪大  
或滑數ナルモノヲ治メ成實ニハ攻方ヲ辛涼解散清肅  
肌表ノ割上云テ肌肉ノ向ニ散漫メ汗ニ成ント必余一  
イキ出キヲ又者ヲ辛涼ノ割ヲ用テ肌肉ノ分ヲ清肅メ  
ヤレバヒ一テシマル勢ニ榮シカケタル汗ノ出キルヤ  
白ニナル也譬ラ言ハ糟袋ノ汁ヲ干ニテシメテ緩リキ  
ツテ仕舞フ道理ナリ是故ニ白虎ハ承氣ト表裏ノ割ニ  
テ同シ陽明ノ位ニテ又表裏俱熱ト云或ハ三陽合病ト  
云テ胃實ヲハナク表一平キ方ニ用エル也  
白虎加人參湯口上治前症兼下痞軟者



不共湯引飲晝夜不眠者亦加黃連湯三  
日日用藥足取後家數行又可用蓮水法必  
有効又清濁脈洪數晝夜引飲不歇者  
唇乾舌潤肢體煩熱更甚肌肉日消鍊者又  
治瘧病大熱如燄譫語煩躁汗出淋漓心下痞  
蕪渴飲量度者尾葉

即白虎湯方中加人參

此方ハ白虎湯ノ症ニノ胃中ノ津液乏クナリテ大煩渴

ヲ發スル者ヲ治ス故ニ大汗出ノ後カ誤下ノ後ニ用エ

白虎ニ此ニハ少シ裏面ノ藥也是以表症マレハ用ニ

一カテス

白通湯日と治下利腹痛厥而頭痛者東洞翁曰富有氣逆症

葱白、乾姜、附子、人尿 右四味

此方ハ四逆湯伯仲ノ藥ニテ葱白ハ湯氣ヲ通スルヲ主

トシ人尿ハ陰物ヲ散テ其真寒ノ陰邪ト一和ヤシムル

ノ手段ニテ西洋金匱學ノ組合トハ負ニ異ナリ

白通加猪胆汁湯日と治白通湯症而厥逆乾嘔躁者

即白通湯方中加猪胆汁

此方ハ通脈四逆湯ニ猪胆ヲ加ルト同シ轉彼條ニ見エ

本邦老臣傳ニ云此方唯吐瀉ノミナラス中風卒倒ハ見

慢驚其他一切暴卒ノ病脱陽ノ症ニ奇効ヲ建ルアリ

一方ヲ勸力也色ニ使フ肝要ナリ

霍乱吐泻在身體灼熱頭疼身痛大渴煩躁  
脈浮大者宜大方  
溫瘧者其脈平身無寒但吐骨節  
疼痛時起

白虎加桂枝湯 治白虎湯而上衝者

此方ハ温瘧ヲ治ス温ハ温病ノ温ト同シク寒ナクナ  
熱スルヲ云ク病骨節煩疼力目的ニテ肌肉ノ間ニ散漫  
スル邪カ骨節マテ迫リ榮セヌ煩疼スル故辛涼解散  
ノ劑ニ桂枝ヲ加テ表達ノ力ヲ收ニスルナリ他病ニ  
モ上衝シテ頭痛ナト劇シキ者ニ効アリ中風タチニ  
用エ東洋ハ此處ニ白虎加黃連ヲ與ルト云

白虎散料同上

白朮 川芎 蜀椒 牡蠣 右四味

此方ハ妊娠胎寒ノ者ヲ治ス懷妊中濁水ナトヲ漏シ腰  
冷ナドヲ覺ル者ニ用ユベシ大抵ハ温經湯ニテ事スル

ナリ養胎トアル代常服ノ藥ニハアラズ

檳榔散 外臺療吐酸水每食則變作酢水出

換榔 茯苓 人參 橘皮 厚樸 右五味

此方ハ胃中不和水氣アリテ吞酸或ハ毎ニ吐水スル者



ニ用テ効アリ蓋茯苓飲ノ症ト混スヘカラス彼ハ停飲  
宿水ヲ吐メ後心胃中ニ虛氣滿テ不食スル者ニ用エ坎  
方ハ吐水スレハ一旦快然トナル者ナリ又五苓散ノ水  
逆ハ水口ニ入シハ即吐スル者ニテ坎方ノ吐水トハ夏

ニ異ナリ

棋榔散聖惠治脚氣春夏防葵宣散坎疎風調氣

、桂榔、枳實、大黃、獨活、茯苓、羚羊、沉香、川芎

、甘草、石九味

坎方ハ年々春夏、足脚氣ヲ榮シ而脚微腫或痛疼ヲナ  
シ步履自由サスニ微熱短氣アル者ニ効アリ余嘗テ周  
老松平周防侯毎身脚疾ニテ困難ヤシテ坎方ヲ與テ全  
愈セリ陳修園ハ坎處ハ雞鳴散ヲ用エシ氏坎方ヲ以優  
トス

白薇湯本事人平居更苦疾忽如死人身不動搖默々不知人  
目閉不能開口唇不能言或微知人或覺聞人声但如脂冒  
後時方寤名曰驚冒又名血厥婦人多有之徐靈胎曰坎病

一女子二十餘、外感後咳嗽、聲啞、久不愈、  
 羸瘦、短氣、心志鬱塞、殆三年、  
 醫治、療之、人言、診曰、病肺痿、屬不  
 幸、經年、斷之、林細、散、ナラ、或、救、フ、  
 因、百、合、固、金、湯、ヲ、與、之、  
 數、旬、ニ、テ、常、復、ハ、格、

沿水病喘滿、心下痞堅、上氣而渴者、兼用沿  
 胸丸或經實丸、要喘滿者、少効、學者、疑  
 焉、

最多而婦科皆不知、  
 白薇、芍藥、人參、甘草、右四味  
 此方ハ婦人、子、倒、暈、絶、ノ症、ヲ、治、ス、白薇ハ總、テ、血、症、ヲ、治、  
 ス、子、至、方、産、後、ノ諸、方、微、ニ、ハ、シ、  
 百合固金湯、通雅、治、肺、傷、咽、痛、喘、咳、痰、血、栗、園、先、生、曰、虛、勞、肺、  
 痿、咽、痛、甚、者、宜、  
 百合、芍藥、甘草、麦門、冬、散、  
 去、參、  
 此、方、ハ、咽、痛、咳、血、ヲ、主、ト、ス、咳、血、ハ、肺、傷、傷、麦、門、冬、湯、地、膠、  
 連、ニ、テ、大、抵、ハ、此、ニ、ハ、咽、痛、劇、者、ニ、至、テ、ハ、此、方、ニ、非、  
 レ、ハ、効、ナ、シ、

水防己湯、  
 水防己、石羔、桂枝、人參、右四味  
 沿水病喘滿、心下痞堅、煩渴而上衝者



和胃曰在方之支飲之喘滿心下痞生  
目的ナリ

老脚氣一身而月浮腫心下硬喘滿氣急咽  
燥口渴二便不利胸動甚者兼用鐵砂煨  
物九粒買丸可也

此方ハ腸間支飲アリテ致逆倚息短氣臥スヲ得ス其  
形腫ル、カ如キ者ヲ治ス腸間ノ水氣石羔ニ非ルハ墜  
下スルヲ能ハス越婢加半夏湯厚朴麻黃湯小青龍加石  
羔湯ノ石羔皆同義ナリ其中桂枝人參ヲ以胃中ノ湯氣  
ヲ助テ心下ノ痞堅ヲエルノ木防己ニテ水道ヲ利スル  
策妙ト云ベシ

木防己去石羔加茯苓芒硝湯曰上治前症而不煩渴使不利者  
即木防己湯方中云石羔加茯苓芒硝  
此方ハ水氣久シク去テ入唇口其皮堅厚ニハ枯燥シ聲  
ハ枯木ノ潤澤ナキカ如ク心下痞軟胸中不利微シク喘  
氣ヲル者ヲ治ス但シ前方ニ石羔ヲ去硝ヲ加ル者ハ其  
利己ハ散シテ復聚ルルハ堅定ノ物有テ固テ包裹ス  
ルカ故ナリ故ニ芒硝ヲ以テ其堅定ノ物ヲ要ニスルナ  
リ茯苓ハ木防己ニ加援メ飲ヲ引テ下行スル也  
木香分氣飲葉氏治氣滯腫滿虛氣上衝神思不爽  
水香、茯苓、澤母、半夏、枳實、蘇子、枳櫛、楷苓

右ハ味  
以方ハ氣分腫ヲ主トシ桂姜棗草黃平附湯枳朮湯ニテ  
大概ハ治スルハ氣滯甚シク虛氣上衝ノ醫塞スル者ハ  
以方ニ宜シキナリ

世部

小青龍湯傷寒

治咳嗽上衝頭痛發熱惡風乾嘔者。

麻黃、芍藥、乾姜、甘草、桂枝、細辛、五味子、干  
夏、右ハ味易簡本方中干麻黃加人參茯苓杏仁生薑名  
杏子湯

一女子四十生ナカラニシテ哮喘ヲ患フ  
其形短小ニシテ八九歳ノ兒ノ如シ發熱  
時喘促シテ痰ヲ吐ク致シテ息スルヲ  
得ズ坐シテ臥テアタタ全ク方及ニ痰痰  
九ヲ作テアタタ時々紫セニテコレヲ改ルナド  
出入スル一ニ年所ニシテ其疾愈ミ  
再發セズ其形盛大ニナリ漸々常人ト異  
テス方便貴人  
身即若白湯ニ持病ノ喘息ニ用  
テ功アリ麻杏ノ組ミ方ハ哮喘  
ノ症ニ功アリ

以方ハ表不解而心下水氣アリテ哮喘スル者ヲ治ス又  
溢飲ノ咳嗽ニモ用エ其人咳嗽喘急寒暑至ヒ必發  
シ痰沫ヲ吐テ臥ス丁解ハエ喉中シハメク扱ハ心下ニ  
水飲アレハ也以方ニ宜シ若シ氣煩躁アレハ石羔ヲ加  
フニ又胸痛頭痛寒汗出ルニ發汗劑ヲ與フ禁法





一女子年十八、咳嗽痰多、氣上衝、頭目昏眩、四肢倦怠、心志多驚、寒熱往來、飲食味、ヒナク、日三、脈、瘦、シ、愈、サ、ル、一、年、許、數、延、皆、勞、瘵、ト、入、手、診、を、脇、肋、妨、腹、ス、乃、小、柴、胡、加、桂、湯、乃、之、痰、疾、セ、ウ、嗽、テ、腹、セ、シ、ル、一、三、月、許、シ、テ、全、効、ヲ、収、ム、古、方、原、覽、張、介、賓、曰、決、方、加、常、山、ニ、才、裁、瘵、カ、神、

若見胸骨突起、胸者、專用柴胡、或南呂、九、是、聖、漢、時、方、也、

其鐵藥ヲ施メ治セザル者、決方ニテ速ニ愈、仲景ノ言、欺、ノ、バ、カ、ラ、ム、又、十、里、食、停、ニ、外、邪、相、兼、或、ハ、瘧、ノ、如、キ、元、決、方、ニ、テ、解、ス、又、久、シ、ク、大、便、セ、ザ、ル、者、決、方、ニ、テ、經、絡、大、便、ヲ、通、シ、病、解、ス、ル、者、也、上、焦、和、シ、津、液、通、ツ、ル、ノ、義、ナ、リ、後、也、三、禁、湯、ト、名、ツ、ク、ル、者、ハ、蓋、汗、吐、下、ヲ、禁、ス、ル、處、ハ、用、ユ、ル、カ、故、也、又、決、方、ニ、五、味、子、乾、姜、ヲ、加、テ、風、邪、胸、脇、ニ、迫、リ、舌、上、微、白、胎、アリ、テ、兩、脇、ニ、引、テ、咳、ス、ル、者、ニ、用、ユ、治、驗、ハ、本、草、衍、義、ノ、序、例、ニ、見、ユ、又、葛、根、草、葉、天、花、粉、ヲ、加、テ、寒、熱、瘧、ノ、如、ク、咳、嗽、甚、者、ニ、用、ユ、東、郭、ノ、經、驗、ナ、リ、其、他、吳、仁、齋、小、柴、胡、湯、加、減、法、ノ、如、ク、ハ、各、方、ノ、下、ニ、辨、ス、故、ニ、贅、セ、ス、

小  
酒、胸、陽、口、上、治、小、結、胸、者、

黃、連、半、夏、桂、枝、仁、古、三、味、

決、方、ハ、飲、邪、心、下、ニ、結、シ、テ、痛、ク、者、ヲ、治、ス、桂、枝、實、ハ、痺、ヲ、主、ト、ス、金、匱、胸、痹、ノ、諸、方、以、微、ス、バ、シ、故、ニ、名、臣、類、按、ニ、ハ、決、方、ニ、テ、孫、王、蕩、述、セ、胸、痹、ヲ、治、シ、張、氏、區、通、ニ、ハ、熱、疾、賜、



草朴三物湯名別疾腹痛甚而裏急後重者甚  
 此方以麻黃治陽氣胸腹大快下通  
 者常湯食以方藥備急用豆之腹病  
 甚加芍藥也

上二在者ヲ治之其他冒滿ノ壅リ氣ヲツカシク或ハ嗜  
 雜或ハ腹鳴下利シ或食物進マズ或胸痛ヲ治ス羽向宗  
 元ハ此方ニ芒硝甘草遂薄麻山梔子大黃ヲ加テ中陷胸湯  
 ト名驚風ヲ治ス此方意ハ及テ大陷胃湯ニ近シ  
 小承氣湯同上治腹滿而大便難者

・大黃、厚朴、枳實 右三味

此方ハ胃中邪氣ヲ輕ク泄下スル也本論ニテハ燥屎ノ  
 有要ヲ以テニ陽ノ別トス後世ニテ大承氣ハ三焦痞滿  
 ヲ目的トシ小承氣ハ上焦痞滿ヲ目的トスル也燥屎ノ  
 候法鍾々アレ氏其の切ハ燥屎アルモノハ脐下ヲ按メ  
 物アリ是摸ルハ肌膚カハク也燥屎ト積氣ト見誤ル  
 有エレハクルクルト手ニ按シテ大抵シル、ナリ燥  
 屎ハ按ハ癰ガナク積ハ痛テ自ラ發熱キガハアリ且下  
 焦ニアルノミナラズ上中焦トモ上ル也此候ナクハ朝  
 熱譫語ニシ者此方ニ宜シ又此方ヲ聖古ハ中風ニハ續  
 命ト云ヤ用テアリ

一男子年六十有餘腹痛者三月三月  
形體衰減或時令人持三匙上三伏不  
能動及復顛倒者近三月三月三月  
之腹皮垂急之方以方之與ル一割ニシテ  
知リニ割ニシテ諸症漸退キニ割ニシテ歩  
シテ門ヲ出ツ又診ニシテ下ニ格ニテ良味美  
ナアナルヲ即改ニシテ湯ヲ作テ與ル一割  
六割ニシテ全愈ニシテ方便覺

一男子年四十餘高水ハムスル下七八年心  
下痞堅ニシテ腹中水声アリテ止時ナク腹  
氣冷カク自覺寒テ食食ヲキカズ諸症悉  
スルヲ得ズ年乃改方ヲ作テ與ル全愈ニシ  
一男多男子出水病ヲ患ニ月ニ數番水ヲ吐ル

小建中湯口上治裏急腹皮拘急及急痛者  
即桂枝湯方中倍芍藥加膠饅

此方ハ中氣虛ハ腹中ノ引ハリ痛ヲ治ススベテ古方書  
ニ中ト云ハ脾胃ノ一ニテ建中ハ脾胃ヲ建立スルノ義  
ナリ此方ハ萊胡蘘甲延年半夏解勞散十ドノ如ク腹中

ニ痞癰アリテ引ハリ痛ト異ニメ唯血ノ乾キ喉ニ腹皮  
ハ拘急スル者ニテ強ク按セハ底ニ力ナク譬ハ琴ノ糸  
ヲ上ヨリ按カ如キナリ積聚腹痛十ドノ症ニテモスベ

ラ建中ハ血ヲ潤シ急迫ノ氣ヲ緩メルノ意ヲ以テ考ヘ  
用ベモ全体腹クサクサトメ奥カソノ内ニコハカシコ

ニ凝アル者ハ改湯ニテ効アリ即後世大補湯人參養榮  
湯ノ祖ニメ補虛調血ノ妙ヲ寓ス症ニ臨テ汎リ運用ス

旋覆代赭石湯口上治心下痞噯噯不除者  
旋覆花、甘草、大棗、人參、生姜、半夏、代赭石  
右七味



升筋腹痛止之大使不通百効動ナシ来テ訪  
ヲ云々示、其方ヲ以テ起痰ヲ用スルヲ三  
旬ニシテ吐水全愈唯腹中雷鳴時ニ痰氣  
アリハ下虚證足証微腫ニ余飲食ヲ攝  
養セシメ、君子湯加旋覆散黃連ヲ以テ  
ルハ數回ニシテ全愈、  
吞酸嘔噦下症、  
穀者亦良

凡諸病痰飲、卒迫咽噎閉塞不得息湯藥不下  
咽者非此方不能開通也當先以此方解其急而  
後處方從宜加減隨其効尤速又若噎逆  
右症生薑半夏湯方法即可用

吐而思水者、  
吐水者、  
格、  
散、  
諸、  
疾、  
水、  
三、  
五

吐方ハ生、  
病解後、  
生、  
効アリ又下利止マズハ吐シ宿水ヲ吐スルニ効アリ  
一ハ紐結ニ宜シク一ハ下利ニ宜シ其妙表裏ニアリ拘  
ルハ力ヲ及又噎逆水飲ニ属スル者ヲ治ス周揚俊曰予  
用此方以治及胃噎食氣逆不降者神効ト又試ムベシ  
小青龍加石羔湯金匱  
即小青龍湯方中加石羔  
張見予前  
小半夏湯同上  
半夏生薑  
此方ハ吐家ノ聖劑ナリ其内水飲ノ吐ハ極ラ宜シ水  
飲ノ症ハ心下痞軟シ背七ハ推ノ處平掌大ノ如ヤ程ニ  
限リテ令ル者ナリ此等ノ証ヲ目的トメ此方ヲ用ルハ  
ハ百發百中也又胃虚吐酸不得下者先此方ヲ服セシ





前胡建中湯同上治大勞虛勞寒熱吐逆下焦虛熱小便赤痛  
客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾

芍藥、桂枝、半夏、茯苓、黃芩、當歸、柴胡、人參、  
甘草、生姜、白朮、七十一味

此方ハ董奉建中湯ノ變方ニシテ樂令建中ノ祖ナリ男女  
積冷氣滯或ハ大病ノ後常ニ復ヤス四肢沉重ヲ苦ミ骨  
肉ヤヤ痛吸々トメ氣少ク行動スルハ喘乏胸滿ヲ氣急  
シ腰背強ク痛ミ心中虛悸シ咽乾キ唇燥キ面體色ヲク  
飲食味ナク胃肋脹滿シ頭重クメ痺ラズ臥テ多ク起テ  
少ナク少腹拘急シテ羸瘠スル者ニ用エ凡虛勞ヲ治ス  
ルニハ大溫補ノ劑ニシテ臣王叔和ヨリハ建中ニシテ  
桂枝湯千金方本治脚氣心煩肉氣急不安栗固先生曰治脚  
氣吐逆効

、桂枝、半夏、茯苓、桂枝、甘草、生姜、七十一味

此方ハ脚氣吐氣アリ不衡心セントスル者ヲ治ス何唐  
侍中ノ一方ニ七ニルハ其症輕シ故ニハ桂枝湯ノ方アリ

又此症ニノ水氣上部ニ盛ナル者ハ犀角旋覆花湯ヲ與

生姜甘草湯今金匱肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

、生薑、人參、甘草、大棗、七四味

此方ハ肺熱候ナキ者ニ用エシカシ甘草乾姜湯ニ比ス

レハ潤燥ノ劑也故ニ甘草乾姜湯ハ肺寒ヲ主トシ聖濟

人參養榮湯ハ肺熱ヲ主トシ此方ハ其中間ニ之ノ者也

正觀湯外薑煎刺腹中切痛下黑色晝夜白行將死者

、黃連、龍骨、白朮、當歸、附子、赤石脂、乾姜、阿

膠、石ハ味

此方ハ痢病ノ壞症ニナリテ百行止ニ之魚腸ノ如ク或

黒癍ハ物ヲ下シ切痛甚者ヲ治ス後世ニテハ真人養臟

湯ヲ用エレバ此方ノ力タ其力優ニメ虛熱アル者最宜

トス

旋覆花湯口上生胸膈痰結唾如膠不食

、附子、旋覆、細辛、萊菔、甘草、茯苓、半夏、生薑



福井杭亭曰支飲胸膈實症、強  
 支心之心交濕、咽恒喘逆、氣急  
 不寐臥者、重而施、重而施、尤  
 効若此症、心下堅硬、水飲支結  
 甚、或監以湯、再復者、宜本防  
 已玄石加茯苓

桂枝 七九味 原用烏頭今代用子  
 以方ハ淡飲胸膈ニ凝結シ飲食ニカ爲ニ阻滯シテ下ラ  
 不其症胸膈ニ凝結シ心下ニ停食アリテ真ノ胸膈ニ  
 マラズ數日解セサル者ヲ治ス  
 旋覆花湯 聖荷治支飲胸膈實者呼吸短氣東園先生曰本防  
 己玄石加茯苓芒消湯証而屬熱實者宜以湯  
 旋覆花、枳實、柴胡、桂枝、桑白、礬石、大黃、甘草  
 右八味  
 以方ハ本防己湯ノ症ニハ飲結今一萼甚シク支飲ノ治  
 マ旋花動カサレ者ヲ治ス胸膈實者ト云カ以方ノ目的  
 ニラ心下痞堅ニ云トシニ非ズ胸膈ニ痞ハ喘アリ咽  
 乾ハ氣息臥スヲ得ス下証アル者ニ用ユ又以方ヲ與  
 テ諸症緩ムト雖復養エル者本防己湯ニ宜キヲアリ參  
 照ノ互ニ用ユ  
 小柴胡加地黃湯 本事始婦人室女傷寒發熱或寒熱經水  
 不通或通斷晝則明了夜則譫語如見鬼狀示治產後惡露

或婦人產后小便淋瀝痛甚或則三三痛小便  
痛トシ數月愈エス先生方加施丹ラ  
與一消石大山ヲ兼用ス數日ニシテ寒熱去  
リ少腹塊和シ小便淋瀝故ノ如シ指メ之  
易大黃ヲ與ハ氣鬱滯ヲ兼用ス不日  
全愈ヲ得タリ也  
女寧全目眩日又ク兩脚力ナク心  
志舒ビエ時々寒熱ヲ發シ胸  
中煩悸之其症虛勞トシテ處方  
ニモ不レ治ス上盛下虛トシテ道  
遠方カ地產者附子并妙香和

方未忽爾斷絕

即小柴胡湯方中加地黃

此方許叔微熱入血室ノ主劑トス經水ノ通斷ニ拘ラズ  
血熱ノ甚者ニ効アリ凡血熱ヲ治スルニ三等ノ別アリ  
頭疼面赤耳鳴齒痛ノ者ハ小柴胡加石膏ニ宜シ血氣刺  
痛心下ニ衝逆シ吐ハス者ハ小柴胡加紅花ニ宜シ五  
心煩熱日晡瘧ノ如ク寒熱ヲ發スル者小柴胡加鮮草ニ  
宜シ之

逍遙散局方治血虛勞倦五心煩熱頭目昏重心忪煩赤發熱

盜汗及血熱相搏月水不調脘腹脹痛寒熱如虛

・柴胡、芍藥、茯苓、白朮、甘草、生薑、

右八味或加麥門向膠治血虛發熱不止或勞嗽者或加地

黃芩草治血虛發熱者一去甘草加橘皮牡丹貝母黃連各

匠貫逍遙散治一切諸証似瘧者但其人口苦吐清水或

或苦水面青脇痛耳鳴脈濡

此方ハ小柴胡湯ノ變方ニメ小柴胡湯ヨリハ少シ肝虛



ノ形アルモノニナ医王湯ヨリハ一層午前ノ場合ニエ  
ク者ナリ此方專テ婦人虛勞ヲ治スル云ハ凡其実ハ体  
氣甚外強壯ナリテ子生血氣薄ク肝火元リ或寒熱往來  
或頭痛口苦或煩赤寒熱如瘧或ハ月經不調ニテ中分々  
ハ或ハハ便淋瀝痛俗云セウガクハ如ク一切肝火  
ニ引輝ケ申分アルモノニ効アリ内科摘要ニ牡丹皮山  
梔子ヲ加ル者肝部ノ虛火ヲ鎮ケル手段ナリ譬ハ産前  
後ノ口赤爛エル者ニ効アルハ虛火上炎ヲ治スルハナ  
リ東郭ノ地黄垂附子ヲ加ル者以裏ニテ肝虛ノ症水分  
ハ動悸甚ク兩脇拘急ノ思慮窮結スル者ニ宜シ  
清心蓮子飲口上治心中煩躁思慮窮愁抑鬱小便赤濁或有  
沙漠夜夢遺精遺瀝流痛小便赤如或酒色過度上盛下虛  
心火上炎肺金受剋故口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠男子  
五淋婦人帶下赤白五心煩熱以藥溫平清心養神秘精  
蓮肉、人參、黃芪、茯苓、麥門、地骨皮、車前子  
、黃芩、甘草 石九味

此方ハ上焦ノ虛火元リテ下元之カ爲ニ守ラ失モ氣淋  
白濁等ノ症ヲナス者ヲ治ス又遺精ノ症桂枝加龍蚘ノ  
類ヲ用テ効ナキ者ハ上盛下虛ニ屬ス此方ニ宜シ若心  
火熾ニシテ妄夢失精スル者ハ龍胆泻肝湯ニ宜シ一併以  
方ハ脾胃ヲ調和スルヲ主トス故ニ淋疾下疳ニ困ル者  
ニ非ス又後世ノ止淋湯ハ正散ノ之ク處ニ比スルハ虛  
候ノ者ニ用ユ名匠方考ニハ勞淋ノ治効ヲ載ス加藤謙  
齋ハ小便餘瀝ヲ覺ル者ニ用ユ余數年歷驗スルニ勞動  
力作シテ淋ヲ發スル者ト病家ナトニテ小便ハ佳ナリ  
通入レ氏師ニ殘ル心持アリテ了然タラザル者ニ効アリ  
リ又咽乾ノ意アリテ小便餘瀝ノ心ヲ覺ルハ猶更此方  
ノ的當トス正宗ノ主治ハ據トスルニ足ラス

清暑益氣湯内外傷辨治長夏溼熱大勝人感之四肢困倦身  
熱心煩小便少大便澀或渴或不渴不思飲食自行

人參、白朮、橘皮、黃蘗、神麴、澤瀉、芍藥、青皮、  
麥門、葛根、五味、黃芪、蒼朮、升麻、甘草、右五味



此方ハ注夏病ノ主劑也虛弱ノ人夏ニテハ氣衰大倦  
急シ或ハ泄利或ハ之喘シ四肢煩熱スル者ヲ若ク此方  
東垣ノ創意ニテ多味ニ過タリ即効ヲ取ニハ近製ノ方  
ヲ用ユベシ老人十トノ持藥ニハ此方宜トス餘ハ近製  
方ノ條下具ス

喘理中湯曰春治寒喘四肢逆冷脈沉細

、蘇子、縮砂、厚朴、桂枝、沉香、木香、橘皮、甘草

、干姜、右九味或加附子

此方ハ寒喘ヲ主トス傷寒瀉方ノ喘ハ抵大死証ナリ此

雜病ニ在テハ然ラズ寒飲ヲ溫散スルハ愈ルモノ也但

四十次上ノ人平然トテ喘息ヲ發シ四肢厥冷スル者肺

絶ノ候也不治トス

喘四君子湯曰上若短氣凡氣短而喘者呼吸短促而寒痰声

也  
人參、茯苓、厚朴、縮砂、木香、蘇子、桑白、芍藥

、白朮、**沉香**、**橘皮**、**日草**、**石十二味**

此方ハ注夏病ノ主劑也  
急シ或ハ泄利或ハ之喘シ  
四肢煩熱スル者ヲ若ク  
此方東垣ノ創意ニテ  
多味ニ過タリ即効ヲ  
取ニハ近製ノ方ヲ用  
ユベシ老人十トノ持  
藥ニハ此方宜トス餘  
ハ近製方ノ條下具ス

清心温膽湯

此方ハ其人胃虚ノ時々喘息ヲ發スル者ニ宜シ熱ナク  
シテ短氣カ主ニナル症ナキ若熱アルハ一旦麻杏甘石  
ノ類ヲ用テ解熱スバシ当飯ヲ廢ニ用ヰルヲ約々説  
ト氏千金藥錄子湯消肺湯姜貝蘇葉湯ノ類皆降氣ヲ主  
トスル也本草ヲ精究スバシ

清心温膽湯 主治 肝火代疾 眩暈 諸病之疾

麦門冬、川芎、人參、遠志、當歸、白朮、芍藥、茯苓、  
橘皮、枳實、半夏、竹筴、荷葉、黃連、甘草、石菖

散 右十六味 同春名清心抑膽

此方ハ千金温膽湯ノ症ニ肝氣元盛ノ者ヲ治ス温膽  
湯ハ辛ニ觸テ驚キ易ク臥寐シ難キ者ハ心胸中畜飲ノ  
故ナリソレヲ輕ク疏通スルハ愈以方ハ一萇重ク肝氣  
元リテ心下兩脇ハカケラ拘急心氣鬱塞シ或ハ怒火類  
ニ動キ病狀ヲ為ス者ニ宜シ竹筴温膽湯ト髣髴スル氏  
以方ハ四逆散ノ意ヲ害メリサテ方名ヲ抑膽ニ作ルノ  
益膽ニ作ルト議論アル氏矢張温膽ニ作ルカ體ナリ



東郭氏曰此方老人久咳ナドニモ奇功  
フル者ナリ

清肺湯口上治一切咳嗽上焦痰盛或久嗽不止或勞怯或久

嗽声哑或喉生瘡者是火傷肺金并宜此湯

桔梗 茯苓 橘皮 桑白 當歸 杏仁 枳實 芍藥 甘草 貝母 甘肅 右十味

以方八服火咳嗽ノ藥十一以虛火ノ方ニ屬ス若痰火純

實ニ大脉滑數ナル者ハ驚氏ハ瓜蒌枳實湯ヲ用ル也肺

熱アリテ兎角セキノ長引タル者ニ宜ニ故ニ小青龍加

芍藥湯ナドヲ用テ効ナク勞嗽ヲナス者ニ用エ方後ノ

按ニ久嗽不止成勞怯者トアリ着眼スベシ

清上防風湯口上治頭面瘡癰風熱毒

荊芥 防風 枳實 黃連 薄荷 枳實 連翹 白芷

狂狹 川芎 黃芩 甘草 右十二味加石膏或大黃

以方八服熱上焦ノニニ燭ニ頭面ニ瘡癰毒腫等ノ症ヲ

ニ以唯上焦計ノ一二ニ中下ニ焦ハ分サズテ壅滯スル

ヲナケルハ下ニ向テスカス理ハ十ニ故上焦ヲ清解發

散スルニ故ニ上防風通聖散ノ如ク硝黃滑石ノ類ハ用

散スルニ故ニ上防風通聖散ノ如ク硝黃滑石ノ類ハ用

散スルニ故ニ上防風通聖散ノ如ク硝黃滑石ノ類ハ用

此湯、症う多き人へ

半夏、天南星、毒中なるハ生薑汁ヲ  
吞ムベシ、即効アリト、和胃東部ノ誤アリ

ヒ又也凡テ上部ノ瘡腫ニ下劑ヲ用ルハ用捨スベシ  
東垣カ身半以上天之氣身半以下地之氣ト云フヲ唱ヘ  
上焦ノ分ニアツマル邪ハ上焦ノ分ニテ表清解スル  
理ヲ發明セシハ面白キ窮理ナリ

救急湯曰上老腹痛時止時發面白唇紅者蟲痛也

烏梅、蜀椒、楝子、厚朴、甘草、干姜、右十二味

此方ハ蛇蟲ノ腹痛ヲ治ス其形症實ニ似タル氏殺虫ノ

藥應セサル者ニ効アリ其一等輕キ者ヲ楝梅丸トス

清濕化痰湯毒也治遍身四肢骨節走注疼痛掌月胸背寒熱  
喘咳煩悶或作腫塊或疥癬不仁或背心一點如氷冷脉沉

滑者

南星、半夏、橘皮、茯苓、蒼朮、羌活、黃耆、白芷

白芥子、甘草、生薑、右十一味

此方ハ痰飲四肢ニ走注痛者ヲ主トス走注ノ理ハ控  
涎丹ノ主治ニ詳ナリ控涎丹ノ症一等輕者此方ヲ喫フ

ヤ

白芥子



ベシ又痰結シテ胸脇痛ニ或ハ肩背塊ヲ生シ痛アル者  
 ニ用又首筋ノ辺ニ痰集リテ結核ヲ生シ瘰癧氣腫メ如  
 リ數多ク羣メトメ久ク愈サル者乳香沒藥海石朴硝ヲ  
 加テ治スルコト妙ナリ世に此症ヲ瘰癧トメ謬答スルコト  
 有瘰癧ハ塊ニ根有テ深シ塊ハ根ナクメ浅シ又手ヲ  
 以推スニ痛マス瘰癧ハ痛クナリ混メヘカクス凡テ濕  
 痰流注經絡關節不利ト云カ目的ナリ

清熱補氣湯。準繩。名中風虛熱。口舌如魚皮狀。或癢熱作渴。

人參、白朮、茯苓、芍藥、當歸、升麻、五味子、麥

門冬、玄參、甘草 右十味服之不應加炮薑更不應加

附子按症後口舌痛者服消黃朱石類未嘗得治一老匠傳

地方後屢試之效

秋方ハ元中風虚熱口舌瘰癧ノ状ノ如キヲ治スル方ナリ

氏今產後口各痛三消黃朱石類服之效之見甘九者

二運用スルハ其驗桴鼓ノ如シ蓋此方ハ明匠雜著ノ業

胡清所散ト表裏ニテ彼ハ所欠元盛倍舌腫裂スル者ヲ

治小兒脾疳奇方 學方脾疳靈藥也  
 朱端盛者了不伏一可救時 蟾蜍  
 人參三升 甘草一分 石為細末分作廿一服以白湯  
 及消積利日以一服分三服 靈藥須知

治小兒血虛口舌糜爛及小兒疳積身熱面黃肚大青筋瘦弱  
 消疳飲 商世治小兒疳疾身熱面黃肚大青筋瘦弱  
 人參、黃連、神麴、青皮、茯苓、白朮、縮砂、胡蘆

連、甘草 右九味

此方小兒脾疳腹肚大者用之主治之九青筋  
 頭之天不拾不治也

清暑益氣湯 要近製主治同內外傷辨方

人參、白朮、麥門、五味、橘皮、甘草、黃蘆、芍藥、當歸

黃蘆 右九味按張三錫新定方與門去五味有外麻姜豉

此方八注夏病主治之醫學入門每遇春未夏初頭痛脚

軟食少體熱名注夏病治之方補中益氣湯去升麻加黃柏

為藥五味子麥門冬即此方一類ノ藥ナリ又張三錫新定

方二八麥門五味十升外麻姜豉ナリ何レモ其宜ニ從テ

壁用スハシ又辨惑論升陽順氣湯云治飲食不節勞役所

傷腹脇痛肉短氣過春則口淡臭味過春雖熱猶有惡寒飢



注夏病ハ大抵方ヲ服セシメ萬葉集ニ據テ鰻鱺ヲ餌  
食ハシ閨房ヲ遠クルハ秋冬ニ至テ復スル者也金匱云  
春夏劇秋冬瘥ト亦秋病ヲ謂ニ似タリ

消風散正身治風濕浸淫血脉致生瘡疥搔痒不絕及大人小

兒風熱癩疹遍身雪片斑點中有年無並効

• 羌活 • 地黃 • 防風 • 蟬退 • 知母 • 苦參 • 胡麻 • 荆芥

• 蒼朮 • 牛蒡 • 石羔 • 甘草 • 木通 • 桂十三味

此方ハ風濕血脉ニ浸淫ハ瘡癰ヲ發スル者ヲ治ス一婦

人年三十許年々夏ニサレハ總身患瘡ヲ發シ肌膚木皮

ハ如ク痒塌時ニ錦水淋漓不可忍諸匠牛ヲ求テ愈ハス

余此方ヲ用ル十一月ニノ効アリ三月ニノ全ク愈

清濕湯會解動旋火為濕熱腰背痛身重倦怠身板夾脚

似沙墮表裏濕熱宜用

• 獨活 • 防風 • 澤浮 • 薏苡 • 防己 • 芍藥 • 黃蘗 • 黃芩

• 甘草 • 五九味

此方ハ濕熱ニテ腰脚痠疼沉重沙墮ニ似テ世ニ所謂醉

々ニ疑似スル者ヲ治ス此湯ノ一等重キ者ヲ除濕補氣  
湯トスル也

清涼至賢飲玉衛以清熱之劑

薄荷、代胃皮、牡丹、梔子、天花粉、玄參、細辛

右七味

此方ハ痧熱ヲ消スニ主トス臣宗鑑ニ陰毒湯毒ハ

今ノ所謂痧病也ト云氏ニ病共ニ偏有人証ニナ辨明ニ

カタニ一種奇熱ノ者アリ此方ヲ用テ効アリ後世痧病

ニ黃連解毒湯ヲ用然レ氏彼ハ下利同世ヲ主トス此ハ

痧熱ヲ主トスル也

消水聖愈湯時方妙用治水第一方然面手脈浮而遲足趺陽脈

浮而數診法緯毫不錯一服必驗

即桂姜草黃平附湯方中加知母防己以清于代天雄

以方ハ瀉水ノ主劑トス陳修園ハ衆明ニ此方場合ニ因

テ意外ニ効ヲ奏ス即大氣一轉ノ手紋也ト云桂姜草黃

黃平附湯ノ條ヲ參照スベシ



生代湯造生治兒枕痛

当飯、川芎、桃仁、草甘、乾姜、右五味

此方ハ景兵全書幼々集成等ニ出タルト鑿ノ素赤ノ女  
科叙方ニ載セタル論最モ精シ其主意ハ凡産后ニ血氣

順行スレハ蓄瘀消シテ新血滋生スルノ理必然ナリ故

ニ古ヨリ桂枝茯苓丸ヲ用テ瘀血ヲ逐テ主藥トス然レ

氏脱血過多ノ症ニハ參附地黄ニ芪ト芍用メ溫補ニ

ハキコトナク概々地黄枳用ルハ宜シカラズ是ニ於テ

芎飯姜桃ヲ以テ生代ノ運用ヲ成リ果ニ妙手較ト云ハ

シ若乎素病ニテ子宮痛者力或ハ月信痛堪カクキ者ハ

挑人ヲ去テ用ルヲ佳トス

消痛退熱飲

青黛、煨榔、侯君子、木通、牽牛子、萊胡、莢朮

、枳實、黃芩、甘草、右十味藥圖先生曰此方與消痛飲

有虛寒之別臨症宜選用

此方ハ消痛飲ノ症ニメ稍寒ニ屬スル者ヲ治ス水腫脹

本邦曰牛腰鼓。每中少自。肉。

白土土



道遥解毒湯の梅毒を身体に染  
 入る毒弱微熱なりと氣を不  
 在再不之症腹前を者月  
 用エト

道遥解毒湯の梅毒を身体に染  
 入る毒弱微熱なりと氣を不  
 在再不之症腹前を者月  
 用エト

遺種、滑石、澤母、阿膠、茯苓、木通、忍冬、大黃

此方ハ内臣下所ノ淋痛ヲ治ス若膿血淋瀝痛堪エハカ

ラサル者ハ解毒劑ニ加阿膠滑石車前子ヲ喫フハシ解

毒劑ハ本舊川氏江州ノ民間ヨリ傳タリト云漢方ニハ

此類ノ方ナシ運用メ其効ノ妙ヲ知ヤシ

清肌安烟湯蔓難治寒熱往來肌膚枯燥似瘧如勞

耶小葉胡湯方中加鷓鴣菜麥門玄大麥

此方小兒蛇虫ヨリ寒熱ヲ發スル者ニ効ナリ似瘧如勞

者ハ淨府陽ヨリハ能應スルナリ

道遥解毒湯微瘧約言治楊梅結毒不解腹中有熱肌肉瘦削

倍吟曰淫勞或服粉劑後生變或諸瘡久不愈

金銀花、當歸、芍藥、白朮、萊菔、梔子、茯苓、薏

苡、連翹、甘草、杜十味

此方淫勞ヲ治スルノ主劑トシ道遥散ハ小葉胡湯ノ腹

形ニハ牛蜀辛劑也故ニ當歸芍藥一葉胡其草ニテ心下

形ニハ牛蜀辛劑也故ニ當歸芍藥一葉胡其草ニテ心下

形ニハ牛蜀辛劑也故ニ當歸芍藥一葉胡其草ニテ心下

形ニハ牛蜀辛劑也故ニ當歸芍藥一葉胡其草ニテ心下

面脇ヲユルノ白赤痰苔ニテ胃中ノ水飲ヲ消導スル中  
ニ梔子ノ浮火連翹ノ濕熱ヲ清スル薏苡ノ濕瀝ヲ  
金銀花ノ瘡毒ヲ制スル茜ヲ入メムツクリト精氣ヲ  
損セム邪毒ヲ去ルノ工夫青洲翁ノ精義入神ト謂ハシ



細珠(1)

聖體亦氣養乎陽乎

發子所入報案一國然之制法外黃姑下新田地

西曜や工巧を尚ぶ者なり。其書半ハ紙繪本。削書云々。

Furukawa Yakushiji no Hoshaku  
Tokyo: 1891

National Library of Medicine  
Bethesda, MD

**CONDITION ON RECEIPT**

The full Japanese pouch binding was dirty, worn, creased, and stained. The covering paper was torn and missing or lifting in places. The text block consisted of manuscript text on thin Japanese paper folded at the fore edge and stab sewn with what appeared to be linen thread. The folios had been interleaved for microfilming. The sewing was intact. The paper was flexible but was slightly dirty and discolored. Many folios were fully or partially split along the fore-edge fold. A few scraps were loose throughout the volume. The black and red manuscript inks varied in intensity.

**TREATMENT REPORT**

The volume was microfilmed. Treatment was documented with color slides. The volume was collated and disbound. Interleaving sheets were removed. The text block was tied together with twisted Japanese kozo paper (Hoskawa Odban, Hiramoto paper International). The previous binding was sewn on with silk thread (3-ply Fine Reeled Cord, Aurora Silk).

Northeast Document Conservation Center  
24 October 2005  
DW:KJ



明治卅四年春社勿誤塾寫之

木村南凱



